




LX - B 13

LIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele III

LX

B

13

NAPOLI









SUITE DES
MEMOIRES
DE
MATHEMATIQUE
ET
DE PHYSIQUE,

Tirés des Registres
DE L'ACADEMIE ROYALE
DES SCIENCES
DE L'ANNEE M. DCCXXXIII.



A. AMSTERDAM,
Chez PIERRE MORTIER,
M. DCCXXXVII.


Avec Privilege de N. S. les Etats de Hollande & de West-Frife



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

S U I T E D E S
M E M O I R E S
D E L' A C A D E M I E R O Y A L E
D E S S C I E N C E S ,

D E L' A N N É E M . D C C X X X I I I .



T R O I S I E M E M E M O I R E
S U R L' E L E C T R I C I T É .

Par M. D U F A Y . *

*Des Corps qui sont le plus vivement attirés par
les matieres électriques, & de ceux qui sont
les plus propres à transmettre l'Electricité.*

 A N S le premier Mémoire que j'ai
lu à l'Académie sur l'Electricité,
j'ai donné un précis historique des
découvertes qui ont été faites jus-
qu'à présent sur cette matiere ; &
dans le second, j'ai rapporté une longue suite
d'expériences, d'où il résulte qu'à l'exception
des Métaux, tous les corps qui ont assez de
solidité pour être frottés vivement, devien-
nent électriques par eux-mêmes, & que tous,
sans exception, le deviennent, soit en les
ap-

* 14 Novemb. 1733.

Mem. 1733.

approchant du tube rendu électrique, soit en les attachant au bout d'une corde, ou de quelque autre corps continu, de l'autre bout duquel on approche le tube.

Je me suis proposé d'examiner dans celui-ci quelles sont les matieres qui sont le plus fortement attirées par les corps électriques; & quels sont les corps qui peuvent arrêter ou faciliter la transmission de cette vertu, soit qu'elle se fasse par le moyen d'une corde, d'une baguette, & de tout autre corps, ou par la seule approche du tuyau de verre.

Ces expériences demandent une attention beaucoup plus scrupuleuse qu'on ne l'imagine d'abord, & ce n'est ordinairement qu'après bien des tentatives souvent inutiles, & quelquefois rebutantes, qu'on parvient à trouver les moyens d'y réussir. Pour connoître quels sont les corps qui sont le plus fortement attirés, il faut que ceux que l'on présente au corps électrique soient, le plus qu'il est possible, de même volume & de même pesantueur comparés les uns aux autres, sans quoi il est impossible de s'assurer de l'exactitude de l'expérience. Voici donc de quelle maniere j'ai tenté d'y parvenir.

J'ai présenté au tube de la râpüre d'ambre, de gomme lacque, du verre pilé, de la sciure de bois dur & pesant, de la brique pilée, & il m'a paru que ces derniers corps qui ne sont point électriques par eux-mêmes, étoient plus fortement attirés que les premiers; mais on ne peut rien conclure de bien assuré d'une pareille expérience, parce qu'il est extrêmement

ment difficile de connoître le volume & la pesanteur de ces petits fragmens.

J'ai suspendu des rubans de soie, de laine & de fil, & j'y ai présenté le tube; mais il est encore presque impossible d'en trouver dont la pesanteur & le volume soient à peu près égaux: ainsi j'ai abandonné le dessein de connoître quelles sont les matieres qui sont le plus fortement attirées par une voie où il se trouvoit tant de difficultés & si peu de certitude.

M. Gray dit à la fin du Mémoire que nous avons déjà cité, N°. 417. des Transactions Philosophiques: „ Que les corps de même „ nature sont plus ou moins électriques sui- „ vant la couleur dont ils sont, en sorte que „ le rouge, l'orangé ou le jaune attirent „ pour le moins trois ou quatre fois plus „ fortement que le verd, le bleu ou le pour- „ pre. ”

Cela posé, je pouvois facilement trouver des corps qui étant de même volume & de même pesanteur, ne différassent que par le degré d'électricité. J'ai donc pris des rubans de soie les plus égaux qu'il m'a été possible dans toutes leurs dimensions, mais tous de couleurs différentes; il y en avoit neuf, un blanc, un noir, & les sept autres des mêmes couleurs que celles qui sont regardées comme primitives par M. Newton dans son Optique; savoir, violet, indigo, bleu, verd, jaune, orangé & rouge.

J'attachai ces neuf rubans à un morceau de bois horizontal, de façon que je pusse les changer de place, & les mettre dans l'ordre

que je voudrois, dans la crainte que s'il y avoit quelque partie du tube plus électrique que le reste, cela ne me jettât dans quelque erreur. Ayant rendu le tube électrique, je l'approchai dans une situation horizontale, & le plus également que je pus, de tous ces rubans, & je ne fus pas peu surpris de voir que le noir se détachoit de fort loin du rang des autres pour venir s'appliquer au tube; le blanc faisoit la même chose ensuite, & en approchant davantage le tube, les autres venoient successivement, mais ils ne gardoient pas toujours le même ordre, si ce n'est que presque toujours le rouge venoit le dernier de tous.

Je ne doutai point alors que la couleur n'entrât pour beaucoup, comme l'avoit dit M. Gray, dans les expériences de l'électricité; je cherchai à m'en éclaircir par de nouveaux faits, & je fus encore confirmé dans mon opinion par les expériences suivantes.

* M. Hauksbee rapporte que l'interposition d'un morceau de gaze ou de mousseline entre le tube & les corps que l'on veut attirer, arrête entièrement la vertu électrique; il dit ailleurs † que les écoulemens électriques sont également interrompus par le moyen d'une planche, & aussi par une feuille de laiton appliquée sur le tube; &, dans un autre endroit ‡, qu'un morceau de verre ou une glace ne nuit point à l'électricité, en sorte que des feuilles de laiton sont mises en mouvement par le tube,

* *Pag. 37. de l'edit. Ital.*

† *Pag. 92. observ. 1. & 2.*

‡ *Pag. 102.*

tube, ou par un morceau de gomme lacque, quoique l'on soutienne une glace entre les feuilles & le corps électrique.

J'ai cru qu'il étoit nécessaire de rapporter les endroits du Livre de M. Hauksbee que je viens de citer, parce que c'est celui à qui nous devons les plus curieuses expériences sur l'électricité; mais quelque envie que j'aye de rendre une entière justice, tant à lui qu'à tous les Auteurs dont j'ai eu occasion de parler dans ce Mémoire, il m'est impossible de marquer exactement ce dont ils pourront avoir fait quelque mention, parce que la plupart ont rapporté leurs expériences suivant l'ordre dans lequel elles ont été faites, au-lieu que mon plan est entièrement différent, & que j'ai partagé, tant leurs expériences que les miennes, en différentes classes, afin de démêler, s'il est possible, quelques-unes des loix & des causes de l'électricité.

En suivant ce dessein, je ne pourrois citer avec exactitude les endroits de ces différens Auteurs sans tomber dans de fréquentes répétitions, & allonger considérablement mon Ouvrage. Je prendrai donc le parti de rapporter de suite les faits qui auront entre eux une analogie & une liaison naturelle; mais s'il y en a quelques-uns qui ne soient pas entièrement de moi, & dont je ne cite point les Auteurs, je supplie qu'on me rende la justice de croire que ce n'a point été dans la vue de m'en attribuer la découverte, puisque j'ai déjà indiqué ces mêmes Auteurs dans mes deux premiers Mémoires, & que

j'ai exhorté à les lire ; mais que c'est uniquement par les raisons que je viens de rapporter.

Pour revenir à mes expériences, j'ai fait avec soin celles de M. Hauksbee que je viens de citer, & j'ai reconnu qu'en effet une planche, une feuille de métal, ou même une gaze, empêchent l'action des corps électriques, & que le verre ou une glace n'y apporte aucun obstacle ; ce qui m'étoit arrivé à l'égard des rubans de couleur, m'a fait venir l'idée de pousser ces expériences beaucoup plus loin. Je tâchois alors de découvrir s'il y avoit des corps plus vivement attirés que d'autres, mais on a vu dans le commencement de ce Mémoire les difficultés presque insurmontables qui se rencontrent dans cet examen, & on verra par la suite que la connoissance des corps qui interceptent ou laissent passer les écoulemens électriques, nous apprend en même tems quels sont ceux qui sont plus fortement attirés que les autres.

J'ai teint sept morceaux de gaze des mêmes couleurs dont étoient mes rubans, & j'en ai pris deux autres, l'un blanc & l'autre noir ; j'ai fait coudre chacune de ces gazes sur un cercle de fil de fer, & afin que la main qui les soutiendrait ne fît point d'obstacle, je me servois, pour les soutenir, d'un cercle de bois d'un demi-pied de diamètre & d'un pouce de haut ; je posois les feuilles d'or sur un de ces petits guéridons dont j'ai parlé dans mes autres Mémoires, & les ayant amassées au dedans du cercle de bois que je mettois sur ce guéridon, je les couvrois suc-

cessi-

cessivement avec les gazes de différentes couleurs.

Après cette préparation, je frottois le tube, & l'ayant rendu électrique, je le posois horizontalement au-dessus de ces gazes; je vis alors qu'en effet la gaze blanche & la gaze noire interceptoient toute la vertu, en sorte que les feuilles demeuroient sans mouvement, ainsi que M. Hauksbee l'avoit remarqué; mais les autres couleurs, & principalement la rouge, la faisoient passer, & les feuilles venoient s'appliquer avec vivacité sur la surface inférieure de la gaze: je crus pour-lors qu'il étoit pleinement démontré que les couleurs & la lumière entroient pour beaucoup dans les phénomènes de l'électricité. L'analogie de cette expérience avec celle des rubans paroissoit s'expliquer d'elle-même; le noir & le blanc qui étoient le plus fortement attirés dans l'expérience des rubans, absorboient les écoulemens électriques dans l'expérience des gazes, en sorte qu'il n'en restoit plus pour enlever les feuilles d'or qui étoient au-delà; & le rouge, qui dans la première étoit le plus difficilement empreint des écoulemens électriques, les faisoit, par cette même raison, passer dans la seconde assez librement pour qu'ils pussent exercer leur action sur les feuilles qui étoient de l'autre côté: cette expérience me paroissoit si décisive, & l'explication si naturelle, que j'ai été assez longtems sans que je soupçonnasse qu'on pouvoit en douter.

Il arrivoit néanmoins quelquefois des variétés dans ces expériences; lorsque le tube étoit

étoit fort électrique, il agitoit les feuilles à travers la gaze blanche, & même à travers la noire. On pouvoit cependant croire que cela venoit de ce qu'alors la gaze entiere avec le cercle de fil de fer étoit soulevée, que la matiere électrique passoit par dessous, & alors parvenoit aux feuilles; ainsi c'étoit-là une cause assez légère de révoquer en doute la vertu des couleurs: cela me fit cet effet néanmoins, & de plus j'avois remarqué que la gaze bleue, la verte, la jaune, n'agissoient pas toujours d'une façon uniforme. Quoi qu'il en soit, je vins insensiblement à douter de ce que j'avois cru d'abord si fermement. Je voulus faire de nouvelles expériences pour parvenir à confirmer ou à détruire ma premiere conjecture, & la suite fera voir si j'ai eu raison de chercher de nouveaux éclaircissemens.

J'essayai d'abord si les couleurs naturelles feroient un effet différent de celles qui étoient faites par art, & pour cela je pris des petits morceaux de fleurs de toutes couleurs, & j'en approchai le tube après l'avoir frotté; je trouvai qu'il enlevait toutes ces feuilles ou parcelles de fleurs indifferemment, & que les plus légères, de quelque couleur qu'elles fussent, étoient enlevées de plus loin que les autres: mais comme ces pesanteurs m'étoient inconnues, il m'étoit impossible de rien conclure de précis de cette expérience; j'eus donc recours à d'autres qui me paroissoient devoir donner des connoissances plus positives.

Je fis entrer dans une chambre obscure un rayon de Soleil, pour voir si le tube ne dé-

com-

composeroit pas la lumière, en causant une plus grande inflexion à de certains rayons qu'à d'autres; l'effet en devoit être fort sensible, car s'il eût attiré les rayons bleus, par exemple, le reste de la lumière, à qui ces rayons auroient manqué pour être blanche, auroit tiré sur le rouge, ou le pourpre; mais il n'arriva aucun changement à ce trait de lumière, à quelque peu de distance que j'en approchasse le tube; ainsi il ne paroît point agir sur des rayons d'une couleur, plutôt que sur ceux d'une autre.

Je fis ensuite sur la gaze une expérience du même genre; je posai dans une situation verticale, sur un pied de guéridon, mes petits châssis de gaze colorée, l'un après l'autre, & ayant placé derrière, à un pouce ou environ de distance, un ruban noir, dont le bout inférieur étoit libre, j'en approchai le tube: il attira vivement le ruban à travers les gazes de couleur, & ne lui donna aucun mouvement lorsque ce fut la gaze blanche, ou la gaze noire, qui fut interposée.

J'y plaçai la gaze blanche à demeure, & je disposai à deux pieds de la gaze un prisme de verre, en sorte que je pusse le faire tourner sur son axe qui étoit dans une situation horizontale; j'obscurcis alors la chambre, & ayant laissé entrer un rayon de Soleil par un trou pratiqué à dessein, je le fis tomber sur le prisme; tournant alors le prisme sur son axe, je fis passer successivement toutes les couleurs du prisme sur la gaze blanche; je présentai toujours le tube à chaque fois que je

je changeai de couleurs, & la vertu fut toujours interceptée par la gaze, enforte que le ruban qui étoit derrière ne fut pas plus agité lorsque la gaze blanche étoit éclairée par des rayons colorés, que lorsqu'elle l'étoit par la lumière ordinaire; d'où il résulte que ce n'est pas la couleur, comme couleur, qui produit cette variété dans les effets des corps électriques.

Une expérience plus simple, plus facile, & beaucoup plus décisive, m'en fournit dans la suite une nouvelle preuve; j'abréuvai d'eau en même tems, & le plus également que je pus, mes rubans colorés, & je les suspendis à l'ordinaire; ils furent tous attirés indifféremment par le tube: or leur couleur n'étoit en aucune façon altérée par l'eau, & le changement qui leur étoit arrivé, leur étoit commun à tous; donc ce n'est pas dans la couleur qu'il faut chercher la cause de ce que les uns sont plus fortement attirés que les autres. J'ai mouillé de même les gazes, & toutes ont également intercepté les écoulemens électriques; elles ont agi diversement après avoir été sechées, & la noire & la blanche n'ont pas aussi constamment arrêté l'électricité, qu'elles le faisoient avant que d'avoir été mouillées. Une preuve encore plus convaincante de ce que les couleurs n'entrent pour rien dans les faits que nous avons rapportés, c'est que si l'on chauffe pendant un instant la gaze blanche, ou la gaze noire, elles laissent passer les écoulemens électriques aussi facilement que les gazes de couleurs.

J'ai

J'ai coloré ensuite des rubans blancs, en les frottant avec du carmin, avec de l'ocre, avec du charbon; ils ont tous été également attirés, lorsque toutes choses ont été égales d'ailleurs: ainsi on ne peut pas douter que ce ne soit l'apprêt & les ingrédiens qui servent à colorer, & non la couleur en elle-même, qui rendent les corps plus susceptibles d'électricité, ou plus ou moins propres à arrêter les écoulemens électriques.

Ce fait étant une fois éclairci, & bien constaté, il convient d'examiner maintenant les matieres qui, indépendamment de leurs couleurs, arrêtent, ou laissent passer l'action du corps électrique. Nous avons déjà dit qu'une glace la laisse passer étant posée sur un cercle de bois, mais il faut que la glace soit essuyée, & bien sèche: lorsqu'on en approche le tube, les feuilles placées dessous sont attirées, & repoussées avec force; mais si l'on retire le tube, elles demeurent attachées à la glace, d'où elles ne retombent que quelques minutes après, & lorsque la vertu est tout-à-fait dissipée.

J'ai craint que la matiere électrique ne passât entre la glace & le cercle de bois, & j'ai voulu m'assurer si elle pénétrait réellement la substance du verre; j'en ai été bientôt convaincu, car ayant enfermé des feuilles d'or dans deux matras, & les ayant parfaitement bouchés avec de la cire, les feuilles ont été très sensiblement attirées, & repoussées lorsque j'ai approché le tube des matras.

Pour voir si c'étoit à raison de sa transparence que le verre donnoit passage à la ma-

tiere électrique, ou à cause de la disposition qu'il a à le devenir lui-même, j'ai posé sur le cercle de bois une plaque de cire d'Espagne, & les feuilles ont été attirées de même qu'à travers la glace.

J'ai fait un rebord de cire à ma glace, afin qu'elle pût contenir de l'eau, & y en ayant versé, les feuilles n'ont point été attirées; mais ayant un peu chauffé la glace par-dessous, en la tenant un moment sur un réchaud, & l'ayant mise sur le cercle, les feuilles ont été attirées.

Une feuille de papier, un morceau de carton, une planche, une lame d'étain, étant posés l'un après l'autre sur le cercle de bois, ont arrêté l'électricité; ayant fait chauffer ces différentes matieres, il n'y a eu que le papier qui ait laissé passer la vertu, toutes les autres l'ont interceptée.

Je me suis servi d'un cercle, ou collier de verre, à peu près du même diametre & de la même hauteur que celui de bois; alors le bois, le carton, la platine d'étain étant un peu chauffés n'ont point empêché les feuilles qui étoient au-dessous d'être attirées par le tube. Il faut que le collier de verre soit bien essuyé, & exempt de toute humidité. La gaze noire & la gaze blanche étant posées sur ce collier de verre, les feuilles ont été attirées de même qu'à travers les autres couleurs.

Dans toutes ces expériences les feuilles d'or & le collier de verre ou de bois étoient posés sur un carton blanc; je les ai mis sur une glace au-lieu de carton, & il est arrivé quel-

quelques petites différences dans les expériences, mais elles sont de peu de conséquence, & le détail pourroit en devenir ennuyeux. Il résulte donc de ce que nous venons de voir, que tous les corps chauffés légèrement, de quelque nature & de quelque couleur qu'ils soient, laissent passer, ou du moins n'arrêtent point la vertu électrique s'ils sont posés sur un collier de verre; & que sur un collier de bois quelques-uns la laissent passer sans être chauffés, d'autres ont besoin de l'être, & d'autres enfin l'arrêtent absolument, quoique chauffés.

Ce qui arrive en se servant du collier de verre n'est pas difficile à expliquer; car la matière électrique passant librement à travers le verre, elle peut agir sur les feuilles, & les appliquer contre la platine de bois, de carton, d'étain, &c. qui sont rendus électriques par l'approche du tube.

Pour expliquer ce qui arrive lorsqu'on se sert du cercle ou collier de bois, il n'y a qu'à supposer que les corps qui mettent obstacle au passage de la matière électrique, ne le font que parce qu'ils sont empreints d'une humidité extérieure ou intérieure, ou quelque autre matière équivalente sur laquelle l'électricité agit, & qui par conséquent l'arrête. Ceux de ces corps qui pourront être parfaitement séchés en les exposant au feu, seront dépouillés de cette humidité, & laisseront passer les écoulemens électriques; c'est là le cas où se trouve le papier, la gaze noire, la blanche, &c. Les autres, tels qu'une planche, un carton épais, une lame de métal,

tail, ne pourront être entièrement dépouillés de cette humidité intérieure, ou autre matiere quelconque qui arrête l'électricité, & par conséquent ne la laisseront point passer.

Cette observation s'accorde à ce que nous avons remarqué dans le premier Mémoire, & se réduit à ce principe que je crois pouvoir regarder comme certain: Tous les corps qui peuvent devenir électriques sans autre préparation que de les frotter, étant posés sur un collet de bois, ne mettent point d'obstacle à l'électricité; ceux qui ont besoin d'être chauffés plus ou moins fortement pour devenir électriques par le frottement, ont besoin de l'être de même pour ne point intercepter la vertu électrique; & enfin les métaux que je n'ai point encore pu trouver le moyen de rendre électriques par le frottement, l'intercepteront toujours, jusqu'à ce que l'on ait imaginé de leur faire quelque préparation qui les rendroit susceptibles d'électricité immédiatement, & par eux-mêmes.

Une observation bien simple prouve combien l'humidité met d'obstacle à l'électricité: si l'on frotte vivement un morceau d'ambre, & que l'on respire dessus, de maniere à l'humecter, il n'attirera pas les corps légers qu'on lui présentera; mais un moment après, cette humidité s'étant évaporée d'elle-même, l'ambre deviendra électrique, quoique foiblement, sans être frotté de nouveau.

Après avoir parcouru tous les obstacles que l'on peut apporter extérieurement à l'électricité du tube, il faut dire un mot de ceux qu'on peut faire naître en emplissant le tube de

de différentes matieres, & des singularités qui arrivent alors dans les différentes expériences.

J'ai pris un tube de verre commun & verdâtre, de la Verrerie de Sève, long de deux pieds, de huit lignes ou environ de diametre, & ouvert par les deux bouts; j'y ai ajusté deux bouchons de liege, & l'ai rempli de sable-chaud; il a été électrique sans l'avoir frotté: mais cela venoit vraisemblablement de l'avoir passé un peu dans les mains, car le tube étant chaud, n'a besoin que d'un très petit frottement. L'ayant ensuite frotté avec du papier à l'ordinaire, il a été pour le moins aussi électrique que lorsqu'il étoit vuide, & le bouchon du bout supérieur l'étoit aussi très fortement.

Ayant laissé refroidir le sable, j'ai frotté le tube; il a été aussi électrique que la première fois, mais il a fallu le frotter un peu plus longtems; & les bouchons l'étoient de même.

J'ai vuide la moitié du sable, & frotté la partie vuide; il a été de même électrique: ayant ensuite renversé le tube pour faire tomber le sable dans la partie frottée, la vertu du tube a diminué tout-à-coup, & est revenue en son entier, lorsque le sable a été renversé dans le premier bout.

J'ai ôté le sable, & soufflé dans le tube avec un soufflet pour le bien nettoyer, & je l'ai rempli de son; il est devenu plus difficilement électrique, & l'a moins été qu'avec le sable; le bouchon du bout ne l'étoit presque point; la vertu paroissoit agir plus len-

tement, & les feuilles appliquées au tube, y demeuroident plus longtems qu'à l'ordinaire sans être repoussées. J'ai vuide la moitié du son, & ayant frotté la partie vuide, le tube a été électrique à l'ordinaire, & le bouchon aussi; ayant fait tomber le son dans cette moitié frottée, la vertu a diminué, mais elle ne s'est pas si bien rétablie qu'avec le sable, lorsque le son a été reversé dans la partie où il étoit d'abord; le bouchon n'avoit presque aucune vertu lorsque le son le touchoit, au lieu que dans l'expérience ordinaire il en a pour le moins autant que le tube.

Ayant enfin bien nettoyé le tube, je l'ai rempli d'eau chaude, & après l'avoir bien frotté, il a été électrique, mais très peu, & il n'attiroit les feuilles qu'en l'approchant à un pouce ou environ; j'ai laissé entierement refroidir l'eau, la vertu électrique a été aussi difficile à exciter, & aussi peu considérable, & le bouchon n'en avoit aucune.

Ayant ôté toute l'eau, mais sans secher le tube, l'effet étoit le même que lorsqu'il étoit rempli d'eau.

On voit par-là que les mêmes loix subsistent toujours, & que les corps électriques par eux-mêmes sont ceux qui arrêtent, retiennent, ou absorbent le moins les écoulemens électriques; le sablon n'étant que des fragmens d'une matiere crystalline & transparente, est électrique par lui-même, aussi ne retient-il point la vertu électrique du tube; le son est beaucoup moins électrique, puisqu'il doit être rangé dans la classe des Végétaux desséchés, & l'on voit qu'en effet il retient

tient une partie de la matiere électrique, en forte qu'il n'en échape qu'une petite portion au dehors du tube ; enfin l'eau est de toutes les matieres celle que nous avons reconnue être le moins susceptible d'électricité par elle-même, & nous voyons dans cette expérience que toute la matiere qui émane du tube va s'y appliquer, & s'y concentrer par préférence au bouchon de liège qui est au bout du tube ; & s'il reste à l'extérieur du tube encore quelque légère vertu, c'est qu'elle est trop abondante pour qu'une aussi petite masse d'eau la puisse absorber toute entière.

Après avoir examiné les obstacles que peuvent apporter les différentes matieres à l'action immédiate du tube, ou des corps électriques, nous devons passer aux expériences qui se font par le moyen d'une corde, ou de quelque autre corps continu. Comme j'avois dessein de voir, s'il étoit possible, jusqu'où la vertu électrique d'un tube pourroit être portée par le moyen d'une corde & d'une boule suspendue à son extrémité, j'ai d'abord essayé sur une distance de vingt-cinq pieds des cordons & des boules de différentes grosseurs, de différentes matieres & de différentes couleurs ; je me suis servi aussi de tuyaux de verre, de baguettes, de roseaux, de fils de fer & de cuivre : j'ai fait un grand nombre de combinaisons des cordons & autres corps continus avec les différentes boules, & sur-tout avec celles de différentes couleurs, parce que je pensois alors que cela étoit très important ; mais je supprimerai ici tout ce

détail, & je dirai seulement que les matieres les plus susceptibles d'électricité par elles-mêmes sont les moins propres à la porter à un éloignement considérable, en sorte qu'à cetté distance de vingt-cinq pieds les tuyaux de verre, les cordons de soie, & sur-tout ceux de soie rouge bien secs ne communiquoient presque aucune vertu à la boule qui y étoit suspendue.

La corde la plus commune, & les cordons de fil, de la grosseur d'un tuyau de plume, ou même plus gros, étoient ce qui faisoit le mieux. Voyant que ce qui étoit le moins électrique, étoit ce qui réussissoit le plus parfaitement pour transmettre l'électricité, & ayant éprouvé combien peu les corps humides étoient électriques par eux-mêmes, j'imaginai de mouiller mes cordons, & je vis qu'en effet c'étoit ce qui faisoit le mieux.

J'attachai diverses boules à ces cordes mouillées, & ce fut toujours les matieres le moins électriques qui firent le plus d'effet; je remarquai même qu'elles en faisoient à proportion de leur volume: mais ce seroit un travail très considérable & assez difficile que de rechercher quelle matiere fait mieux que toutes les autres, & quel est le volume qu'il est nécessaire qu'elle ait pour produire le plus grand effet possible.

Il s'agissoit ensuite de la matiere dont il falloit me servir pour soutenir la corde qui devoit transmettre les écoulemens électriques. M. Gray avoit déjà remarqué que les cordes ordinaires n'y étoient pas propres, non plus que du fil de fer, & il s'étoit servi
avec

avec beaucoup de succès de soies de couleur. Il étoit facile de conclure que si la soie faisoit mieux qu'un fil de fer, ce n'étoit pas comme ayant peu de volume, & par ce moyen ne détournant qu'une petite quantité de la matiere électrique, puisqu'il s'étoit servi de fil de fer très menu; je soupçonnai donc que cela venoit de la grande disposition qu'a la soie à devenir électrique, & je jugeai qu'on y pouvoit substituer des matieres plus solides, & qui eussent la même propriété.

Je pris des tuyaux de verre ordinaires, & d'autres que j'avois chauffés, & enduits extérieurement de cire d'Espagne, & je vis avec plaisir que l'événement justifioit ma conjecture; car les uns & les autres n'interrompirent point le cours de la matiere électrique le long des cordes, & je m'en suis servi aussi utilement, & dans plusieurs occasions, plus commodément que de la soie.

Ayant ainsi examiné en petit quelles étoient les expériences les plus favorables à la transmission de l'électricité, je tâchai d'en réunir le plus qu'il me fut possible, & m'étant muni de tout ce que je crus m'être nécessaire, je fus au Tremblay, qui est à quatre lieues de Paris, avec M. l'Abbé Nollet qui m'a infiniment aidé dans toutes ces expériences, & qui même en a imaginé plusieurs de celles qui se trouvent dans ce Mémoire. J'avois dans mon jardin la commodité d'une allée de 50 toises de long, qui est accompagnée de deux contre-allées, & qui est en face de la porte d'une grande salle où je pouvois présenter mes feuilles à la boule, sans être ex-

posé au vent. C'est là que je me préparai pour faire les expériences suivantes.

Le 6 Septembre après midi, par un tems sec & assez froid, le Soleil paroissant de tems en tems, le vent au Nord-Ouest, je fis attacher de 20 pieds en 20 pieds, des soies d'un arbre à l'autre d'une des contre-allées, & ayant arrêté un bout de la corde à la premiere de ces soies transversales, je la posai sur toutes les autres jusqu'au bout de l'allée qui est proche du mur d'un pavillon; j'attachai à ce mur avec un clou, une soie en double, d'environ 2 pieds de long, & ayant fait la même chose à 4 pieds de là sur le même mur, je passai la corde dans ces deux especes de boucles; l'ayant ensuite ramenée vers le bout de l'allée le plus proche de la maison, & où étoit arrêté le bout de la corde, je la posai sur la même soie, & au moyen d'un troisieme retour que je fis faire à la corde, je la fis entrer dans la salle pour être à couvert du vent; elle passoit enfin sur une soie horizontale tendue dans la chambre, & portoit à son extrémité une boule de bois de 2 pouces de diametre.

On conçoit aisément que j'eus attention à ce que la corde ne fût pas trop proche des arbres, ni de la muraille en aucun endroit, & que la moitié qui revenoit fût suffisamment éloignée de l'autre. Toutes choses étant ainsi préparées, on frotta le tube, & on l'approcha de la corde à 20 pieds ou environ du bout où étoit suspendue la boule; elle attira sur le champ les feuilles que j'avois placées au dessous: on porta ensuite le tube à 100
pieds,

pieds, à 300, à 450, & enfin jusqu'au premier bout de la corde qui étoit à 626 pieds de la boule; elle fut toujours électrique, mais sa vertu étoit moins forte que lorsque le tube étoit plus proche. Il est à observer qu'il faisoit assez de vent, & que la corde faisoit trois coudes, le 1^{er}. à 300 pieds, le 2^d. à 304, & le 3^{me} à 610.

J'avois de plus le soin de toucher la boule avec la main après chaque station qu'on avoit faite avec le tube, afin de lui ôter toute la vertu qu'elle auroit pu avoir conservée par l'approche du tube; cela la dépouille en effet de toute son électricité, ainsi que l'a remarqué M. Gray; c'est aussi lui qui conseille de poser d'abord le tube à une petite distance de la boule, & de l'en éloigner successivement pour produire un effet plus considérable: je réussis donc parfaitement dans cette première expérience.

Le lendemain, à dix heures du matin, nous répétâmes l'expérience; elle réussit encore mieux que la veille, parce que le tube étoit plus électrique; le tems & le vent étoient à peu près les mêmes. Je mouillai ensuite la corde tout du long avec des éponges, l'électricité n'en fut que plus forte, & même ayant posé d'abord le tube à toute la longueur de la corde, c'est-à-dire à 611 pieds (parce qu'elle s'étoit raccourcie de 15 pieds en la mouillant), l'électricité se manifesta dans la boule une minute après.

Le 8 Septembre, il faisoit à peu près le même tems, le vent étoit le même, mais très violent, ce qui agitoit extraordinairement

ment la corde; néanmoins après avoir allongé de plus de moitié celle de la veille, en la faisant aller & revenir dans la seconde contre-allée, au moyen de quatre autres coudes, ce qui donnoit à la corde une longueur de 1256 pieds, elle fit son effet très sensiblement. On mit d'abord le tube à toute la distance que pouvoit permettre la corde, mais il ne parut aucun mouvement dans les feuilles placées au-dessous de la boule, ce qui seroit peut-être arrivé si le tems n'y avoit pas été aussi peu propre qu'il l'étoit. Je ne crois cependant pas que le vent y apporte d'obstacle par lui-même; mais en agitant la corde, il la faisoit approcher des arbres, ce qui pouvoit détourner une partie de la matiere électrique. Malgré cet inconvénient, la boule ne parut guere moins électrique qu'elle l'avoit été la veille à une distance de moitié moins grande, mais pour cela il fallut placer le tube d'abord à 300 pieds de la boule, ensuite à 600, à 900, & enfin à la distance de toute l'étendue de la corde. Je fis ensuite mouiller toute la corde, & l'effet fut encore plus sensible, elle fut raccourcie d'environ 30 pieds; on ne peut cependant pas croire que ce soit à une diminution de distance aussi peu considerable qu'on doive attribuer l'augmentation de vertu, & il ne paroît pas douteux que cela ne vienne de l'eau qui diminueoit l'électricité naturelle de la corde, ce qui est essentiel, comme nous l'avons vu plus haut.

Il faut observer, en mouillant la corde, de ne point mouiller les soies transversales qui la

la soutiennent, car on les mettroit par-là dans le cas de la corde, & elles détourneraient la matiere électrique. Je remarquerai à cette occasion, que quoique le cordon de soie soit le moins propre de tous pour transmettre l'électricité, il devient aussi bon pour cet effet que tous les autres, si l'on a la précaution de le mouiller.

Ayant reconnu que l'électricité pouvoit être portée à une si grande distance, il m'a paru inutile de prendre beaucoup de peine pour la faire aller plus loin; & si après avoir fait un chemin de 1256 pieds, son effet est encore très sensible, il ne sera point étonnant qu'elle puisse encore agir fort au-delà, & il est constant que le plus ou le moins dépendra de la vertu des tubes qui est plus grande dans les uns que dans les autres, & dans un tems plus que dans l'autre, & de l'exactitude qu'on apportera à observer toutes les circonstances dont nous avons parlé dans ce Mémoire, & qui sont nécessaires pour la parfaite réussite de cette expérience.

Il résulte de-là, qu'un long espace d'air, & même un vent très violent, n'apporte que très peu, ou point d'obstacle au cours de la matiere électrique le long d'un corps continu; examinons maintenant ce qui arrivera de l'interruption de ce corps.

J'ai pris deux morceaux d'un cordon de fil, gros comme le doigt, dont le premier *SA*, avoit 6 pieds de long, & l'autre *CB*, en avoit 8; je les ai assujettis chacun par un bout à deux brides de soie *DE*, & *FG*, qui les coupoient à angles droits, & qui étoient

toient disposées de sorte qu'approchant ou éloignant parallèlement ces brides l'une de l'autre, les deux bouts des deux cordons s'éloignoient, ou s'approchoient l'un de l'autre, de manière qu'on pouvoit les fixer à la distance que l'on souhaitoit. Au bout *B* du cordon de 8 pieds étoit suspendue une boule de bois, & le bout le plus éloigné du cordon de 6 pieds étoit fixé à une troisième bride de soie en *S* pour la soutenir en l'air; présentant ensuite le tube frotté au bout *S* du cordon *SA*, après avoir éloigné les deux cordons d'un pouce l'un de l'autre, l'électricité étoit aussi sensible dans la boule que si le cordon eût été continu, à 3 pouces elle l'étoit encore beaucoup, à 6 pouces un peu moins, & à 1 pied beaucoup moins, & à peu près comme à la distance de 1256 pieds de corde continue : la matière électrique coule donc librement dans l'air, sans être fixée par aucun corps. Cette expérience prouve combien il est nécessaire que la corde dont on se sert pour transmettre au loin l'électricité, soit isolée, ou ne soit soutenue que de corps les moins propres qu'il est possible à se charger eux-mêmes de l'électricité.

Je rapprochai ces deux cordons à la distance de 3 pouces, & je mis dans l'intervalle qu'ils laissoient entre eux, differens corps, pour voir s'ils arrêteroient, ou non, le cours de cette matière; tout ce que j'appris par cette expérience fut que les matières, qui arrêtoient l'action immédiate du tube sur les feuilles, l'interceptoient de même entre les deux cordons; les gazes de différentes couleurs, les

rubans, la main, le carton, le bois, les métaux, tous ces corps firent le même effet qu'ils avoient fait en les posant sur un cercle de bois entre le tube & les feuilles. J'eus seulement la facilité d'éprouver par ce moyen l'effet de la flâme & celui de la fumée; une bougie allumée, placée entre les cordons, n'apporta aucun changement à l'électricité; la fumée fut attirée par le cordon, à l'extrémité duquel on appliquoit le tube, & par conséquent diminua l'électricité de la boule, mais cette diminution n'étoit presque pas sensible. Je soufflai entre les deux cordons avec un soufflet, & cela n'apporta aucun obstacle à l'électricité de la boule. L'interposition de differens corps ne m'apprit donc rien, sinon que les loix de l'électricité sont uniformes, & que ce qui y met obstacle dans un cas, fait le même effet dans tous les autres.

Je n'ai dit qu'un mot, en passant, d'une maniere d'intercepter toute l'électricité, qui néanmoins mérite un peu plus d'attention. J'ai attaché au bout d'un cordon de fil de 15 pieds de long, un globe de carton d'un pied de diametre, enduit de blanc & poli; ayant arrêté ce cordon sur deux brides de soie à l'ordinaire, & ayant fait approcher le tube du bout, le globe qui étoit à l'autre, devint fort électrique, & attiroit les feuilles d'un pied de distance; je touchai alors la corde du bout du doigt, le globe cessa sur le champ d'être électrique. Je compris facilement que la matiere avoit pris son cours le long de mon doigt, & qu'en s'étant communiquée à mon corps & au plancher, elle s'étoit dissipée par toute

toute la chambre; sur ce principe, je jugeai que si je faisois toucher la corde par un corps d'un moindre volume, toute l'électricité du globe ne seroit pas interceptée: l'événement justifia ma conjecture, car ayant suspendu un morceau de bois à une soie, je le posai sur la corde, & le globe ne perdit qu'une partie de son électricité. Il résulte de-là, que le volume des corps que l'on suspend pour devenir électriques, est extrêmement à considérer; car s'ils sont excessivement gros, la vertu est trop étendue pour agir vivement, & s'ils ne le sont point assez, ils ne réunissent pas toute celle qui leur est amenée par la corde.

Avant que de finir ce qui concerne la transmission de l'électricité, je ne puis me dispenser de parler d'une expérience rapportée par M. Gray, & qui a certainement frappé tous ceux qui en ont entendu parler; elle consiste à suspendre un enfant dans une situation horizontale, par le moyen de deux cordes attachées au plancher; on approche pour lors le tube des pieds de l'enfant, & sa tête & son visage deviennent électriques; la vertu se communique même à une boule attachée à une baguette qu'il tient à la main. J'ai fait cette expérience; & m'étant servi de cordes ordinaires, la matiere électrique s'y attacha, & de là monta au plancher, en sorte qu'il n'y eut aucun mouvement dans les feuilles que je présentois au-dessous du visage de l'enfant: je reconnus aussi-tôt ce qui, selon toutes les apparences, m'empêchoit de réussir, & je mis des cordons de soie à la place

place des cordes ordinaires; l'événement fut tel que je l'avois prévu; le visage devint fort électrique lorsque l'on approchoit le tube des pieds, & les pieds lorsqu'on l'approchoit de la tête.

Je voulus me mettre à la place de l'enfant, pour voir si je n'en sentirois point sur le visage quelque effet de la matière électrique; l'expérience réussit tout aussi bien, mais je ne sentis que le mouvement des feuilles d'or qui venoient avec rapidité me frapper le visage. Je pris à ma main une baguette de 4 ou 5 pieds, au bout de laquelle étoit un peloton de laine, & les feuilles placées au-dessous de ce peloton furent attirées & repoussées très vivement.

Je mis ensuite sur les mêmes cordons de soie un lièvre dans sa peau, une botte de paille; l'un & l'autre devinrent électriques par un bout, lorsqu'on approcha le tube de l'autre; un fagot fit la même chose, & tous les petits brins, tant de paille que de bois, paroissoient également électriques: on voit par-là combien cette matière est abondante, puisqu'elle entoure & abreuve une si grande étendue de surface.

J'essayai de me remettre sur les mêmes cordons, & de le faire avec plus de commodité, ce qui me donna occasion de découvrir plusieurs Phénomènes surprenans, s'il est vrai que quelque chose doive encore surprendre dans une matière où le merveilleux se trouve à chaque pas. Je mis sur les cordons de soie une planche large d'un pied, & de quatre pieds de long, & je m'assis sur cette

cette planche, les jambes étendues le long de la planche ; on approcha alors le tube d'une de mes mains, & l'autre, sous laquelle on présenta des feuilles d'or, devint fort électrique. Je pris ensuite à ma main le carton sur lequel étoient posées les feuilles, & passant au-dessus la main de laquelle on venoit d'approcher le tube, les feuilles ne faisoient aucun mouvement ; mais une autre personne qui n'avoit point approché de moi, venant à présenter sa main au-dessus de ce carton, les feuilles y volèrent avec beaucoup de vivacité. Ayant ensuite rapproché le carton de mon visage pour voir s'il n'attireroit point les feuilles, elles ne firent aucun mouvement ; mais si-tôt que j'eus étendu le bras, & éloigné de mon corps le carton, les feuilles s'élancerent d'elles-mêmes en l'air, & ne retomberent point sur le carton : je répétai plusieurs fois cette expérience, qui réussit toujours de la même manière, & qui fut accompagnée de quelques autres faits singuliers que je supprime ici, mais qui trouveront leur place dans un autre Mémoire.

En faisant ces expériences, une personne voulut ramasser une feuille d'or qui s'étoit attachée à ma jambe ; dans l'instant qu'elle approcha sa main, elle entendit un petillement semblable à celui que fait le tube lorsqu'on en approche les doigts, elle sentit même une petite douleur comme une piquûre dans le doigt, & j'en sentis dans le même moment une pareille à la jambe. Toute mon attention fut alors portée à ce nouveau Phénomene, je voulus répéter l'expérience, & cela

eela se fit très facilement; car, si-tôt qu'on avoit approché le tube de mes jambes, ou de l'une de mes mains, si quelque autre personne approchoit la main, ou le bout du doigt, de mon visage, de mes mains, de mes jambes, ou de mon habit, il se faisoit sur le champ un, ou plusieurs petillemens semblables: mais ce qu'il y a de surprenant, c'est la douleur réelle que fait ce petillement à l'un & à l'autre; je ne la puis comparer qu'à une piquûre faite très brusquement, ou à une brulure d'étincelle. On s'attend assez que ces petillemens feront autant d'étincelles de lumière dans l'obscurité, cela est effectivement vrai; mais c'est dans un autre tems que je me suis proposé de parler de ce qui regarde la lumière des corps électriques; ce que je ne puis néanmoins m'empêcher de remarquer maintenant, c'est que les étincelles qui sortent immédiatement du tube, lorsqu'on en approche les doigts, n'excitent aucune sensation sur la main, au lieu que celles-là font une espece de douleur à l'un & à l'autre, &, ce qui paroît du tout incompréhensible, c'est qu'elles en font même à travers les habits; car étant habillé à mon ordinaire, si par l'approche de la main on excitoit un petillement vers mon dos, je le sentoisi aussi vivement que si c'eût été à la main, ou au visage.


Lorsqu'une autre personne s'est mise à ma place sur les cordes, & qu'en approchant l'une de mes mains de son corps, j'en avois fait sortir des étincelles à plusieurs reprises, ces petites piquûres répétées me causoient dans

dans la main une espece d'engourdissement, qui m'a paru durer quelque tems après: je sentoïis aussi quelquefois, en approchant des habits & du corps, cette espece de voile délié, ou de toile d'araignée, que l'on sent lorsqu'on approche le tube du visage. Cela prouve quelle prodigieuse quantité de matiere sort du tube lorsqu'il est frotté: mais cette matiere pénétre-t-elle l'intérieur des corps qu'on y expose? ou ne fait-elle qu'environner leur surface? c'est ce dont je n'ai point pu m'assurer.

Lorsque l'on s'est servi de bois, de papier, d'étoffe, d'ambre, ou de tout autre corps que de la main, pour passer au-dessus de mes bras, & de mes jambes, il ne s'est point fait de petillemens, si ce n'est avec les métaux, qui m'ont paru faire aussi bien que la main: on passa à plusieurs reprises sur l'une de mes jambes une plaque d'étain; cela excita un grand nombre de petillemens qui étoient moins sensibles à l'extérieur, que lorsqu'on ne présentoit que la main, ou le doigt; ils me causerent dans la jambe une espece d'ardeur moins forte, & à peu près semblable à celle que causent les orties. Cette conformité de l'effet des métaux avec celui de la main, tient sans doute à la propriété qu'ils ont de ne pouvoir être rendus électriques par le frottement: mais je n'entrerai pas maintenant dans un plus grand détail de ces expériences. On voit assez qu'il en reste encore un grand nombre à faire; c'est aussi ce que je compte ne pas négliger dans la suite.

Qu'il nous suffise, quans à présent, d'avoir
re-

[



reconnu & établi pour principe, que les corps les moins propres à devenir électriques par eux-mêmes, sont ceux qui sont le plus facilement attirés, & qui transmettent le plus loin, & le plus abondamment la matiere de l'électricité; au-lieu que ceux qui ont le plus de disposition à devenir électriques par eux-mêmes, sont les moins propres de tous à acquérir une électricité étrangere, & à la transmettre à un éloignement considerable. C'est toujours beaucoup que de découvrir quelques vérités sur une matiere aussi obscure, & aussi difficile par elle-même; nous verrons dans la suite si, en la considerant sous d'autres points de vue, comme nous nous le sommes proposé, nous ne parviendrons point à une connoissance plus exacte de cette merveilleuse propriété de la matiere.



*SUR LE MOUVEMENT
D'UNE BULLE D'AIR
QUI S'ELEVE DANS UNE LIQUEUR.*

Par M. DE MAÛPERTUIS.

LORSQU'UN globe d'un volume déterminé est plongé dans une liqueur plus pesante que lui, il remonte, & la force qui l'élève est la difference entre le poids d'un volume du fluide égal à lui, & son poids propre. Son volume étant toujours le même, cette

cette différence demeure la même, & le globe feroit uniformément accéléré, s'il n'éprouvoit aucune résistance; il remonteroit de la même manière que les corps tombent dans le vuide. Dans un milieu uniforme & également dense, la résistance d'un globe dépend de sa grandeur & de sa vitesse actuelle; si donc la grandeur du globe demeure la même, la résistance qu'il souffre ne reçoit de variation que de la vitesse. La vitesse du globe, la résistance qu'il éprouve, les espaces qu'il parcourt, & les tems pendant lesquels il les parcourt, ont été déterminés par M. Newton.

Mais si le volume d'un corps est variable, si un globe plongé dans une liqueur change continuellement de volume, les choses se passent fort différemment. La grandeur du globe changeant, la force motrice n'est plus constante, comme dans le premier cas; la résistance varie aussi, non seulement en ce qu'elle dépend de la vitesse qui n'est plus la même, mais encore en ce qu'elle dépend de la grandeur du globe.

Lorsque je cherchois dans la Nature quelque mouvement semblable à celui dont nous venons de parler, je vins à penser aux bulles d'air qui s'élèvent dans l'eau ou dans quelque autre liqueur. Quoique le sujet paroisse petit, il feroit difficile d'en trouver un autre qui réunît si bien la grande complication, & l'avantage d'avoir une exécution physique.

Voici quelques Lemmes qu'il faut se rappeler

pellier pour la Solution du Problème suivant.

I. Les liqueurs que nous connoissons ne sont point compressibles; elles ne sont ni plus ni moins denses, soit qu'on les presse avec un piston, soit qu'on les laisse stagnantes dans un vase; ni plus ni moins à une grande profondeur, ou vers la superficie.

II. L'Air est compréhible, & sa densité est proportionnelle au poids qui le comprime. D'où il suit, que les différens volumes d'une même quantité d'air sont en raison inverse des poids qui les compriment.

III. La force qui pousse en en-bas ou en en-haut un corps plongé dans un fluide, est la différence des poids des deux quantités de matiere, l'une contenue dans le corps, l'autre dans un volume du fluide égal au volume du corps.

IV. Une bulle d'Air plongée dans une liqueur, se dispose en sphere; & quoiqu'elle soit élevée vers la surface, elle conserve en s'élevant sa figure sphérique, ou fort approchante de la sphérique, pourvu que la bulle soit fort petite. La même chose s'observe dans une goutte de quelque liqueur que ce soit, qui ne se mêle point avec la liqueur dans laquelle elle est.

V. Une bulle d'air plongée dans une liqueur, est pressée par la liqueur qui est au-dessus & par toute l'atmosphère: mais on peut considérer cette bulle comme si elle n'étoit pressée que par la liqueur, & qu'elle y fût plongée plus avant. Et cette pression est proportionnelle à la hauteur de la colonne de liqueur supérieure à la bulle. D'où il
suit

fuit, que le volume de la bulle est en raison inverse de cette hauteur.

Soit $BCDE$ le vaisseau rempli de liqueur, dans lequel la bulle d'air est plongée en Q . Soit imaginé le vaisseau continué en AF , en sorte que le poids de la colonne de liqueur $ABEF$ représente le poids de l'atmosphère: il est clair que si le volume de la bulle est donné dans quelque profondeur connue, comme en C & $=b$; dans un point P il sera

$$= \frac{AC \times b}{AP}.$$

Cela posé, voici comme je résous ce Problème.

Déterminer la relation entre l'espace, la vitesse & le tems, pendant qu'une bulle d'air monte dans une liqueur dont la résistance est proportionnelle au quarré de la vitesse?

SOLUT. Soit $AC=a$, $AP=x$, la quantité de matiere contenue dans la bulle d'air $=q$, son volume en C , $=b$; la quantité de matiere dans un égal volume de la liqueur, $=Q$; l'on aura le volume de la bulle en P , $=\frac{ab}{x}$. Et la quantité de matiere dans un volume de liqueur b étant $=Q$, l'on aura la quantité de matiere dans un volume de liqueur $\frac{ab}{x}$, $=\frac{aQ}{x}$.

On a donc pour la difference entre la quantité de matiere contenue dans un volume de liqueur égal au volume de la bulle en Q , & la quantité de matiere dans la bulle, $\frac{aQ}{x} - q$;

&

& nommant g la gravité, on a $\frac{g a Q}{x} - g q$ pour la force qui élève la bulle en faisant abstraction de la résistance.

Mais la résistance qu'éprouve une Sphere mue dans la liqueur étant en raison directe de l'aire de son grand cercle & du quarré de sa vitesse (on néglige ici la densité du milieu, parce qu'elle est uniforme) on a pour

cette résistance $\left(\frac{a b}{x}\right)^{\frac{2}{3}}$

$\times m v v$; (v étant la vitesse, & m une quantité constante qui marque l'intensité de la résistance).

On a donc pour toute la force motrice de

la bulle $\frac{g a Q}{x} - g q - \frac{m a^{\frac{2}{3}} b^{\frac{2}{3}}}{x^{\frac{1}{3}}} v v$; & divisant cette

force par la masse à mouvoir, on a pour


la force accélératrice $\left(\frac{g a Q}{x} - g q - \frac{m a^{\frac{2}{3}} b^{\frac{2}{3}} v v}{x^{\frac{1}{3}}}\right)$

$: q$, qui multipliée par l'instant $\frac{dx}{v}$, donne la différentielle de la vitesse.

Mém. 1733.

R

On



On a donc $(\frac{gaQ}{x} - gp - \frac{ma^{\frac{2}{3}}b^{\frac{2}{3}}vv}{x^{\frac{2}{3}}}) \frac{dx}{qv} = -dv$ (je mets $-dv$ à cause que x augmente, la vitesse diminuant) ou $(gaQ - gqx - ma^{\frac{2}{3}}b^{\frac{2}{3}}x^{\frac{1}{3}}vv) dx = -qxv dv$, équation qu'il faut intégrer.

Je me fers pour cela de la méthode que j'ai donnée dans les Mémoires de 1732; & multipliant l'équation par A , je lui donne cette forme,

$$A(gaQ - gqx)dx = -qAxv dv + ma^{\frac{2}{3}}b^{\frac{2}{3}}Ax^{\frac{1}{3}}vv dx, \\ \text{dont l'intégrale est } \int A(gaQ - gqx) dx \\ = -\frac{q}{2} Axvv + \frac{q}{2} \int Avv dx + \frac{q}{2} \int xvv dA \\ + ma^{\frac{2}{3}}b^{\frac{2}{3}} \int Avv x^{\frac{1}{3}} dx. \text{ Faisant les trois der-} \\ \text{niers termes de cette intégrale } = 0, \text{ j'ai} \\ qx dA + qA dx = -2ma^{\frac{2}{3}}b^{\frac{2}{3}}Ax^{\frac{1}{3}} dx, \text{ ou} \\ \frac{q dA}{A} + \frac{q dx}{x} = -2ma^{\frac{2}{3}}b^{\frac{2}{3}}x^{-\frac{2}{3}} dx, \text{ dont l'in-} \\ \text{tégrale est } q \ln A + q \ln x = -6ma^{\frac{2}{3}}b^{\frac{2}{3}}x^{\frac{1}{3}}, \text{ ou} \\ \text{(prenant } c \text{ pour le nombre dont le logarith-} \\ \text{me } = 1) A^q x^q = c - 6ma^{\frac{2}{3}}b^{\frac{2}{3}}x^{\frac{1}{3}}$$

$$\text{me } = 1) A^q x^q = c$$

$$- 6ma^{\frac{2}{3}}b^{\frac{2}{3}}x^{\frac{1}{3}} \\ \text{ou } A = x^{-\frac{1}{3}} c$$

Remettant cette valeur de A dans l'équation

$\int A$

$\int A(gaQ - gqx) dx = -\frac{q}{2} Axvv$, l'on a

$$\int (gaQx^{-1}c^{\frac{2}{3}}b^{\frac{2}{3}}x^{\frac{1}{3}} - gqc^{\frac{2}{3}}b^{\frac{2}{3}}x^{\frac{1}{3}}) dx$$

$$= -\frac{q}{2} c^{\frac{2}{3}}b^{\frac{2}{3}}x^{\frac{1}{3}} \times vv;$$

$$\text{ou } vv = -\frac{2}{q} c^{\frac{2}{3}}b^{\frac{2}{3}}x^{\frac{1}{3}} \int [(gaQx^{-1} - gq) \\ \times c^{\frac{2}{3}}b^{\frac{2}{3}}x^{\frac{1}{3}} \times dx].$$

D'où l'on tire la relation entre l'espace & la vitesse, en supposant la quadrature des courbes. On a aussi la résistance qu'éprouve la bulle dans chaque point de l'espace, puisque cette résistance est proportionnelle au quarré de la vitesse. Enfin on a le tems

$$t = \frac{dx \sqrt{q}}{3ma^{\frac{2}{3}}b^{\frac{2}{3}}x^{\frac{1}{3}}:q \sqrt{[-2/((gaQx^{-1} - gq) \times c^{\frac{2}{3}}b^{\frac{2}{3}}x^{\frac{1}{3}}:q \times dx)]}}$$

SUR LES DIFFERENTES MANIERES
DE RENDRE

LE TARTRE SOLUBLE.

SECONDE PARTIE.

Par M^{rs}. DU HAMEL & GROSSE. *

NOUS avons annoncé dans la première partie de ce Mémoire, que les Cendres lessivées, la Chaux d'Ecaille d'Huitre, ou les Ecailles d'Huitres calcinées, & plusieurs autres matières étoient du nombre de celles, que nous nous étions proposé d'examiner avec le Crystal de Tartre: mais les expériences que nous avons faites à ce sujet n'étant point achevées lorsque nous avons lu notre premier Mémoire, nous avons différé jusqu'à ce jour à en rendre compte à l'Académie, pour les joindre avec quelques autres expériences qui nous ont paru appartenir au même sujet, ce qui nous a fourni la matière de cette seconde partie.

Ayant détaillé dans la première partie de ce Mémoire, ce que les Ecailles d'Huitres non-calcinées avoient produit avec le Crystal de Tartre, il n'est plus question maintenant que de les examiner après qu'elles ont été ré-

réduites en Chaux par une violente calcination.

Pour les avoir en cet état, nous les avons tenues dans un creuset, au milieu d'un bon feu de charbon, pendant plus de six heures; alors elles avoient un goût salé assez approchant de celui du sel marin: & en effet comment pourroit-on imaginer, que ces écailles ne participassent point du sel marin, quand on fait attention au lieu d'où on les tire, & où elles ont été formées, joint à ce que dans un diploë, qui est au milieu de chaque écaille, il y a une cavité qui contient une eau extrêmement salée?

Cette premiere calcination ne nous parut pas suffisante, parce que cette chaux étoit encore un peu noire, à l'occasion, sans doute, d'une portion de matiere grasse que le feu n'avoit pu enlever, tant à cause de l'interposition du creuset, qu'à cause de la grande épaisseur de la matiere qui étoit en calcination.

Cela nous détermina à les calciner de nouveau pendant encore six heures, mais dans un creuset plat & plus ouvert, afin que la matiere grasse pût s'échapper plus aisément.

Après cette seconde calcination, ces écailles étant réduites en une poudre fort blanche, nous en avons mis une partie dans une bassine, sur le feu, avec de l'eau, & après l'avoir fait bouillir, nous y avons jetté de la crème de tartre à différentes reprises, & il s'y en est dissous une bonne quantité, puisqu'environ 5 onces de cette chaux ont absorbé 15 onces de crystal de tartre.

Lorsque la liqueur en a été rassasiée, ce que nous avons reconnu quand il a commencé à se précipiter du crystal de tartre au fond du vaisseau, nous l'avons filtrée, & nous en avons ensuite évaporé une partie. Dans cette évaporation, il s'est précipité une portion du crystal de tartre qui n'étoit apparemment que médiocrement unie avec la terre alkalinne; une petite portion de ce crystal de tartre pourroit même bien n'avoir jamais contracté aucune union avec la terre alkaline, & s'être soutenue d'elle-même dans la liqueur; comme il y a toujours une petite portion de crystal de tartre qui se soutient dans l'eau froide, & les liqueurs chargées de sels étant plus pesantes, peut-être le crystal de tartre s'y soutient-il en plus grande quantité.

Cependant ce précipité nous obligea de filtrer de nouveau la liqueur, & après cette seconde filtration, il ne s'est plus précipité de crystal de tartre, & nous en avons retiré une bonne quantité de beau tartre soluble, dont les cristaux étoient un peu plus gros, mais au reste assez semblables à ceux que nous avons décrits en parlant de la chaux ordinaire.

Nous avons déjà dit que nous soupçonnions que cette chaux d'huitre contenoit du sel marin, tant à cause du lieu où ces écailles sont formées, qu'à cause du goût de sel marin que nous avons senti, en mettant de cette chaux sur la langue après sa première calcination, & enfin à cause de cette eau extrêmement salée que nous avons dit qu'on trouvoit dans le diploë des écailles d'huitre;

mais

mais bien plus, parce qu'après la première calcination de nos écailles, en ayant dissous un peu dans de l'eau, cette dissolution a précipité en forme de caillé la dissolution d'argent faite par l'esprit de nitre, & ce précipité étant fondu a donné une Lune cornée, ce qui démontre la présence du sel marin, ou au moins de son acide. Tout cela nous rendoit attentifs à examiner les cristaux à mesure qu'ils se formoient, mais nous n'y avons jamais apperçu le moindre cube de sel marin, ce qui nous fait soupçonner que l'acide de ce sel s'en est allé dans la calcination, à l'aide de la matière grasse, comme M. Grosse a indiqué que cela pouvoit arriver, en parlant de la distillation de l'esprit de sel sans addition; & c'est peut-être un peu de la base du sel marin qui se joint à la terre alkaline, qui fait que les cristaux que nous avons obtenus par les écailles d'huitre, sont plus gros que ceux que nous avons eus avec la chaux ordinaire, ou la craye.

L'on jugera peut-être, que nous aurions dû suivre plus loin l'examen de cette chaux, par rapport au sel marin; mais il nous a paru qu'il convenoit mieux de réserver cet examen pour le Mémoire que nous avons promis dès l'année dernière, sur la nature de la chaux.

Au reste, il est bon de remarquer, que comme avec cette chaux on peut faire un fort beau tartre soluble, l'on pourroit peut-être la substituer au sel de tartre qu'on emploie ordinairement pour cette opération, & qui coûte au moins sept à huit francs la livre.

Un bon Praticien Allemand, nommé Ludovici, dans son *Traité de la Pharmacie réformée pour le goût du Siecle*, p. 211, édition Latine d'Amsterdam, parlant de la Colique Néphrétique, dit que plusieurs personnes ont employé comme un bon Néphrétique, une teinture tirée par le moyen de l'esprit de vin, du mélange du tartre avec la chaux, & que ce remede n'est pas à mépriser. Il nous paroît qu'on doit faire par ce procédé un remede savoneux. Voici les termes de l'Auteur, *Alis liquorem ex una tartari & duabus calcis vivæ partibus excoctum, & post filtraturationem inspissatum, cum spiritu vini extrahendo tincturam non penitus rejiculam parant.*

Pour avoir plusieurs exemples des chaux tirées du regne animal, nous avons cru ne devoir pas négliger d'examiner les cornes de cerf calcinées: elles se dissolvent par l'acide du vinaigre, & les ayant traitées avec le crystal de tartre, comme les autres matieres dont nous avons parlé, elles nous ont aussi donné un beau tartre soluble.

Les cendres étant des matieres calcinées, nous avons cru, quoique ce soit des matieres végétales, les devoir ranger avec les chaux, & qu'en cette qualité, elles étoient du nombre des matieres que nous nous étions proposé d'examiner avec le crystal de tartre. Mais comme les cendres contiennent des sels, nous avons commencé par les en priver à différentes reprises, par l'eau bouillante, afin de n'en avoir que la terre bien édulcorée, telle qu'on l'employe pour les coupelles, ce qui étoit la seule chose que nous voulions exami-

examiner avec le crystal de tartre, sachant bien d'ailleurs ce que devoient produire avec lui les sels alkalis ou moyens que l'on a coutume de trouver dans les cendres. Nous avons donc traité une portion de ces cendres édulcorées avec le crystal de tartre, suivant le même procédé que nous avons rapporté dans les expériences précédentes, & elles ont dissous une bonne quantité de crystal de tartre, & après les avoir foulées de ce sel essentiel, nous avons procédé à la filtration, comme nous avions fait pour les autres matieres, & il est passé par le papier une liqueur très salée, pendant qu'une portion assez considerable des cendres est restée sur le filtre. Il n'y a donc qu'une partie des cendres qui soit dissoluble par la crème de tartre: cette circonstance nous a engagé à examiner les cendres en particulier, & avec plus d'attention. Mais outre que nous ne sommes pas encore satisfaits sur cette matiere, elle nous a paru trop étrangere au sujet de ce Mémoire, pour la discuter ici au long, & avec exactitude; ainsi nous nous bornerons pour le présent, à ce que nous avons pu remarquer, en les traitant avec le tartre.

Lorsqu'on lessive des cendres, il y en a une partie, qui étant fine & légère, se mêle aisément avec l'eau; elle s'y soutient assez longtems, & quand elle se précipite, elle forme au fond une espece de boue fine & douce au toucher; c'est cette partie des cendres, qui s'incorpore avec le crystal de tartre, pour faire le tartre soluble.

Au contraire, il y a une autre portion de
R 5 ces

ces cendres, qui est comme grainée, qui est plus grossière que la précédente, qui est rude au toucher, qui ne se mêle avec l'eau presque que comme du sable, & se précipite dans l'instant; c'est cette portion qui est indissoluble & qui reste sur le filtre.

Peut-être croiroit-on, que cette partie graveleuse des cendres seroit effectivement un gravier, qui auroit été dans l'écorce des bois qu'on a brûlés; mais voici des expériences qui prouvent que la chose n'est pas ainsi.

La première, qui a été faite chez M. Grosse, & sous ses yeux, est, qu'ayant ôté toute la superficie de plusieurs morceaux de bois, pour se mettre à l'abri de tous les soupçons qu'on auroit pu avoir, à l'occasion du sable ou de la terre, qui auroit été engagée & retenue dans les rimes & les fentes de l'écorce & du bois, l'on a brûlé ce bois avec précaution dans un fourneau d'essai bien net: il faut remarquer que le fourneau étoit un fourneau d'essai; parce qu'étant d'une seule pièce, on ne pouvoit pas l'accuser d'avoir fourni du sable, comme auroient pu faire ceux qui étoient de plusieurs pièces, sont joints avec du lut; & malgré toutes ces précautions, les cendres se sont trouvées pareilles à celles dont nous venons de parler.

Outre cela, quand on calcine vivement plusieurs fois cette partie des cendres, qui est comme du gravier, une partie qui étoit encore charboneuse devient fine, légère, & capable de s'unir à la crème de tartre; mais il y en a toujours une autre qui reste dans son premier état: ce qui nous fait croire qu'il y

a dans les cendres des parties terreuses qui ont perdu tous leurs acides dans le tems de l'ustion , ou de la calcination , ce qui fait qu'elles peuvent être pénétrées par les moindres acides , comme celui du crystal de tartre ou du vinaigre ; au-lieu que dans l'autre l'acide s'y est concentré , & en quelque maniere fixé , à peu près comme cela arrive dans la rétidence de la distillation de l'esprit de nitre , qu'on fait avec l'argile : peut-être aussi se fait-il une espece de vitrification , mais alors ces matieres n'ont (du moins jusqu'à présent) aucuns des caracteres propres aux sels , ni la saveur , ni la dissolubilité dans l'eau , & en même tems les acides , sur-tout les foibles , comme celui du tartre & du vinaigre , n'ont point d'action sur elles. Au reste , ce que nous venons de dire n'est que pour faire sentir une difference essentielle , & assez singuliere , que nous avons remarquée dans les cendres , & en attendant que nous soyons en état de parler plus positivement sur une matiere qui nous paroît mériter d'être suivie avec exactitude , nous revenons à notre expérience.

Les cendres & le crystal de tartre s'étant donc dissous mutuellement , la liqueur qui a passé par le papier gris étoit , comme nous l'avons déjà dit , limpide & fort salée ; cependant en l'évaporant lentement pour la cristalliser , elle s'est troublée considérablement , & il s'est précipité une bonne quantité , tant du crystal de tartre que des cendres , ce qui nous a obligé de filtrer cette liqueur pour une seconde fois , & ensuite une troisieme & une

quatrième, parce qu'en continuant d'évaporer, il se précipitoit toujours & du crystal de tartre & des cendres. Enfin la liqueur est devenue d'un jaune obscur, il ne s'est plus rien précipité, & elle a donné des cristaux comme dans les expériences précédentes, mais en petite quantité; l'eau-mere furnageante est devenue presque noire, a pris un goût alkalin, & en cet état a fermenté & donné des cristaux avec le vinaigre distillé; enfin une portion de cette eau-mere étant conservée pendant plusieurs mois est devenue fort épaisse, comme syrupeuse, & si grasse, qu'elle ne fermentoit plus sensiblement avec le vinaigre, & même foiblement avec l'huile de vitriol, quoiqu'elle ait conservé un petit goût lixiviel.

Il ne laisse pas de paroître ici singulier, qu'une liqueur qui avoit d'abord paru surchargée de crystal de tartre, puisqu'il s'en est précipité dans les différentes évaporations, devienne ensuite alkaline, & capable de se charger de nouveaux acides.

Peut-être cela vient-il des différens degrés de dissolubilité des parties qui composent les cendres, la craye, &c.

La partie très dissoluble s'unit tout d'un coup avec la crème de tartre, & donne des cristaux; l'autre partie qui est entièrement indissoluble tombe sur le champ au fond, mais celles qui ne peuvent être pénétrées des acides que par une longue digestion, ne contractent qu'une union imparfaite avec la crème de tartre, & dans le tems de l'évaporation une partie de cette terre peut être dissoute par le crystal de tartre, ce qui rendra la li-
queur.

queur alkaline, comme nous allons le prouver dans un moment ; mais la quantité du fluide diminuant par l'évaporation, la meilleure partie de cette terre & du cryſtal de tartre ſe précipite pêle-mêle.

Nous avons dit dans la première partie de ce Mémoire, & nous venons de le répéter par occaſion, que quand le cryſtal de tartre eſt ſurchargé de parties terreuſes, il prend & le goût, & même quelque choſe du caractère des ſels alkalis.

Ce fait nous a paru aſſez ſingulier pour être vérifié par de nouvelles expériences ; pour cela, nous avons pris deux onces de craye de Champagne, ce qui auroit ſuffi pour rendre ſoluble preſque une livre de cryſtal de tartre ; nous avons mêlé cette craye avec pareil poids de cryſtal de tartre, & après les avoir fait bouillir, & les avoir tenus en digeſtion ſur un bain de ſable, nous en avons filtré la liqueur, qui, étant évaporée, a pris un goût alkaſin très ſenſible. Nous avons verſé deſſus du vinaigre diſtillé, qui a excité une fermentation aſſez vive ; mais ce qu'il eſt encore à propos de remarquer, c'eſt que dans cette fermentation il ſ'eſt fait un précipité conſidérable de preſque toute la crème de tartre. Nous parlerons plus amplement dans la ſuite de ce précipité ; ainſi il n'eſt queſtion ici que de la liqueur qui étant filtrée de nouveau a donné des cryſtaux, ce que n'auroit pas produit la craye avec le vinaigre, ſans avoir été ouverte, ou même ſans avoir reçu quelque choſe du tartre, qui fait qu'elle peut former des cryſtaux, au lieu de ces feuillets ou vé-

gétations qu'elle auroit fait sans cela. Nous avons répété cette expérience, avec cette différence, que la chaux a été substituée à la craye, & le succès a été le même que celui de l'expérience que nous venons de rapporter.

Ces expériences nous ont fait faire des réflexions sur les différentes bases alkales des sels, & sur une comparaison qu'on pourroit faire entre les alkalis terreux & les salins ; mais cette matière étant un peu étrangère à celle que nous nous étions proposé d'examiner, nous la traiterons dans un Mémoire particulier, que nous ferons suivre de près celui-ci, pour qu'on ne perde point l'idée des expériences que nous venons de rapporter, & dont nous comptons faire usage dans ce Mémoire. Ainsi nous terminerons celui-ci par quelques expériences que nous avons faites sur les différentes espèces de tartre soluble, tant à l'égard de leur différent degré de dissolubilité, que sur le plus ou le moins de facilité que l'on a pour en retirer la crème de tartre.

L'on fait, après ce que nous avons dit dans ce Mémoire, que le tartre peut être rendu soluble, non-seulement par des sels alkalis, comme le sel de tartre, ou le sel de soude, ou le borax, mais encore par les terres alkales, soit qu'on les prenne dans le regne minéral, comme les chaux, les crayes, &c. ou dans le regne animal, comme les écailles d'huitre calcinées ou non calcinées, les cornes de cerf calcinées, &c. ou enfin dans le regne végétal, comme les cendres lessivées.

Nous

Nous avons outre cela rapporté dans la première partie de ce Mémoire, plusieurs expériences qui prouvent qu'on peut retirer la crème de tartre de tous ces tartres solubles, en la précipitant par les acides, ou du vitriol, ou du nitre, ou du sel marin, Ces aides étant plus puissans que celui qui est contenu dans la crème de tartre, ils commencent par s'emparer du sel alkali, ou de la terre alkaline qui le rendoient soluble, ce qui régénere la crème de tartre; & si l'on n'a pas soin de la retirer d'avec ces acides, ils agissent peu à peu sur la propre base de la crème de tartre, en chassant l'acide végétal, & la décomposent entierement. Tout cela s'accorde à merveille avec la supériorité que l'on reconnoit être entre les differens acides.

Mais ce qui nous a paru de fort singulier, c'est que le vinaigre distillé fasse aussi cette précipitation; car enfin, les acides de même genre n'ont aucun pouvoir les uns sur les autres; or, l'acide du vinaigre est le même que celui du tartre, c'est toujours celui du vin; cependant le vinaigre distillé ordinaire précipite la crème de tartre de tous les tartres solubles, excepté de celui qui est fait à la manière de M. le Fevre par le borax. Voici le détail de nos expériences.

Nous avons mis de la matiere gommeuse de M. le Fevre; du sel de Seignette, du sel végétal, & de notre tartre soluble par les écailles d'huitres, par la craye, par les cendres, dans autant de verres differens, & nous avons versé dessus de l'eau bouillante pour dissoudre tous ces sels. La dissolution finie,

nous

nous avons jetté peu à peu, & à différentes reprises, sur chaque verre du vinaigre distillé; ce qui a excité une fermentation plus ou moins sensible, & ensuite occasioné une précipitation plus ou moins prompte dans chaque verre, excepté dans celui où étoit la matiere gommeuse de M. le Fevre. Le précipité paroissoit au fond du verre comme une poudre blanche recouverte d'une couche d'assez gros crystaux de crème de tartre, ce qui nous fit penser d'abord (quoique la chose nous parût presque impossible) que le précipité contenoit & les terres alkalines, & la crème de tartre; mais ayant versé dessus d'abord de l'huile de tartre par défaiillance, & ensuite simplement de l'eau chaude, le tout s'est dissous, avec cette différence, que l'huile de tartre a agi avec effervescence, & l'eau sans effervescence, ce qui nous a fait connoître que presque tout le précipité étoit de la crème de tartre; & en effet, à mesure que l'eau s'est refroidie, la crème de tartre s'est crySTALLISÉE, ou au fond du verre, ou à la superficie de la liqueur. Nous remarquâmes cependant que la liqueur étoit restée fort acide après s'être refroidie, ce qui nous engagea à l'évaporer lentement, pour voir ce qu'elle contenoit, & nous en retirâmes quelques crystaux assez confus, extrêmement acides, & qui se fondoient dans l'eau froide; ce qui nous les fait regarder comme un tartre soluble surchargé d'acide par le vinaigre. Nous voilà donc bien sûrs que le précipité est presque tout crystal de tartre; mais comment le vinaigre a-t-il pu l'emporter sur l'acide du tartre, puisqu'ils sont tous deux l'acide du vin?

Pour

Pour rendre raison de ce fait, il faut faire attention que le tartre soluble est un sel essentiel acide, qui s'est surchargé d'une terre, ou d'un sel alkali, & est ainsi devenu un sel tout différent de ce qu'il étoit auparavant; de sorte qu'il faut distinguer deux bases dans le tartre soluble, l'une qui a toujours été unie à la crème de tartre dès sa première formation dans le vin, qui lui est naturelle, & à laquelle l'acide du tartre est intimement uni; & le vinaigre distillé n'a aucune action sur cette base.

Mais la dose de cette terre est peu considérable dans la crème de tartre, par proportion à celle de l'acide, qui est peut-être retenu en si grande quantité dans ce sel par la matière grasse qui y abonde.

Quoi qu'il en soit, il est bien sûr que dans ce sel l'acide n'est pas totalement engagé dans une base alkaline, puisqu'il se fait sentir au goût, qu'il fermente avec les alkalis, qu'il fait la dissolution de plusieurs terres, & qu'il s'unit avec ces matières au point de former un sel nouveau: voilà donc ce qui fait la seconde base des tartres solubles, mais à laquelle l'acide du tartre n'est pas aussi intimement uni qu'à la sienne propre; c'est, pour ainsi dire, une base d'adoption qu'il abandonne aux moindres acides, comme le vinaigre distillé; mais se réservant toujours sa base naturelle, dont il ne se dessaisit, pour ainsi parler, qu'à la dernière extrémité, quand il y est contraint par un acide plus puissant; ainsi le crystal de tartre après avoir abandonné la terre étrangère qui le rendoit soluble, reprend.

prend sa premiere forme, & devient tel qu'il étoit avant que d'avoir été associé avec les matieres alkalines. Et il arrive ici à peu près la même chose, que quand on précipite le souphre d'un *hepar sulphuris* avec l'esprit de souphre.

Il est bon de remarquer que nous avons employé pour ces expériences trois differens vinaigres distillés, dont nous étions bien sûrs; car comme les Vinaigriers sont accusés d'employer quelquefois de l'huile de vitriol pour augmenter la force de leur vinaigre, la précipitation de la crème de tartre n'auroit plus alors rien de singulier.

Mais tous les tartres solubles n'abandonnent pas leur nouvelle base avec une égale facilité; & voici dans quel ordre il nous a paru que cela se faisoit, en commençant par ceux où la précipitation se fait le plus abondamment, & le plus promptement.

- 1°. Le tartre soluble fait par les cendres.
- 2°. Celui qui l'est par la craye.
- 3°. Par les écailles d'huitres non calcinées.
- 4°. Par la chaux.
- 5°. Par les écailles d'huitres calcinées.
- 6°. Par le sel de tartre.
- 7°. Par le sel de soude.
- 8°. Enfin, le tartre rendu soluble par le borax ne se précipite point par le vinaigre distillé.

Maintenant si l'on demande d'où vient cette difference entre les tartres solubles, il nous paroît, sans vouloir trop approfondir cette question, qu'on peut l'attribuer à l'union plus ou moins intime de ces differentes bases al-
ka-

kalines, avec l'acide de la crème de tartre, ou, ce qui nous paroît à peu près la même chose, aux differens degrés d'alkalicité des différentes matieres qu'on employe pour faire ces tartres solubles.

Nous ne croyons pas devoir omettre une autre difference que nous avons encore remarquée entre tous ces tartres solubles : elle regarde leurs differens degrés de solubilité, ou le plus ou moins de facilité qu'ils ont à se fondre. Ceux qui sont faits avec les cendres lessivées, les crayes & la chaux, se fondent à la moindre humidité. Ceux où l'on a employé les écailles d'huitre calcinées ou le sel de tartre, s'humectent aussi à l'air, & il n'y a que le sel de Seignette, & la matiere gommeuse de M. le Fevre, qui supportent les humidités sans se résoudre en liqueur. L'on pourroit dire, pour rendre raison de cette observation, que le borax & le sel de soude qui servent de base à ces deux derniers tartres solubles tombent plutôt en poussiere, que de se résoudre en liqueur, au-lieu que les écailles d'huitres s'humectent à l'air, & que le sel de tartre se résout totalement en liqueur.

Mais la craye, les cendres & la chaux ne s'humectent point à l'air; cependant les tartres qui sont solubles par ces matieres, sont ceux qui s'humectent le plus aisément. Cette remarque nous a fait prêter attention à ce qui pouvoit rendre les sels si sensibles à l'humidité de l'air, & il nous a paru que cela dépendoit ordinairement de la trop grande dose de quelqu'une des matieres qui les composent;

or

or ces matieres sont dans la plupart des sels, l'acide, la base alkaline & la matiere grasse. Il reste donc à rapporter quelques expériences qui prouvent que l'abondance de quelqu'une de ces matieres rend les sels très sensibles à l'humidité de l'air, c'est ce qui se fera par les exemples suivans.

1°. Si l'acide est surabondant dans le sel de Glauber, ou dans le tartre vitriolé, comme on le demandoit autrefois acidulé, ces sels sont toujours humides.

2°. Si l'on surcharge un sel de terre alkaline, il devient très sensible à l'humidité de l'air, comme on le voit dans nos tartres solubles par la craye, les cendres, &c.

3°. Enfin, les sels extrêmement gras, comme la terre foliée de tartre, se résolvent très aisément en liqueur; lorsque le sel marin est gris, tel qu'on le vend à la Gabelle, il s'humecte aisément, ce qui n'arrive pas, quand on l'a filtré & crySTALLISÉ avec soin; le sel de Seignette même qui résiste aux plus grandes humidités, quand il est bien fait, si l'on en précipite trop la crySTALLISATION par l'évaporation, il se fond très aisément à l'air.

Quoique dans toutes les expériences que nous venons de rapporter, il paroisse qu'il y a dans chacun de ces sels une matiere qui domine sur les autres, nous ne prétendons cependant pas décider absolument que c'est elle qui rend ces sels si sensibles à l'humidité. Mais il nous a paru que c'étoit une circonstance qu'il étoit bon de remarquer en passant, sans prétendre trop approfondir une question, qui seroit d'une longue discussion, & qui est assez

assez différente de celle que nous nous étions proposé d'examiner dans ce Mémoire.



METHODE GENERALE

Pour déterminer la nature des Courbes formées par la Section des Solides quelconques.

Par M. P I T O T. *

M. CASSINI ayant demandé aux Géomètres quelle étoit la Courbe de la commune section de la surface de la Terre par un plan tiré dans quelle direction on voudra, en supposant la Terre un Sphéroïde elliptique; quoique la question ne fût pas difficile à résoudre, j'ai cru que la simplicité & la généralité de la Méthode dont je me suis servi, méritoit d'être donnée.

Un Solide formé par la révolution d'une Courbe quelconque autour de son axe, ou de quelque autre ligne, étant donné, on trouvera, par cette Méthode, tout d'un coup, la Courbe de la commune Section de la surface de ce Solide, coupé par un plan, dans toutes sortes de directions.

† Le solide *FEI*, formé par la révolution d'une courbe quelconque, étant coupé par un plan *AMB*; pour déterminer la nature de la courbe *MA* de la section du solide par ce plan, il faut supposer que le solide

* 3 Juin 1732. Fig. 1. & 2.

l'ide est coupé par le plan MNO perpendiculaire à son axe de révolution ED ; il est clair que cette section est toujours un cercle. Ayant mené AH perpendiculaire à l'axe de révolution, & par le point P où l'axe ACB coupe le diamètre NO , la perpendiculaire PM , cette perpendiculaire fera une ordonnée de la courbe MAV , & AP son abscisse correspondante. Soit nommé les données CE, c ; AH, f ; AC, g ; CH, b ; & les indéterminées CP, x ; PM, y ; ED, z ; DN, u .

Les triangles semblables ACH, PCD , donnent $AC, g \cdot CH, b :: CP, x \cdot CD, \frac{bx}{g}$.

Donc $ED, z = \frac{bx}{g} - c$, ou $c - \frac{bx}{g}$. On

a aussi $AC, g \cdot AH, f :: CP, x \cdot PD, \frac{fx}{x}$. Donc

$NP = u - \frac{fx}{g}$, & $PO = u + \frac{fx}{g}$; mais à

cause du cercle $\overline{ND}^2 - \overline{PD}^2 = \overline{PM}^2$, ce qui donne $uu - \frac{ffxx}{gg} = yy$, ou $uu = yy + \frac{ffxx}{gg}$.

Nous avons donc les expressions de z & u en x & y . Substituant ces valeurs dans l'équation de la courbe $FNEI$, on aura une équation dans laquelle il n'y aura que les variables x & y , & qui sera par conséquent l'équation de la courbe MAV .

Si, par exemple, l'équation de la courbe FEI est $z^2 = auu - zuu$, l'équation de la

courbe MAV sera (Fig. 1.) $\frac{bx - cg}{g} = \frac{bx - cg}{g} + \frac{ffxx}{gg} - \frac{bx - cg}{g} \cdot \frac{bx - cg}{g}$

$$= ggyy + ffxx, \& (Fig. 2.) \frac{cg - bx}{ag - cg + bx}$$

$$= ggyy + ffxx.$$

Application de la Méthode.

La Terre étant un Sphéroïde allongé ou applati vers les poles, la commune section de sa surface & d'un plan qui la coupe obliquement est une Ellipse.

Que la Terre soit un Sphéroïde elliptique allongé ou raccourci vers les poles, il est certain que les Méridiens sont toujours des Ellipses. * Ainsi *E I F L* étant un Méridien, si la Terre est un Sphéroïde allongé, *E* & *F* feront les poles, & la ligne *EF* l'axe: si au contraire elle est un Sphéroïde applati, *L* & *I* feront les poles & *L I* l'axe. Nous pouvons donc renfermer ici les deux cas en un seul.

Si l'on suppose que le Sphéroïde elliptique *AEBL* est coupé par le plan *AMSVB*, pour démontrer que la commune section *AMB V* est une Ellipse, & déterminer les axes & les foyers de cette Ellipse, je coupe le Sphéroïde par un plan quelconque *NMO* perpendiculaire à son axe *EF*; il est évident que la section de ce plan & du Sphéroïde est un cercle. Je tire l'ordonnée *AH*, & du point d'intersection *P* des diamètres *AB*, *NO*, la perpendiculaire *PM*.

Soit nommé les données *EK*, *a*; *LK*, *b*; *EC*, *c*; *AH*, *f*; *AC*, *g*; *CH*, *h*; & les indé-

ter-

* Fig. 1. & 4.

terminées $CP, x; PM, y; KD, z; DN, u$;
les triangles semblables ACH, PCD , donnent

$$CA, g. CH, b :: CP, x. CD = \frac{bx}{g}.$$

$$AC, g. AH, f :: PC, x. PD = \frac{fx}{g}.$$

$$\text{Donc } NP = u - \frac{fx}{g} \text{ \& } PO = u + \frac{fx}{g};$$

mais à cause du cercle $\overline{NB} - \overline{PD} = \overline{PM}^2$, ce
qui donne $uu - \frac{ffxx}{gg} = yy$, & l'équation à

l'Ellipse $EIFL$ est $aa - zz = \frac{aauu}{bb}$. Or

$$z = a - c + \frac{bx}{g}, \text{ ou (Fig. 2.) } z = a - c - \frac{bx}{g},$$

dont le quarré étant substitué dans $aa - zz$
 $= \frac{aauu}{bb}$ à la place de zz , on aura une é-

quation de laquelle on tirera la valeur de uu .
Substituant enfin la valeur de uu dans uu

$$- \frac{ffxx}{gg} = yy, \text{ on aura l'équation de la cour-}$$

$$\text{be } AMBV; \frac{2abbcgg - bbccgg}{aaff + bbbb} + \frac{2bbcgbx - 2abgbx}{aaff + bbbb}$$

$$- xx = \frac{aaggyy}{aaff + bbbb}, \text{ \& dans le second cas}$$

$$\text{on aura } \frac{2abgbx - 2bbcgbx - 2abbcgg - bbccgg}{aaff - bbbb}$$

$$- xx = \frac{aaggyy}{aaff - bbbb}. \text{ Il est clair que cette é-}$$

quation est à une Ellipse dont l'origine des
indéterminées n'est point au centre.

Si le plan de la section passoit par le centre

K

K de la Terre, le point C tomberoit en K ; alors c étant égal à a , l'équation deviendrait

$$\frac{aabbgg}{aaff+bbbb} - xx = \frac{aaggyy}{aaff+bbbb} \text{ qui est en-}$$

core une équation à l'Ellipse, mais dont l'origine des indéterminées est au centre, n'ayant point de second terme, ce que l'on voit d'ailleurs. Or si dans ce cas on veut trouver l'axe conjugué à l'axe AB , on fera, suivant la méthode ordinaire, cette proportion $aagg$

$$. aaff+bbbb :: \frac{aabbgg}{aaff+bbbb} . bb; \text{ ainsi } b$$

est le demi-axe conjugué, ce que l'on peut voir d'ailleurs, car il est bien évident que l'ordonnée au centre K doit être égale à $KL = b$.

Si la Terre étoit sphérique, EFL seroit un cercle, & mettant a à la place de b , & gg étant toujours égale à $ff+bb$, l'équation précédente deviendrait $aa-xx=yy$, qui est l'équation de ce cercle.

Ayant reconnu que la commune section de la surface d'un Sphéroïde allongé ou raccourci par un plan quelconque est toujours une Ellipse, je nomme l'axe AB d'une section particulière $2p$, son axe conjugué TV , $2q$, & prenant l'origine des indéterminées au centre S de la section, SP fera x , & PM , y . L'équation de l'Ellipse AMB sera $pp-xx = \frac{ppyy}{qq}$.

Dans chaque section on connoitra l'axe AB , $2p$; mais pour déterminer l'axe conjugué TV , & par conséquent les foyers de l'Ellipse, je remarque que l'ordonnée au point C est commune aux deux Ellipses EFL ,

Mém. 1733.

S

AMB ;

$AMBV$; or EC étant c , on aura par la premiere $\frac{b}{a} \sqrt{2ac - cc} = y$, & AC étant g , on aura par la seconde $\frac{g}{p} \sqrt{2pg - gg} = y$. Comparant ces deux valeurs de y , on aura $\frac{b}{a} \sqrt{2ac - cc} = \frac{g}{p} \sqrt{2pg - gg}$, d'où l'on tire $q = \frac{bp \sqrt{2ac - cc}}{a \sqrt{2pg - gg}}$; mais l'ordonnée CQ est égale à $\frac{b \sqrt{2ac - cc}}{a}$, & $\sqrt{2pg - gg}$ est moyenne proportion entre AC & CB ; le demi-axe SV ou ST , q , est donc égal à la quatrieme proportionnelle à $\sqrt{AC \times CB}$, CQ & AS .

*Propriétés remarquables sur les Sections des Soli-
des formés par la révolution des Sections co-
niques autour de leurs axes.*

Dans le solide Parabolôide, les sections paralleles à l'axe sont des Paraboles semblables & égales à la Parabole dont la révolution a formé le solide.

Dans l'Ellipsoïde ou Sphéroïde elliptique, les sections paralleles à l'axe sont des Ellipses semblables à celle dont la révolution a formé le solide.

Il a été démontré que toutes les sections de l'Ellipsoïde sont des Ellipses.

Dans l'Hyperboloïde toutes les sections paralleles à l'axe sont des Hyperboles semblables

bles à celle dont la révolution a formé le solide.

Les sections de l'Hyperboloïde parallèles aux asymptotes sont des Paraboles.

Les sections qui coupent les deux asymptotes sont des Ellipses; & les sections qui ne coupent qu'une asymptote sont des Hyperboles.

Démonstration des Sections du Paraboloides.

* Si l'on coupe le paraboloides formé par la révolution de la parabole NEO autour de son axe EC , par un plan, dans telle direction CAP , APC qu'on voudra, on trouvera tout d'un coup, par la méthode générale dont nous nous sommes servis, l'équation de la courbe de la section du solide par le plan; car ayant nommé AC, g ; AH, f ; CH, b ; HE, c ; AP, x ; PM, y ; ED, z ; DN, u ; & $pz = uu$ étant l'équation de la NEO , on trouvera comme ci-dessus, par les triangles semblables, & la propriété du

cercle, $z = c + \frac{bx}{g}$ & $uu = yy + \frac{fg \pm fx}{g}$;

substituant ces valeurs de z & uu dans $pz = uu$, on aura $pcgg + pgbx = ggyy + ffgg \pm 2ffgx \pm ffx^2$ pour l'équation générale de la section du paraboloides, qui se réduit à $pgbx \pm 2ffgx = ggyy + ffx^2$, à cause de $pc = ff$, qui est une équation à l'Ellipse; mais lorsque le plan APC ou CAP est parallèle à l'axe, alors g & b sont infinis & égaux, les termes $2ffgx$ & ffx^2 sont nuls, & l'équation se réduit à $px = yy$.

S 2

Dé-

Démonstration pour l'Ellipsoïde.

* Ayant nommé KE, a ; KR, b ; AC, g ; AH, f ; CH, b ; KH, c ; AP, x ; PM, y ; DN, u ; KD, z ; l'équation à l'Ellipse REJ sera $aa - zz = \frac{a^2 uu}{bb}$, & l'on tirera des triangles semblables, & de la propriété du cercle,

$z = c - \frac{bx}{g}$ & $uu = yy + \frac{fg + fx^2}{g}$; substituant ces valeurs de z & uu dans $aa - zz = \frac{a^2 uu}{bb}$, on aura l'équation générale, $aabbgg - bbccgg + 2bbcgghx - bbbbx x = aaggyy + aaffgg + 2aaffgx + aaffxx$, qui se réduit à $2bbcgghx - bbbbx x = aaggyy + 2aaffgx + aaffxx$, à cause de $aa - cc = \frac{aaff}{bb}$.

Si la section est parallèle à l'axe de révolution EK , alors g & b sont infinis & égaux; & l'équation se réduit à $2cx - xx = \frac{a^2 yy}{bb}$, d'où l'on voit que $\frac{a}{b}$ marque le rapport entre les axes conjugués de l'Ellipse de la section parallèle, ainsi cette Ellipse est semblable à celle dont la révolution a formé le solide.

Démonstration pour l'Hyperboloïde.

† Ayant nommé EK, a ; KR, b ; AC, g ; $AH,$

* Fig. 6.

† Fig. 7.

$AH, f; CH, b; AP, x; KH, c; PM, y;$
 $DN, u; KD, z;$ l'équation à l'hyperbole

NEO fera $zz - aa = \frac{a^2uu}{bb}$, & l'on tirera,

suivant la méthode, $z = c + \frac{bx}{g}$ & $uu = yy$

+ $\frac{fg - fx^2}{g}$; substituant les valeurs de z &

de uu dans $zz - aa = \frac{a^2uu}{bb}$, on aura l'équa-

tion générale, $bbccgg + 2bbcgbx + bbbbx^2$
 $- aabbgg = aaggyy + aaffgg \pm 2aaffgx$
 $+ afffx^2$, qui se réduit à $2bbcgbx$
 $+ bbbbx^2 = aaggyy \pm 2aaffxx + aaffx^2$,

à cause de $cc - aa = \frac{a^2ff}{bb}$.

Si la section est parallèle à l'axe, alors g
 & b sont infinis & égaux, & l'équation se ré-
 duit à $xx + 2cx = \frac{a^2yy}{bb}$, d'où l'on voit

que $\frac{a}{b}$ marque le rapport entre les axes con-
 jugués de l'hyperbole de la section parallèle;
 ainsi cette hyperbole est semblable à celle
 dont la révolution a formé le solide.

Si l'on prend ET égal à KR , & qu'on tire
 les asymptotes KTV , on verra très aisément
 que toutes les fois que la section est parallèle
 à une asymptote, alors $aaff = bbbb$, ce qui
 réduit l'équation générale à $2bbcbx = aagyy$
 $\pm 2aaffx$, qui est à la parabole; mais lors-
 que $aaff$ surpasse $bbbb$, la section est une
 ellipse, & lorsque $bbbb$ surpasse $aaff$, la

section est une hyperbole: or, en comparant les triangles KET , & CAH , on voit aisément que lorsque af surpasse bb , la section coupe les deux asymptotes, & lorsque bb surpasse af , la section ne coupe qu'une asymptote.

ETABLISSEMENT

D'UN

NOUVEAU GENRE DE PLANTE,

Que nous nommerons BICUCULLATA CANADENSIS, RADICE TUBEROSA
SQUAMMATA.

Par M. MARCHANT. *

LA méthode de ranger les Plantes, aujourd'hui reconnue pour la meilleure & la plus générale par la plupart des Botanistes modernes, est la méthode qui enseigne à ranger les Plantes par la structure de leurs fleurs; parce que, outre la connoissance parfaite qu'elle nous donne de la nature des Plantes nouvelles, & ci-devant inconnues, elle influe encore sur quantité d'autres Plantes, dont plusieurs Botanistes ont parlé, mais sur lesquelles ils nous ont laissé ou fait naître des doutes, faute d'avoir caractérisé leur genre,
par

* 18 Juillet 1733.







par une exacte description de la structure de leur fleur. La Fumeterre, par exemple, citée dans le *Traité des Plantes* de Cornuti, sous le nom de *Fumaria tuberosa insipida*, laquelle fait partie du sujet de ce Mémoire, est du nombre de ces Plantes que l'on prétendoit connoître ; mais elle nous a toujours laissé dans l'incertitude, jusqu'à ce que nous ayons eu un détail bien circonstancié du caractère de sa fleur, qu'apparemment M. Tournefort n'a pas pu examiner, n'ayant nullement fait mention de cette plante ; mais de laquelle il auroit sans doute établi un genre, s'il en avoit vu la fleur. La suite des observations & des tems qui amènent toutes choses à un certain degré de connoissances, nous ayant été favorable cette année, j'ai saisi l'occasion d'examiner cette Plante, qui est venue à sa perfection. La structure particulière de la fleur de notre *Bicucullata*, la différence de son fruit, de sa racine, & de leur saveur, justifieront ce que nous avançons, suivant la description que nous en avons faite d'après nature, ainsi qu'on le verra par la lecture de ce Mémoire, où j'espère faire connoître que notre Plante n'est point la *Fumaria* qu'on vient de nommer, comme on l'a cru jusqu'à présent ; mais au contraire, qu'elle mérite de constituer un nouveau genre de plante, principalement à cause de la structure particulière de sa fleur. Nous dirons donc que notre *Bicucullata* fait une racine composée de plusieurs tubercules oblongs, comprimés & entassés les uns sur les autres, en maniere d'écaillés vers le haut de sa racine, plus petits, plus ronds vers le

bas, étant tous de figure & de grosseur assez différentes & irrégulières, polis, luisans sur leur surface, colorés d'une teinte couleur de chair, durs & charnus. Ces tubercules ensemble composent un amas de racines environ de la grosseur du pouce, entremêlées par le bas de plusieurs autres petites racines fibreuses & chevelues.

Toutes ces racines sont d'un goût fort amer, acre, & elles échauffent considérablement la bouche; le reste de la Plante a un peu moins de saveur. D'entre cet amas de tubercules sortent au commencement du mois d'Avril, plusieurs feuilles en côtes, dont les queues sont longues de cinq à six pouces, rougeâtres par le bas, tant en dehors qu'en dedans, charnues & aqueuses, fort cassantes, rondes, grosses d'une ligne de diametre, ordinairement terminées en trois branches, qui forment une maniere de panache, dont chacune est garnie de cinq feuilles, d'une substance très mince, délicate & légère, rangées deux à deux & opposées, la cinquieme feuille terminant toujours chaque branche, & ces feuilles n'ont point ou presque point de queues. Leur couleur est verd-pâle en-dessus, plus blanchâtre tirant sur le verd de mer en-dessous, profondément découpées en maniere de lanieres, plus ou moins dentelées à leur extrémité, & chaque découpure est souvent inégalement terminée en pointe aiguë, ainsi que leurs angles rentrans. Incontinent après le développement & l'épanouissement des feuilles, part d'entre les tubercules des racines, une tige qui s'élève à la hauteur de six pou-

pouces ou environ, droite, grosse d'une ligne de diametre par sa base, peu colorée, ou rougeâtre, lisse, luisante, ronde, un peu anguleuse, d'une substance charnue & comme transparente.

Cette tige porte à son extrémité trois ou quatre fleurs, & rarement davantage, rangées alternativement, pendantes en bas, chacune soutenue d'un pédicule court & délié, garni dans le milieu de deux fort petites feuilles verd-blanchâtre *F, F*, terminées en pointe, lesquelles, à leur origine, embrassent le pédicule qui les soutient.

La fleur de cette Plante est d'une figure singuliere *A* : elle est composée de deux feuilles ou pétales creux, formés en maniere de capuchons *B, B, B*, ou cornets, de couleur blanc de lait, dont la base est terminée en pointe obtuse. Ces cornets sont attachés au bas du pistile de la fleur, du côté de leur ouverture ou échancrure, & la partie inférieure de chaque cornet se relève en dehors, & forme une espece de cuilleron godronné, *C, C, C*, ondé par le bord, teint de couleur jaune-citron. Entre les bords de l'ouverture de chaque cornet sont situées deux petites parties *D, D*, en façon de feuilles, bizarrement repliées & chiffonnées, de couleur blanc-jaunâtre, lesquelles s'élèvent au-dessus des cornets, & y embrassent le pistile dont elles couvrent entierement l'extrémité. Au bas de ces feuilles on voit encore deux autres petites feuilles *E, E*, blanches, à peu près en forme de cœur, posées à la bifurcation des cornets, lesquelles couvrent l'origi-


ne des feuilles pliées dont on vient de parler ; ces dernières feuilles-ci paroissant en quelque maniere tenir lieu de calice à la fleur de cette Plante, dans le tems qu'elle est encore en embryon. Le centre de la fleur est occupé par un pistile *G* de couleur verte, renflé par le bas, de la figure d'un pilier de balustre, surmonté d'une tête jaunâtre. Il est environné de quatre étamines *H*, blanches, très fines, lesquelles portent des sommets de couleur jaune. Les parties de la fleur qu'on vient de décrire étant passées, le seul pistile reste, & peu à peu devient une capsule gristâtre *I*, membraneuse, transparente, rayée de fibres longitudinales, dans laquelle on trouve trois ou quatre graines *K*, inégalement rondes, de couleur rousse, tirant sur le rougeâtre. Ces graines sont attachées dans la capsule les unes près des autres *L*, sur une membrane blanchâtre & charnue comme sur un placenta, mais ces parties sont si petites qu'il n'est pas facile de les bien examiner sans le secours d'une Loupe. Cette Plante est très délicate, & a un air de legereté qui fait appréhender de la toucher ; aussi la cultive-t-on dans des vases, pour la mettre à l'abri, tant du grand froid, que des vents, & même de la chaleur du soleil, qui la fait promptement faner. Elle est naturellement fort passagère, sortant de terre au commencement du mois d'Avril, & étant entièrement passée à la fin de Mai, & souvent plutôt, particulièrement si les limaçons, qui en sont extrêmement avides, y peuvent atteindre. Elle est vivace, & se multiplie d'elle-même par les
tuber.

tubercules qui se jettent entre deux terres , sur-tout dans un terrain un peu frais. Cette Plante vient originairement du Canada. J'ai donné à cette Plante le nom de *Bicucullata*, comme qui diroit, Plante dont la fleur porte deux capuchons. Elle ne fleurit ici que très rarement.

Ceux qui voudront se donner la peine de comparer la structure de la fleur de la *Fumaria*, représentée dans les Elémens de Botanique, Planche 237, à la structure de la fleur de notre *Bicucullata*, que nous venons de décrire, reconnoîtront très facilement la différence qu'il y a entre le caractère générique de ces deux genres de Plante. On remarquera en effet que dans les mêmes Elémens de Botanique, il est dit que le caractère de la *Fumaria* est de porter des fleurs, qui ont quelque apparence de fleurs légumineuses, composées de deux feuilles, lesquelles forment une manière de gucule à deux mâchoires; au-lieu que la structure des fleurs de notre *Bicucullata* est de donner des fleurs composées de six feuilles, dont les deux principales & les plus visibles ont la figure de capuchons.

Car sans nous arrêter aux autres parties de la *Fumaria* de Cornuti, ainsi qu'il l'a décrite, comme à sa racine d'être semblable à celle du Satyrium, à ses feuilles découpées comme celles du Genievre, & le tout sans saveur; on peut voir que ces parties ne conviennent nullement ni à la racine, ni aux feuilles de notre Plante, dont les fleurs & les feuilles en sont non seulement différentes à l'extérieur, mais aussi dans toute leur structure, ainsi que

nous venons de le faire voir, par la figure & par la description que nous en donnons: ce que je ne fai point avoir été observé par aucun des Botanistes qui ont fait mention de la Plante de Cornuti, la plupart desquels ont simplement copié cet Auteur. D'où nous concluons que notre Plante, bien loin d'être une espece de Fumeterre, doit, suivant la méthode de ranger les Plantes par la structure de leurs fleurs, constituer un nouveau genre de plante, ainsi que nous l'avons dit.



DES APPARENCES DU MOUVEMENT


DES PLANETES

DANS UN EPICYLE.

Par M. G O D I N. *

QUELQUE simple que soit l'hypothese des *Pythagoriciens*, ou de *Copernic*, sur l'arrangement des parties de l'Univers, & quelque préférable qu'elle soit en Physique à celle de *Ptolémée*, on ne doit pas pour cela abandonner entierement celle-ci dans l'Astronomie: lorsqu'on ne cherche qu'à connoître les apparences, & à en construire des Tables, il importe peu quelle hypothese on choisisse, pourvu que cette hypothese les sauve toutes, & que les Tables les représentent.





tent. Ainsi, quoique le Systême de *Copernic* explique fort simplement les *Stations*, *Directions* & *Rétrogradations* des Planetes, ou plutôt que ces apparences suivent nécessairement & ne soient en effet qu'un Corollaire de cette disposition des Corps célestes; cependant la maniere dont *Ptolémée* les a sauvées, est toujours & ingénieuse & utile, & de plus recevable en Astronomie, dans le sens que j'ai dit ci-dessus. Il se trouve même dans l'Univers des mouvemens de cette nature, les Satellites de Jupiter & de Saturne, par exemple, font à l'égard du Soleil & de la Terre, des apparences semblables à celles que font les Planetes à l'égard de la Terre dans le Systême de *Ptolémée*, qu'il les fait mouvoir sur un Epicycle dont le centre parcourt la circonférence d'un Excentrique. La Lune & la Terre vues du Soleil, ou de quelque autre point du Tourbillon Solaire, seroient encore dans ce cas: enfin, on peut y ramener certaines Cometes, & déterminer par-là fort aisément leurs phénomènes.

Tous les Astronomes depuis *Ptolémée* jusqu'à *Copernic*, ont attribué la cause des Stations & Rétrogradations des Planetes à leur mouvement sur un Epicycle, suivant la suite des Signes, combiné avec celui de l'Epicycle sur un déferent; ces mouvemens & ces cercles étant entre eux dans un certain rapport.

Apollonius, le premier que nous sachions qui ait traité cette matiere, a démontré qu'une Planete devoit paroître rétrogradé dans certains cas, lorsque le demi-diametre de son Epicycle avoit un plus grand rapport à la ligne

droite tirée du centre du Monde au périgée de cet Epicycle, que le mouvement du centre de l'Epicycle sur le déférent à celui de la Planete sur l'Epicycle; & alors les points de Station de la Planete se trouveront en deux points de la circonference de l'Epicycle où une ligne droite menée du centre du Monde, & prolongée en sorte qu'elle coupe le cercle entier, formera dans l'Epicycle une corde, dont la moitié sera à la partie extérieure, comme le mouvement du centre de l'Epicycle au mouvement de la Planete sur son petit cercle.

Apollonius a démontré cela d'un déférent concentrique, & *Ptolémée* qui l'a suivi, l'a appliqué au déférent excentrique.

Sa démonstration est géométrique, mais le principe duquel il part est fort éloigné, & quoiqu'il trouve que cela soit ainsi, il n'en donne point la véritable cause: il y a même un cas où sa démonstration n'a point de prise, comme je le remarquerai tout à l'heure. Enfin, si l'un des deux mouvemens est plus grand que l'autre, elle ne donne pas la mesure de l'excès. J'ai satisfait à tout cela, en employant pour démontrer les mêmes apparences, la Théorie des mouvemens composés.

LEMME I.

* Les arcs de deux cercles quelconques *CD*, *EF* sont entre eux en raison composée de leurs demi-diametres *AC*, *BE*, & des an-

* Fig. 1. & 2.

angles * CAD , EBF qui ont ces arcs pour mesure.

Soit l'angle CAD à l'angle EBF , comme le rayon BE à un quatrième terme O , je dis que l'arc CD est à l'arc EF comme $AC \times CAD : BE \times EBF$, ou puisque $CAD \cdot EBF = BE \cdot O$, comme $AC \times BE : BE \times O$, ou enfin, ce qui est la même chose, comme AC est à O ; car ayant fait l'angle EBG égal à l'angle CAD , CD est à EG comme AC à BE ; mais l'arc EG est à l'arc $EF :: EBG = CAD \cdot EBF$. Donc $EG \cdot EFBE \cdot O$, ou $EF \cdot O :: EG \cdot BE$; mais aussi $CD \cdot AC :: EG \cdot BE$. Donc $CD \cdot AC :: EF \cdot O$, ou $CD \cdot EF :: AC \cdot O$.

On peut encore déduire la même chose de ce que dans deux cercles quelconques, les angles sont entre eux comme les arcs divisés par les rayons respectivement.

LEMME II.

Si les deux cercles se meuvent uniformément autour de leur propre centre, & que les arcs CD , EF , soient révolus en un tems égal:

Je dis que les tems des révolutions entières sont en raison inverse des angles CAD , EBF .

Le tems périodique autour du point A est au tems CD , comme quatre angles droits à l'angle CAD . Et le tems périodique autour du point B est au tems EF , comme quatre droits

droits à l'angle * EBF ; mais les tems CD , EF , sont égaux. Donc les termes moyens de ces deux proportions sont les mêmes, & par conséquent le produit des deux extrêmes de la première est égal au produit des deux extrêmes de la seconde, ou, ce qui est la même chose, le tems périodique autour du point A est au tems périodique autour du point B , comme l'angle EBF est à l'angle CAD .

L E M M E I I I.

Les arcs CD , EF , révolus en un tems égal, sont entre eux en raison composée de la directe des rayons AC , EB , & de l'inverse des tems périodiques.

Car (*Lemme 1.*) les arcs CD , EF , sont entre eux en raison composée des rayons AC , BE , & des angles CAD , EBF , & (*Lemme 2.*) les tems périodiques des révolutions entières sont réciproquement comme ces angles. Donc ces arcs sont en raison composée, &c.

L E M M E I V.

Les vitesses seront en raison composée des rayons & des tems périodiques réciproquement.

Car puisque les tems sont égaux, les vitesses seront comme les espaces parcourus, c'est-à-dire, comme les arcs CD , EF ; mais ces arcs sont dans le rapport énoncé; donc les vitesses sont aussi dans le même rapport.

On.

On peut encore déduire ce Lemme de la Proposition démontrée par Galilée, que les vitesses sont en raison composée des espaces parcourus & des tems périodiques réciproquement pris.

REMARQUES OU SUPPOSITIONS.

I. La direction du mouvement circulaire, en quelque point de la circonférence que ce soit, est toujours une tangente à ce point.

II. Dans la composition des mouvemens uniformes, si l'on a deux directions simples données de position, & le rapport des mouvemens, on aura toujours la direction composée & le rapport du mouvement composé à chacun des mouvemens simples.

LEMME V.

* Si un mobile A , vu d'un point fort éloigné B , s'éloigne de la ligne AB par une direction oblique AC , la vitesse réelle est à la vitesse apparente, comme le sinus total est au sinus de l'obliquité.

Ayant mené BC par un point quelconque de la direction AC , & tiré CD , AE , perpendiculaires à AB , je dis que la vitesse sur AC est à la vitesse apparente, comme AC est à CD .

Je suppose que deux mobiles partent en même tems, l'un du point A par AC , & l'autre du point D par DC , en sorte qu'ils arrivent

* Fig. 3.

vent l'un & l'autre dans le même tems en C par un mouvement uniforme. Il est évident que si le point B est tellement éloigné que les lignes BA , BC , soient censées parallèles, & que les droites AC , DC , aient été prises fort petites, les deux mobiles vus du point B paroîtront toujours en conjonction l'un avec l'autre; & puisque les tems sont les mêmes, les vîtesses seront comme les espaces, c'est-à-dire, comme AC à DC ; donc elles seront aussi comme le sinus total au sinus de l'obliquité DAC .

L E M M E V I.

* Si une corde GG coupe le cercle, & que par un des points G on mène une tangente GD égale au rayon du cercle; que du point D on mène DK perpendiculaire à GG prolongée, enfin que la corde GG ait été divisée en deux également en H , je dis que la perpendiculaire DK est égale à la moitié de la corde GH .

Les triangles rectangles GDK , AGH , sont semblables à cause de l'angle GAH égal à l'angle DGK ; donc puisque GD est égal à AG , DK sera égale à HG .

P R O P O S I T I O N I.

Déterminer l'apparence du mouvement d'une Planete placée dans le périgée de son Epicycle.

A

Fig. 4.

* A est le centre de l'Epicycle.

B le centre du déférent, ou en général le lieu de l'œil.

C est le périégée de l'Epicycle.

L'Epicycle se meut autour du point B suivant la suite des Signes de droite à gauche, tandis que le point C se meut autour du point A contre l'ordre des Signes de gauche à droite.

Que le tems périodique de la révolution autour du point A soit au tems périodique de la révolution autour du point B , comme P à p .

Premier Cas. Je dis que si AC est à CB comme P à p , la Planete sera stationnaire en C .

Car les mouvemens du point C autour des deux points A & B sont directement contraires; mais puisque les vîteses sont en raison composée des demi-diametres AC , CB , & des tems p P réciproques, elles seront donc aussi en raison composée de AC à CB , & de CB à AC , & par conséquent elles seront égales; donc étant contraires, la Planete sera stationnaire.

C'est-là le cas auquel la Démonstration d'*Apollonius* ne pourroit convenir: on démontreroit bien par son moyen, que quelque petit arc que l'on prenne d'un côté ou d'autre du point C , le mouvement dans ce point pris seroit direct, mais on ne pourroit rien conclure du point C .

Second Cas. Si le rapport de AC à CB est plus grand que de P à p , la Planete sera rétrograde en C .

Soit

* Fig. 5.

* Soit CB à CO comme p à P ; puisque la vitesse du point C autour du point A est à sa vitesse autour du point B en raison composée de AC à CB & de p à P , on aura la vitesse du mouvement vers la droite à la vitesse directement opposée vers la gauche, comme AC à CO , mais par hypothese $\overline{AC} \cdot \overline{CB} > \overline{P} \cdot \overline{p}$, donc AC est plus grand que CO , & par conséquent la vitesse autour du point A est plus grande que la vitesse directe autour du point B ; donc la Planete paroitra rétrograde.

Troisième Cas. Si le rapport de AC à CB est moindre que de P à p , la Planete fera directe en C .

Car on prouvera que le mouvement vers la gauche surpasse le mouvement vers la droite, parce que CO sera plus grande que AC .

PROPOSITION II.

† Si le rapport de AC à CB est plus grand que de P à p , la Planete paroitra stationnaire dans deux points également éloignés de part & d'autre du point C .

Et puisque $\overline{AC} \cdot \overline{CB} > \overline{P} \cdot \overline{p}$, si l'on trouve un point G , tel que prolongeant BG en dedans du cercle, la demi-corde GH soit à BG comme P à p , je dis que la Planete sera stationnaire en G .

Ayant mené GD , tangente au point G , égale au demi-diametre AG , elle fera la direction

* Fig. 5.

† Fig. 6.

tion du mouvement du point G^* de l'Epicycle autour du point A . Soient menées DK , EG , IG perpendiculaires à BG , & égales entre elles & à GH (Lem. 6.).

Il y a au point G , deux mouvemens contraires, l'un autour du point A , suivant la direction GD , l'autre autour du point B , suivant la direction GE , & les lignes AG , BG sont les rayons des cercles qui seroient décrits par ces mouvemens; c'est pourquoi la vitesse du mobile G vers D est à sa vitesse vers E en raison composée de AG à BG , & du tems périodique p au tems périodique P (Lemme 4.) c'est-à-dire par l'hypothèse, comme AG à GH . Donc la vitesse vers D est à la vitesse vers E , comme AG est à GH , c'est-à-dire, comme GD est à GE ; mais puisque l'œil est en B , & que GD est oblique à GB , le mouvement oblique GD se réduira au mouvement droit GI égal à DK ou GE , qui lui est aussi égale; donc les mouvemens apparens opposés seront égaux entre eux, & par conséquent la Planete paroitra stationnaire.

Remarque 1. † Puisque DK & GE sont parallèles & égales, si l'on tire KE , la figure $GEDK$ sera un parallelogramme, & puisque les mouvemens simples, suivant les directions GE , GD sont comme les lignes mêmes GE , GD , il suit que la direction du mouvement composé se fera par la diagonale KG , qui, étant prolongée, passe par l'œil B ; d'où il suit encore que la station apparente se fera en G , puisque par les mouvemens

com-

* Fig. 6.

† Fig. 7.

composés, la Planete paroitra dans un même point; mais alors elle s'approchera aussi, ou s'éloignera avec une grande vitesse de l'œil *B*, d'autant que la direction composée des deux directions simples *GD*, *GE*, étant prolongée, passe par l'œil.

Remarque 2. * En supposant ainsi l'Epicycle, ce mouvement composé fera que la Planete paroitra décrire une espece d'Epicycloïde *a, b, c, d, a*, telle que Kepler, Lansberge, M. Cassini, & plusieurs autres Astronomes l'ont décrite; il n'y a que le premier cas de la premiere Proposition, dans lequel la ligne décrite par la Planete est la Cycloïde ordinaire.

PROPOSITION III.

† En supposant les mêmes choses que dans la Proposition précédente, je dis que si l'on prend un point *g* quelconque entre *G* & *C* sur l'Epicycle, la Planete paroitra rétrograde dans ce point.

Puisque $gH : gB > P.p.$ si l'on fait $p.P :: gB : gO$, la demi-corde *gH* sera plus grande que *gO*; mais si l'on tire, comme ci-devant, *gD* égale au rayon *Ag*, & la perpendiculaire *gI* égale à *DK* & à *gH*, & prenant *gE* égale à *gO*, on démontrera que la vitesse vers *D* est à la vitesse vers *E*, comme *gD* à *gE*; mais le mouvement oblique *gD* doit se réduire au mouvement droit *gI* égal à *DK* ou *gH*; donc *gI* est plus grande que *gO*, & par
con-

‡ Fig. 8.

† Fig. 9.

conséquent que gE ; donc la vitesse vers I sera plus grande que la vitesse vers E , & achevant le parallélogramme $EgDP$, gP sera la direction du mouvement composé qui se réduit à KP , suivant laquelle le mouvement paroitra rétrograde.

PROPOSITION IV.

* Les mêmes choses étant encore posées, je dis qu'en tout autre point au-delà des points G de station, la Planete paroitra directe.

Car gO , ou son égale gE sera plus grande que gH , ou KD , ou gI ; donc la vitesse vers E sera plus grande que la vitesse vers I , & ayant fait le parallélogramme $EgDP$, la diagonale gP sera la direction du mouvement composé des deux gE , gD ; ce mouvement composé gP se reduira à KP qui est l'excès de gE sur gI ; donc le mouvement sera direct, &c.

Remarque 1. Les diagonales gP qui sont les directions du mouvement composé, sont les tangentes de la Spirale à nœuds, dont j'ai parlé plus haut.

Remarque 2. La vitesse apparente du mouvement de la Planete autour du point A est prise ici suivant la mesure de la demi-corde GH ou gH , ce qui suffit lorsqu'il ne s'agit que de la vitesse du mouvement autour du point A comparée à la vitesse du mouvement autour du point B dans le même instant; mais si l'on considéroit les vitesses apparentes du

mou-

mouvement de la Planete autour du point *A* en divers points de l'Epicycle inégalement éloignés de l'œil *B*, le rapport des vîteses apparentes seroit composé du rapport direct des demi-cordes & de l'inverse des distances à l'œil.

Remarque 3. * Si l'œil est supposé à une distance infinie, mais dans le plan du cercle décrit autour du point *A*, alors les rayons visibles seront tous paralleles entre eux, & les différentes vîteses seront comme les sinus perpendiculaires au diametre visible, lesquels sinus tiendroient lieu des demi-cordes que nous avons considerées ci-dessus; car on prouvera, comme ci-dessus, que *DK* est égale à *GH*, & *dk* à *gh*, &c. & que le mouvement réel est au mouvement apparent comme *GD* à *DK*, ou comme *AG* à *GH*.



D E S C R I P T I O N

*D'un Instrument qui peut servir à déterminer,
sur la surface de la Terre, tous les points
d'un Cercle parallele à l'Equateur.*

Par M. DE LA CONDAMINE. †


M G O D I N a prouvé dans son dernier Mémoire, que quoique, de l'aveu des plus habiles Astronomes, on ne puisse répondre communément d'une observation de


‡ Fig. 11.

† 27 Juin 1733.

D
A

Fig. 3





de latitude, qu'à 15 ou 20 secondes près; cependant par la méthode qu'il a expliquée on pouvoit, avec beaucoup plus de précision, s'assurer de la difference en latitude de deux lieux situés à peu près sous le même parallèle, & par conséquent qu'on pouvoit trouver par observation une suite de points sous le même parallèle, ou du moins qui ne s'en écarteroient pas sensiblement.

M. Godin a rempli son objet, & a démontré sa proposition; mais si pour tracer réellement un parallèle à l'Equateur sur la surface de la Terre, on ne vouloit employer que ce seul moyen exclusivement à tout autre, ce seroit passer le but que M. Godin a paru se proposer. Quelle que soit la précision de sa méthode, elle paroît plus propre à vérifier un parallèle déjà tracé sur la surface de la Terre, qu'à en trouver tous les points sans aucun autre secours. Car comme rien n'indique, dans cette méthode prise en elle-même & sans supplément, les points sur le terrain où les observations doivent être faites, ce ne seroit qu'après l'observation faite sur un point pris au hazard qu'on pourroit conclure, non sans quelque difficulté, à quelle distance du point observé passe le parallèle cherché; ce qui exigeroit un nombre prodigieux d'observations, qu'il faudroit, pour ainsi dire, réitérer à chaque pas. Et si au-lieu de prendre le point au hazard, on le prenoit dans la perpendiculaire à la méridienne de chaque station, outre l'embarras & la difficulté de tracer à chaque station une nouvelle méridienne, toujours est-il vrai, que ce n'est

Mém. 1733.

T

que

que par le calcul qu'on pourroit trouver de combien cette perpendiculaire s'écarte du parallele dans une certaine longueur qu'il faudroit encore mesurer; ce qui augmente le tems & la difficulté de l'opération. On pourroit encore ajouter, que pour calculer avec justesse l'écart de la perpendiculaire dans une longueur donnée, il faudroit connoître exactement la figure de la Terre, & que c'est supposer ce qui est en question, puisque c'est pour parvenir à la découvrir qu'on se propose aujourd'hui de tracer un parallele. Il paroît donc qu'il seroit utile d'avoir quelque pratique commode qui pût servir à indiquer sûrement, & de proche en proche, sur la surface de la Terre, tous les points d'un cercle parallele. On pourroit alors se contenter de faire, par la méthode de M. Godin, les observations de latitude de distance en distance, plus ou moins fréquemment, selon qu'on le trouveroit nécessaire, ou pour se redresser, ou pour s'assurer par un nouveau moyen qu'on ne s'est pas écarté de la ligne cherchée; & la pratique que l'on va proposer, ou quelque autre équivalente, serviroit à déterminer, non-seulement les points où l'on jugeroit à propos de faire les observations astronomiques, mais encore tous les points du parallele, compris dans l'intervalle d'une station à l'autre. Enfin, par le secours mutuel des deux méthodes on parviendroit à tracer sur la surface de la Terre un cercle parallele à l'Equateur, peut-être aussi exactement qu'on peut tracer un Méridien.

Dans cette vue je me suis proposé pour objet

objet la construction d'un instrument, par le secours duquel on pût déterminer sur la surface de la Terre tous les points d'un cercle parallèle à l'Equateur. Cet instrument n'est autre chose qu'un Quart-de-cercle, auquel j'ajoute seulement une Lunette, ou plutôt dans lequel je change la situation ordinaire de la Lunette, ou, si l'on veut, d'une Alidade, qui portera des pinules, & qui tiendra lieu de Lunette.

Soit le Quart-de-cercle * OCB monté sur son pied. Au-lieu de la Lunette ordinairement couchée sur le côté OC , j'en ajuste une GI , perpendiculairement au rayon OC , qui soit tangente au Quart-de-cercle dans le point O , où je suppose que commence la division des degrés; je rends cette Lunette sur son centre au point O , dans le plan $AEFG$, perpendiculaire au rayon OC , en sorte qu'elle ne puisse s'écarter de ce plan dans ses différentes directions: Voilà l'instrument construit, en voici l'usage.

Le plan $AEFG$ dans lequel la Lunette est mobile, n'est nécessaire qu'autant qu'il peut servir à mieux retenir la Lunette perpendiculairement à CO dans toutes ses situations. Si on y peut parvenir sans le secours de ce plan, qui d'ailleurs a son incommodité, il est à propos de le supprimer dans la construction de l'instrument; mais je mets ce plan dans la figure pour aider l'imagination, & pour me faire mieux entendre.

Supposé que l'opération commence au point A

* Fig. 1.

A, * dont on connoit exactement la latitude par un grand nombre d'observations réitérées, & où l'on a une méridienne tracée *AP*; je dispose le plan du Quart-de-cercle dans le plan du Méridien, je fais battre le cheveu sur la division qui répond à la hauteur du pôle du lieu; alors il est clair que le côté *OC* du Quart-de-cercle est parallèle à l'axe du Monde, & que le plan *A EFG* perpendiculaire à *OC*, & sur lequel la Lunette est mobile, est dans le plan du cercle parallèle à l'Equateur qui passe par le lieu de l'observation. Donc, la section du plan *A EFG*, prolongé jusqu'à la surface de la Terre, y tracera ce même cercle parallèle; donc la Lunette mobile sur le plan *A EFG* placée dans toutes les directions *FA*, *GI*, *HE*, où son axe prolongé rencontrera la Terre, donnera successivement sur le terrain depuis le point *A*, où commence l'opération, tous les points *A²*, *A³*, *A⁴*, *A⁵*, &c. à perte de vue, par lesquels passe le parallèle.

Dans la pratique il suffira d'observer, en commençant à opérer, deux points, l'un à la plus grande distance où la Lunette puisse rencontrer un objet sensible comme au point *A³*, & l'autre à une distance moyenne comme *A²*, entre ce point éloigné *A³*, & le point *A* de l'observation actuelle. Alors on transportera l'instrument au point mitoyen *A²*, d'où l'on pourra voir les deux extrêmes, *A* & *A³*, & quoiqu'il n'y ait point de méridienne tracée au point *A²*, comme à la première station

station en A , * il sera cependant aisé de disposer le plan $AEFG$ dans celui du cercle parallèle, & l'on pourra y parvenir de deux manières.

1^o. Par le moyen des trois points A , A^2 & A^3 , en cherchant la situation du plan $AEFG$, telle que la Lunette mobile rencontre, en tournant dans ce même plan, les trois points A , A^2 , A^3 , ce qui n'arrivera que lorsque le plan $AEFG$, & celui des trois points observés, ne feront qu'un seul & même plan.

2^o. Par un seul alignement de la Lunette ou de l'Alidade qui joigne deux de ces trois points, en observant, pour avoir un troisième point qui puisse fixer l'inclinaison du plan, de faire battre le filet sur la même division qu'à la première station : de l'une ou de l'autre manière, on sera sûr que le plan $AEFG$ est dans le plan du parallèle, & que celui du Quart-de-cercle est dans le plan du Méridien.

L'instrument une fois fixé par l'une ou l'autre voye dans la seconde station, en tournant la Lunette sur son centre, comme en la première opération, on aura sur le terrain autant de points qu'on voudra du parallèle; passé la première station où il a fallu observer deux points, il suffira d'en observer à chaque station suivante seulement un nouveau.

Par exemple, à la seconde station au point A^2 , après avoir orienté l'instrument, comme nous venons de le dire, il suffit d'observer un nouveau point A^4 , par-delà le point A^3 , ensuite en se transportant au point A^3 , le point A^2 de la station précédente, & le point A^4 ,

T 3

der-

* Fig. 1.

dernier trouvé, serviront à trouver *A'*, & ainsi de suite.

Tant que le terrain sera uni, & à peu près parallèle à l'horizon, la trace du parallèle paroitra une ligne droite sans aucun angle sensible; mais sur un terrain inégal & montagneux, l'obliquité du parallèle, je veux dire l'angle qu'il fait avec l'horizon, rendra la projection du parallèle fort irrégulière & fort anguleuse, ce qui n'empêchera pas d'en trouver tous les points avec la même facilité, par-tout où l'instrument se pourra transporter.

Il est clair qu'il est à propos, autant qu'il sera possible, de prendre les points des stations dans les lieux les plus élevés, d'où l'on puisse découvrir les précédens, & les suivans. S'il se trouve quelques obstacles, on se rejettera à droite & à gauche, en formant des triangles comme l'on fait en traçant une méridienne, ou tout autre vertical, tel que celui que trace aujourd'hui M. Cassini; & s'il en est besoin, on emploiera pour les résoudre, les secours de la Trigonométrie sphérique, si dans le cas présent on jugeoit la Trigonométrie rectiligne insuffisante. On pourra lier ces triangles avec le parallèle, quand on aura été obligé de s'en écarter, d'autant plus aisément qu'on aura pu mesurer à la toise dans les lieux où le terrain aura été favorable, de combien dans une distance donnée le parallèle s'écarte de la perpendiculaire au Méridien ou de la ligne tirée de l'Est à l'Ouest.

Si la latitude du lieu d'où l'on part n'étoit pas exactement connue, il faudroit d'abord
s'assu-

s'assurer, à force de différentes tentatives, par la méthode de M. Godin, de trois points dans le même parallèle ; après quoi cherchant de station en station un nouveau point avec l'instrument proposé, on continueroit l'opération sans quitter la même latitude, quoiqu'on n'en connût pas exactement le degré.

J'ai proposé de se servir d'un Quart-de-cercle dans l'opération précédente, mais on conçoit que cela n'est pas absolument nécessaire, puisqu'il suffit que l'instrument quelconque dont on se servira puisse donner un angle constant qui sera celui de la hauteur du pôle, ou de son complément, sous le parallèle qu'on se propose de tracer, sans qu'il soit jamais besoin d'aucun autre angle ; ainsi en observant ce qui a été prescrit au surplus pour la Lunette mobile, il importe peu qu'on se serve d'un vrai Quart-de-cercle, d'un Sextant, d'un Arc du nombre de degrés requis d'une Machine parallaxique, ou de tel autre instrument qui pourra servir au même usage.

On pourroit employer différentes pratiques pour vérifier l'instrument une fois construit, & sa plus importante vérification consiste à s'assurer si le plan dans lequel la Lunette est mobile, est bien perpendiculaire au rayon CO , * d'où l'on commence à compter les degrés de l'arc OB . M. Godin m'a fourni sur cela un moyen fort commode : c'est, l'instrument une fois placé, de suivre avec la Lunette mobile dans le plan du parallèle, quelque Etoile fixe qui, par la révolution diurne.

dé*

* Fig. 2.

décrive exactement le parallele cherché, ou un cercle qui en differe si peu, que l'Etoile puisse être toujours renfermée dans le champ de la Lunette; on verra aisément par ce moyen, si l'Etoile demeure toujours au centre ou à la même distance du centre de la Lunette pendant tout le tems qu'elle est visible sur l'horizon. La plus petite difference sera sensible, & indiquera le défaut de l'instrument, le tout cependant sauf l'erreur de la réfraction qu'il faudra évaluer.

* Cette même réfraction qui, comme on fait, est très considerable près de l'horizon, & qui n'est pas toujours la même, peut causer un obstacle particulier à l'opération que nous venons de prescrire pour tracer un parallele; car les objets étant élevés par la réfraction perpendiculairement à l'horizon, c'est-à-dire, dans le plan du vertical, il s'ensuit que le point S de la surface de la Terre (qui par le moyen du rayon rompu BS , vient se peindre dans la Lunette dirigée sur le point Q dans le plan du parallele CQD) n'est pas réellement un point du parallele cherché CD , mais un point du vertical CE , & que ce point est beaucoup plus voisin de l'Observateur que le point Q , vers lequel la Lunette est réellement dirigée, & qui n'est pas apperçu dans la Lunette.

Cette source d'erreur est ici d'autant plus à considérer, qu'elle n'est pas proportionnelle à la grandeur de l'angle SBQ de la réfraction: car quelque petit que soit cet angle, le change-

gement de lieu de l'objet rapporté par l'Observateur de * S en Q , fait sur le terrain une grande distance, à cause de la grande obliquité du rayon visuel AQ ; & comme cette obliquité peut changer, tant par la diverse inclinaison de la Lunette que par la différente pente du terrain, non seulement l'erreur SQ en elle-même est très considérable, mais elle peut devenir différente à chaque opération, même en supposant qu'il n'arrive point de changement à la réfraction.

† Pour remédier à cet inconvénient, sur le point S du terrain apperçu dans la Lunette, je fixe perpendiculairement à l'horizon un jallon ou une perche SR de quelques pieds de hauteur. La quantité dont la réfraction élève l'objet à telle distance étant supposée connue, on prendra sur le jallon SR un point O élevé au dessus de S d'une quantité SO égale à l'effet de la réfraction, & on aura le point sur lequel la Lunette est réellement dirigée, qui paroîtroit dans la Lunette si la réfraction étoit nulle, & qui par conséquent appartient au parallèle.

Le point O sur le jallon étant déterminé, donnera le lieu de la seconde station, & ainsi des autres. Comme ce point O est en l'air, si l'on veut de plus trouver sur le terrain même le lieu du parallèle, on prendra du pied S du jallon SO , dans le plan du Méridien vers le côté du pôle, la ligne PS égale au sinus de l'angle de l'élévation du pôle du lieu, OS étant pris pour rayon, ou, pour éviter

le

* Fig. 2.

† Fig. 3.
T 5.

le calcul, on tendra au point O un cordeau auquel on fera faire avec le jalon SO l'angle POS égal à la hauteur du pôle du lieu, & le point P , où ce cordeau tendu rencontrera la Terre, appartiendra au parallèle.

Il est vrai qu'il reste à déterminer la quantité de la réfraction, mais cet inconvénient est commun à la plupart des opérations astronomiques. Il y avoit seulement ici une difficulté de plus, qu'on vient de donner le moyen de réduire au cas ordinaire.


L'effet de la réfraction étant rapporté sur la ligne verticale, on pourroit, après plusieurs expériences sur la plus grande & la moindre réfraction, déterminer à fort peu près une réfraction moyenne, eu égard aux circonstances du climat & de la saison, & par ce moyen éviter les grandes erreurs; c'est peut-être dans la pratique ce qu'il y auroit de mieux à faire pour ne pas trop multiplier les opérations.


Cependant si l'on exige une plus grande précision, voici, ce me semble, un moyen qui satisfait à tout. * On placera un niveau en D à égale distance des deux stations C & S ; & comme à égale distance & dans le même lieu, la réfraction doit élever les objets également, on déterminera aisément avec le niveau sur le jalon SO , le point O , qui est de niveau avec la Lunette AB . L'intervalle oO qui est entre ce point de niveau o & le point O de la mire apperçu dans la Lunette, donnera avec toute la justesse possible la mesure actuelle & immédiate de l'effet présent de la réfraction.

LES.









LES LOIX ASTRONOMIQUES
DES VITESSES DES PLANETES
DANS LEURS ORBES,

*Expliquées mécaniquement dans le Système
du Plein.*

Par M. l'Abbé DE MOLIERES. *

KEPLER a observé, 1°. que les distances moyennes des Planetes au Soleil étoient à peu près entre elles comme les racines cubiques des quarrés des tems de leurs révolutions; 2°. que tirant une ligne du centre de la Planete au centre du Soleil, ce rayon décriroit des aires à peu près proportionnelles aux tems que la Planete employoit à décrire les arcs de son orbe qui bornoient ces aires.

Et l'on prétend que, si un Tourbillon étoit le principe des mouvemens des Planetes, il y auroit une *incompatibilité nécessaire* entre ces deux loix : de telle sorte que si les Planetes en suivoient une, elles ne pourroient suivre l'autre, & que de quelque façon que l'on puisse tourner & retourner le Tourbillon, il sera toujours impossible d'y trouver l'accord de ces mouvemens.

Mais j'ose espérer au contraire de démon-

trer.

* 24 Mars 1733.

trer ici par tout le calcul de M. Newton, que, bien loin qu'il y ait dans le Tourbillon une telle incompatibilité entre ces deux loix, l'une est une suite nécessaire & mécanique de l'autre.

P R E M I E R C A S.

Dans un Mémoire imprimé en l'année 1728, parmi ceux de l'Académie, après avoir considéré les propriétés du Tourbillon cylindrique, par rapport aux forces centrifuges des points, & y avoir déterminé la même propriété que M. Newton y avoit déterminée par une autre voye (*Phil. nat. lib. 2. prop. 51.*) savoir, que les tems périodiques des points de ce Tourbillon, abstraction faite des frottemens, devoient être comme leurs distances à l'axe, & que tous ces points devoient avoir une égale vitesse en circulant dans les circonférences des cercles parallèles aux bases du cylindre; poursuivant la même hypothèse, & ne faisant autre chose que d'inscrire dans le Tourbillon cylindrique une superficie sphérique, pour le transformer en un Tourbillon sphérique, j'ai démontré que, suivant les mêmes loix mécaniques qui m'avoient si bien conduit jusqu'à ce point, puisque je m'y étois trouvé d'accord avec M. Newton, la seule apposition de cette superficie sphérique, devoit produire dans tous les points du Tourbillon devenu par-là sphérique de cylindrique qu'il étoit, une telle disposition.

1°. Que ces points ne devoient plus, comme

me auparavant, être considérés comme tendant à s'éloigner de l'axe, mais du seul centre du Tourbillon.

2°. Que les forces avec lesquelles ces points tendoient à s'éloigner du centre du Tourbillon, étoient entre elles en raison inverse des quarrés de leurs distances à ce centre.

3°. Qu'enfin les quarrés des tems périodiques des points du Tourbillon sphérique, compris dans le plan de l'Equateur, étoient comme les cubes de ces mêmes distances.

Or, comme dans l'hypothese d'un Tourbillon sphérique, ces mêmes points doivent décrire des cercles concentriques * *Mecdb*, *Tlabg*, dont le centre *F* du Globe est le centre commun, il s'ensuit que dans ce cas le même point *M* aura par tout son orbe *Mecdb* une égale vitesse, que par conséquent le rayon *cF*, tiré du point *M* parvenu en *c*, au centre *F*, décrira des aires *cFd*, *dFb* proportionnelles aux tems, ou, ce qui revient au même, le rayon *cF* décrira en tems égaux des aires égales.

On voit donc déjà que dans le Tourbillon sphérique il n'y a aucune incompatibilité, 1°. que les quarrés des tems que les points *MT* sont à parcourir leurs orbes *Mecd*, *Tlab* soient entre eux comme les cubes de leurs distances *MF*, *TF* selon la premiere Règle de Kepler; 2°. que le rayon *ct* ou *aF* décrive des aires *cFd*, *dFb*, ou *aFb*, *bFg*, proportionnelles aux tems qu'ils sont à décrire les arcs *cd*, *db* : *ab*, *bg*, selon la seconde Règle de Kepler.

T 7


Ainsi,

* Voyez la figure suivante.

Ainsi, comme dans le système de Jupiter, les Satellites, selon M. Newton même (*P.* 359. *ed.* 2.) décrivent des circonférences de cercles concentriques à cet Astre comprises dans le plan de son Equateur, & qu'elles ont durant tout leur cours une égale vitesse; si le système de Jupiter est un Tourbillon également pressé de toute part, & par conséquent sphérique, il n'y aura là aucune incompatibilité nécessaire entre les deux loix de Kepler.

S E C O N D C A S.

Comme il est nécessaire, afin qu'un Tourbillon soit sphérique, qu'il soit également comprimé de toute part, & qu'il peut très-facilement arriver qu'il soit un peu moins comprimé d'un certain côté *C*, que de partout ailleurs, & que c'est une nécessité que dans ce cas les orbites *MECDH*, *TLABG*, que ses points *M*, *T* décriront, deviennent elliptiques, de circulaires qu'ils étoient: ou que leurs points *C*, *A* soient plus éloignés du centre des forces *F*, que leurs points *T*, *M*; il s'agit de savoir si, supposé que dans ce cas les mobiles *M*, *T*, qui seront entraînés dans les orbites elliptiques *MECDH*, *TLABG* s'y meuvent de telle sorte que les quarrés de leurs tems périodiques soient entre eux comme les cubes de leurs distances moyennes *FH*, *FG*, il est possible, ou non, que les aires *FCDF*, *FDHF*, ou *FABF*, *FBGF*, que les rayons *FG*, *FA*, que chacun de ces mobiles décriront, soient proportionnelles aux tems qu'ils auront employés à par-



parcourir les arcs CD , DH , ou AB , BG .

1°. Pour résoudre cette question on remarquera, 1°. qu'il est clair qu'afin que le mobile T décrive des aires proportionnelles aux tems, il faut nécessairement que ses vitesses soient entre elles en raison inverse de ses distapces. Qu'ainsi la vitesse du mobile T en A soit à sa vitesse en B comme FB à FA , que la vitesse du mobile M en C soit à sa vitesse en D comme FD à FC .

2°. Mais qu'afin que les quarrés des tems périodiques des mobiles M , T , soient entre eux comme les cubes des distances moyennes FH , FG , il n'est pas nécessaire (comme ceux qui soutiennent l'incompatibilité des

des deux loix dans le Tourbillon elliptique (semblent le prétendre) qu'indifferemment (comme il arrive dans le Tourbillon sphérique) toutes les vitesses des mobiles M, T , soient entre elles en raison inverse des racines de leurs distances. Qu'il n'est pas nécessaire, par exemple, que la vitesse du mobile M en C , soit à la vitesse du mobile T en B , comme $\sqrt[3]{FB}$ à $\sqrt[3]{FC}$. Car il est évident,

3°. Qu'il suffit pour que les tems périodiques des mobiles MT , soient dans le rapport marqué, que la somme des vitesses du mobile M dans tout son orbe $MECDH$, soit à la somme des vitesses du mobile T , dans tout son orbe $TLABG$, comme la racine de la distance moyenne FG du mobile T , est à la distance moyenne FH du mobile M .

4°. Et qu'il suffit pour cela que la vitesse en H de M , soit à la vitesse correspondante en G de T ; que la vitesse en D soit à la vitesse en B ; que la vitesse en C soit à la vitesse en A , &c. comme $\sqrt[3]{FG}$, $\sqrt[3]{FH}$, ou $\sqrt[3]{FB}$ à $\sqrt[3]{FD}$, ou $\sqrt[3]{FA}$, à $\sqrt[3]{FC}$, &c. Et qu'il n'est nullement nécessaire que la vitesse en C soit à la vitesse en B , ou en G , ou en T , comme $\sqrt[3]{FB}$, ou $\sqrt[3]{FG}$, ou $\sqrt[3]{FT}$, est à $\sqrt[3]{FC}$.

5°. Qu'autrement il y auroit une impossibilité absolue que ces deux loix pussent jamais s'accorder dans aucun système; au-lieu qu'on suppose leur accord possible dans celui de M. Newton. De sorte que s'il y a quelque impossibilité pour l'accord de ces deux.

deux loix dans le système des Tourbillons, elle ne peut venir que du côté des causes physiques, & non d'une raison purement géométrique.

II. M. Newton a démontré dans le premier Livre de ses Principes, que si dans un espace non résistant, deux mobiles T, M , décrivent des circonférences elliptiques $TLABG, MEC DH$, qui aient un foyer commun F , & que ces mobiles tendent à s'approcher du point F , en vertu d'une force *centripète*, qui croisse & décroisse en raison inverse des quarrés de leurs distances;

1°. Ces mobiles en circulant acquerront à chaque point de leur orbe une force *centrifuge*, égale à la force *centripète* en ce point, laquelle force centrifuge croîtra par conséquent, & décroîtra, de même que la force centripète supposée en raison inverse des quarrés des distances; & qu'en vertu de cette force centrifuge, & de la force centripète supposée, les mobiles T, M , continueront à décrire leurs ellipses.

2°. Que les vitesses des mobiles aux points correspondans $T, M: A, C: B, D: G, H: \&c.$ seront entre elles en raison inverse des racines de leurs distances $FT, FM: FA, FC: FB, FD: FG, FH: \&c.$ de ces mêmes points au foyer F . Et qu'en conséquence les distances moyennes FG, FH des deux mobiles T, M au foyer F , seront entre elles comme les racines cubiques des quarrés des tems de leurs révolutions.

3°. Que les vitesses de chacun des mobiles dans son orbe seront à chaque point $A, B,$
ou

ou C, D , de cet orbe en raison inverse de ses distances AF, BF , ou CF, DF , au foyer F . Et qu'en conséquence, le rayon FT , ou FM de chacun des mobiles, décrira des aires FAB, FBG , ou FCD, FDH , proportionnelles aux tems qu'ils auront employés à les décrire.

D'où il suit, que si l'on vient à démontrer qu'il peut y avoir dans le Tourbillon une disposition purement mécanique, qui produise dans tous les points de son Equateur, les mêmes effets que la force centripete, supposée par M. Newton, peut produire dans les mobiles T, M ; & que par conséquent l'on puisse substituer cette disposition du Tourbillon, à la place de la force centripete de M. Newton, sans rien changer à sa démonstration pour tout le reste; on aura trouvé dans le Tourbillon tout ce que M. Newton tire de sa force centripete, sans qu'il soit nécessaire d'admettre pour principe une telle force dans la Nature.

Préparation à la Démonstration.

C'est un principe reçu, que lorsque deux forces égales sont en équilibre, & qu'elles produisent un certain effet, on peut substituer à la place d'une de ces forces, un point d'appui inébranlable, sans que par cette substitution le même effet en reçoive aucune altération.

Au-lieu donc de la force centripete de M. Newton qui lui a servi de principe, & d'où il a déduit la force centrifuge des mobiles


$T,$

T , M , qui croît & décroît en raison inverse des quarrés des distances; 1°. Posons d'abord pour un instant autour de l'orbe elliptique $TLABG$, que le mobile T décrit, une superficie elliptique inébranlable qui retienne son centre dans la même circonférence; & autour de l'orbe elliptique $MECDH$, une autre superficie pareille; & pensons que ces superficies n'ont ici d'autre usage que de servir comme d'une suite de points d'appui aux mobiles T , M . 2°. Supposons encore que les mobiles T , M , ayent par quelque cause que ce puisse être la force centrifuge qui croît & décroît en raison inverse des quarrés des distances, que M. Newton leur a procurée par sa force centripete.

Et je dis, qu'en vertu de la résistance invincible des superficies supposées qui retiennent les mobiles dans les orbes elliptiques $TLABG$, $MECDH$, & de la force centrifuge, dont nous venons de parler, & que nous supposons que les mobiles ont par quelque cause que ce puisse être, comme ils l'avoient dans la démonstration de M. Newton par la force centripete, c'est une conséquence nécessaire, 1°. Que les mobiles, T , M , continuent à décrire les mêmes circonférences elliptiques autour du foyer F . 2°. Que les distances moyennes FG , FH , des deux mobiles T , M , au foyer F soient entre elles comme les racines cubiques des quarrés des tems de leurs révolutions. 3°. Que les rayons FT , FM , parcourent des aires proportionnelles aux tems; & le reste tout comme dans la démonstration de M. Newton.

Je ne dis pas ici que le mobile T doive avoir la force centrifuge dont je parle, en conséquence de la simple position de cette superficie elliptique. Au contraire, je prétends, comme on le verra bien-tôt, que ce mobile T ne peut avoir cette force centrifuge qui croît & décroît en raison inverse des quarrés des distances, qu'en vertu de la circulation de tous les points d'un Tourbillon autour de son centre, tant de ceux qui sont compris dans le plan de son Equateur, que de ceux qui sont compris dans les plans de tous les cercles paralleles à l'Equateur. Mais je dis seulement, pour préparer l'esprit du Lecteur à la démonstration suivante, que, supposé que par quelque cause que ce puisse être, le mobile en se mouvant le long de cette superficie elliptique, tende à s'éloigner du foyer F avec une force centrifuge qui croisse & décroisse en raison inverse des quarrés de ses distances AF , BF , à ce foyer, & que la superficie elliptique ne soit ici uniquement considérée que comme une suite d'appuis inébranlables; il suit évidemment, la démonstration de M. Newton supposée, que le mobile T en vertu de la résistance invincible de cette superficie qui le retient dans l'orbe $TLABG$, & de la force centrifuge dont nous venons de parler; il suit, dis-je, que le mobile continuera à décrire la même circonference elliptique autour du foyer F , & que son rayon CF parcourra des aires proportionnelles aux tems, tout comme dans la démonstration de M. Newton.

D E.



DEMONSTRATION.

Au-lieu des superficies elliptiques précédentes, supposons maintenant que les mobiles T , M aient reçu leurs vîtesses en vertu du mouvement des points d'un Tourbillon dont $MECDH$ est l'équateur, & que ce Tourbillon, au-lieu d'être également comprimé de toute part, ce qui lui donneroit la forme sphérique $Meccb$, est un peu moins comprimé du côté du point C de son équateur, que de toute autre part.

1^o. Il est déjà clair qu'aucun des points compris dans cet Equateur ne décrira plus do-

dorénavant une circonference de cercle, mais un ovale quelconque; & que cette compression du côté de C pourra être telle par rapport à la compression du côté de M , que les points T, M , décriront des orbes elliptiques $TLAGB$, $MECDH$, dont F , qui auroit été le centre des cercles $Tlabg$, $Mecdh$, que les mobiles T, M auroient décrits, si le Tourbillon étoit rond, deviendra le foyer commun des ellipses $TLAGB$, $MECDH$. Et voilà donc déjà que par cette inégale compression du Tourbillon, tous ses points T, M &c. sont contraints de décrire des ellipses $TLAGB$, $MECDH$, &c. dont le point F , d'où ils tendent à s'éloigner, peut être le foyer commun.

2°. J'ai démontré dans le Mémoire de 1728, que les forces centrifuges de tous les points d'un Tourbillon sphérique sont entre elles en raison inverse des quarrés de leurs distances au centre F . Et il est clair que dans un Tourbillon elliptique qui différera peu du sphérique, il s'en faudra peu que ces forces ne soient dans le même rapport.

Mais comme il ne s'agit pas ici de discuter si ces points auront ou n'auront pas cette force qui croît & décroît en raison inverse du quarré de la distance, mais seulement si supposé qu'ils l'ayent dans la précision la plus exacte, il est impossible qu'ils décrivent des aires proportionnelles aux tems; nous pouvons supposer d'abord ici que ces points ont une telle force, pour voir si cette supposition nous conduira, comme on le prétend, à cette impossibilité.

Supposons donc que dans un Tourbillon un peu

peu moins comprimé d'un côté C que du côté opposé M , les points T, M , de son Equateur puissent avoir à l'égard du point F cette force centrifuge qui croisse & décroisse en raison inverse des quarrés des distances AF, BF , ou CF, DF .

Et il s'ensuivra, de même que dans la démonstration de M. Newton, qu'en vertu de cette compression inégale du Tourbillon qui contraint tous ses points T, M , &c. à décrire des ellipses $TLABG, MEC DH$, &c. dont le centre F des forces est le foyer commun: Et de cette force centrifuge qui croît & décroît en raison inverse des quarrés des distances, il s'ensuivra, dis-je,

1°. Que les points T, M , continueront à décrire les ellipses $TLABG, MEC DH$.

2°. Que les distances moyennes FG, FH , des mobiles T, M , au foyer F , seront entre elles comme les racines cubiques des quarrés des tems de leurs révolutions.

3°. Et que les rayons FT, FM , décriront des aires FAB, FBG , ou $FC D, FDH$, proportionnelles aux tems qu'ils employent à décrire les arcs AB, BC .

Car nous avons déjà vu que la résistance que les Tourbillons environnans apportent à la force centrifuge des points de ce Tourbillon-ci, qui croît & décroît en raison inverse du quarré de la distance, doit produire en eux les mêmes effets, & être par conséquent substituée à la force centripete dont M. Newton a tiré les mêmes conclusions.

D'où il suit enfin que par tout le calcul de M. Newton transporté du système du Vuide dans

dans le système du Plein : ou que par la substitution d'une certaine disposition purement mécanique du Tourbillon qui contraint tous ses points à décrire des ellipses, & qui leur procure une force centrifuge qui croît & décroît en raison inverse des quarrés des distances au lieu & place de la force centripete supposée par M. Newton, qui ne peut produire que ces mêmes effets dans les mobiles ; bien-loin qu'il y ait dans le Tourbillon aucune incompatibilité réelle entre les deux loix de Kepler, l'une est une suite nécessaire de l'autre.

Seulement il arrivera que si ce n'est qu'à peu près que les points du Tourbillon aient cette force qui croît & décroît en raison inverse du quarré de la distance, les aires que ces points décriront ne seront aussi qu'à peu près proportionnelles aux tems ; ce qui sera encore plus conforme aux observations astronomiques qui donnent ces *à peu près*, & non ces précisions géométriques auxquelles on voudroit réduire le phénomène ; de sorte qu'il n'arrivera de-là rien autre chose, sinon que les forces mécaniques du Tourbillon nous fourniront avec plus de précision les loix astronomiques telles qu'elles sont en effet, que ne peuvent faire les forces purement métaphysiques de M. Newton, qui les donnent dans une trop grande précision géométrique.

R E M A R Q U E S.

Peut-être que ce qui a porté à croire qu'il y avoit de l'incompatibilité dans les loix astro-
tro-

tronomiques de Kepler considérées dans le Tourbillon, c'est qu'on a pensé que ces points ne pouvoient jamais décrire que ces cercles concentriques compris dans un même plan, & que si un mobile emporté par les courans d'un Tourbillon décriroit des ellipses, cela ne venoit pas de ce que ces courans étoient elliptiques & parfaitement semblables à l'orbite du mobile, mais parce que ces courans étant circulaires, le mobile, en vertu d'un certain balancement acquis originairement, passoit de l'un de ces courans dans l'autre, & les traversoit tous successivement en décrivant une ellipse.

Dans cette supposition j'avoue qu'il y auroit de la difficulté, & peut-être de l'impossibilité, à concilier les deux loix astronomiques dont nous parlons, parce qu'il ne paroît pas que ce balancement supposé gratuitement soit une cause suffisante pour contraindre le mobile à décrire une ellipse.

Mais toutes ces causes imaginées au besoin, & qui n'ont point une origine constante dans le mécanisme universel de la Nature, sont de pures chimères. Et M. Newton a très grande raison de rejeter de pareilles hypothèses, qui non seulement contiennent souvent plus de difficultés que l'on n'en a à expliquer, mais qui ordinairement vont se heurter de front contre les principes les plus clairs des Mécaniques.

Le plus convenable est donc de dire que dans un Tourbillon, les Planetes ne suivent leurs cours, soit elliptiques, soit circulaires, que parce que les courans qui les entraînent

suivent ces mêmes routes; & que ces courans suivent ces routes, soit circulaires, soit elliptiques, parce que le Tourbillon est ou également ou inégalement comprimé.

Or il est aisé de voir que l'inégale compression du Tourbillon solaire peut procéder du premier arrangement général de la matiere, principe de tout le mécanisme de l'Univers.

Et si, dans le même Tourbillon solaire, les orbes des Planètes ne sont pas dans un même plan; cela ne vient que de ce que la ligne tirée du point de la plus grande compression du Tourbillon à celui de la moindre, & qui passe par le centre des forces, n'est pas comprise dans le plan de l'Equateur général du Tourbillon. Ce qui, selon les loix des Mécaniques, doit transformer l'axe du Tourbillon qui seroit une ligne droite, si le Tourbillon étoit rond, & le contourner en forme d'hélice ou de tire-bouchon; ce qui dérangera tant soit peu toutes ses couches, & fera que les équateurs de ces couches, quoiqu'ils aient un foyer commun, ne seront pas dans un même plan, & s'entrecouperont dans des points opposés. Mais on ne peut expliquer ces effets purement mécaniques en peu de mots, & il suffit ici d'en avoir fait entrevoir la possibilité.



RECHERCHE SUR LE PLOMB.

Par M. GROSSE. *

PREMIERE PARTIE.

POUR peu qu'on ait de connoissance des métaux, on fait que le Plomb est presque toujours allié avec quelque autre substance métallique.

Il y a près de Goslar une Mine de Plomb, qui contient une assez grande quantité de *Zink*, qu'on en sépare d'une manière particulière pour le vendre à part; & on croit communément, que dans toute l'Europe il n'y a point d'autre Mine qui en contienné: aussi jusqu'à présent n'avons-nous pas de preuves bien certaines, qu'il y ait du *Zink* dans les plombs, qu'on achète ordinairement chez les Marchands; & à Goslar même les Ouvriers sont dans la persuasion, que leur plomb en est entièrement privé: cependant je rapporterai dans la seconde partie de ce Mémoire une expérience, qui peut faire soupçonner, que ce minéral existe encore dans certains Plombs.

Il se trouve aussi des Mines de Plomb *Cuivreuses*, & le plomb qu'on en retire conserve toujours quelque impression de *Cuivre*, ce qui à la vérité n'est pas aisé à appercevoir; mais *Kunckel* dans ses *Observations* l'a démontré

V 2

en

en coupellant avec un pareil plomb de l'argent extrêmement pur, & parfaitement exempt de Cuivre; car alors cet argent est sorti de la Coupelle altéré d'une touche, ou, comme dit Kunckel, de l'*esprit de Cuivre*, qui s'est fait connoître bien clairement par l'*esprit d'Urine*, qui s'en est teint en bleu: il a plusieurs fois répété cette expérience, qui ayant toujours réussi, ne laisse aucun doute sur l'existence du Cuivre dans ces sortes de plombs, & Kunckel donne ce procédé comme un moyen sûr pour reconnoître cet alliage cuivreux dans le Plomb, avant que de l'employer pour les Essais de Coupelle.

Il y a outre cela du Plomb, qui étant allié dans sa Mine avec de l'*Antimoine* reste après la fonte un *Plomb antimoné*, qui se fait bien connoître par son aigreur, & encore plus, parce que si on l'employe dans les Essais, il perce les Coupelles & coule à travers.

Les Essais de Coupelle démontrent encore dans le Plomb la présence de l'*Argent*; & de tous les plombs que j'ai essayés, il n'y a que celui de Villach en Hongrie, qui m'ait paru en être totalement exempt; ce qui fait qu'on l'estime fort pour les Essais, parce qu'on n'a aucune soustraction à faire par rapport à l'augmentation, qui se seroit faite par l'argent, que le plomb auroit fourni au grain ou bouton, qui restent dans la Coupelle.

Les Essayeurs s'apperçoivent aussi, que le plomb est quelquefois allié d'*Etain*, car l'*Etain* s'hérisse avec le plomb; ne lui permet pas de s'évaporer, ni de pénétrer dans la Coupelle; ainsi ces deux métaux restent calcinés, & empê-

pêchent l'argent de se rassembler en bouton. Cependant je crois, que l'alliage de l'Etain n'est pas naturel aux plombs neufs, & n'arrive guères qu'aux vieux plombs refondus, à l'occasion des foudres.

Quelques Auteurs ayant avancé, qu'il se trouvoit du Plomb, qui contenoit quelquefois de l'Or, j'ai examiné avec beaucoup d'attention tous les Plombs, que j'ai employés dans un grand nombre d'Essais, & je n'y en ai jamais pu appercevoir: on entend facilement, que je parle des plombs tout façonnés ou fabriqués, car s'il s'agit de mine de plomb, je sai, qu'il y en a une à Schemnits en Hongrie, & c'est peut-être la seule de toute l'Europe, qui est assez riche en Or, & pareillement en Argent, avec cette circonstance remarquable, que l'Or, qu'elle contient, n'est point minéralisé ou mêlé de souphre, comme le sont l'argent & le plomb de la même mine: aussi y a-t-il quelque avantage à l'en retirer; & on s'y prend de cette façon: on pile la mine, & on la réduit en poudre fine, l'arrosant toujours, pour n'en rien dissiper; ensuite on la lave à différentes reprises dans des auges en la remuant souvent, & en secouant un peu l'auge; le plus léger de la mine monte dans l'eau, que l'on vuide à propos dans d'autres vaisseaux, comme une espèce de *lavage*; & le plus pesant retombe au fond comme un *Sédiment*, lequel concentré de plus en plus devient jaune, & fait voir par cette couleur, que l'Or y domine sur un reste des deux autres métaux minéralisés, qu'on n'a pas pu entièrement enlever par les lotions. Pour

retirer l'or pur de ce Sédiment, il y a deux moyens; c'est de l'amalgamer, ou de le fondre dans un Creuset.

Si l'on employe le Mercure, il ne peut se charger que de l'Or, & il s'en charge d'autant plus aisément, que l'Or est ici en parcelles fines; mais il ne peut pas toucher ni à l'Argent ni au Plomb, parce que tous les deux sont mêlés de souphre que le Mercure ne peut pas leur ôter; au-lieu que tous les métaux, à l'exception de l'Or, peuvent revivifier le Mercure du Cinabre, en se chargeant du souphre commun, avec lequel le Vif-argent étoit auparavant uni.

D'un autre côté, si l'on fond dans un Creuset le Sédiment d'Or; la mine d'argent & la mine de plomb, qu'on n'a pas pu en séparer entièrement, sont ensemble une scorie bien fluide, & les parcelles d'or s'approchant & s'unissant tombent par leur propre poids au fond du Creuset en un régule ou culot d'Or d'autant plus pur, que les deux autres métaux ne sauroient s'y mêler, étant arrêtés ou retenus par le souphre; car ce minéral, étant seul & sans mélange, s'unit facilement avec tous les métaux, mais jamais avec l'Or; & je ne sache qu'un seul moyen de le faire agir sur l'Or: M. *Stahl* l'a indiqué dans son *Specimen Beccherianum*; c'est de faire avec le souphre & un sel alkali fixe un *hepar*, lequel étant en fonte au feu, si l'on y jette de l'Or, le divise tellement, & le retient si fort, que, quand on résout ce mélange par de l'eau, l'Or passe avec la solution de l'*hepar* au travers du papier à filtrer.

Pour

Pour ce qui regarde la mine de plomb lavée, qu'on n'a pas pu priver totalement de l'Or, ses plus fines parcelles s'élevant & s'échappant avec l'eau des lotions, on la fond, dans un grand fourneau élevé, mêlée avec de la pierre à Chaux & de bonnes Scories, qui sont des matieres qui facilitent la fonte: la pierre se calcinant dans le grand feu absorbe le souphre des deux métaux, qui en tenoient, & le Plomb en étant délivré coule aisément par l'ouverture, qui est au bas du fourneau, & se charge en même tems de l'Or & de l'Argent, qui s'y noient, pour ainsi dire: alors on jette le plomb en Saumons, qu'on porte ensuite sur une grande Coupelle, où l'on convertit la plus grande partie du plomb en litharge; & sur la fin de l'opération on vitrifie bien ce qui reste de ce plomb, lequel en cet état pénètre au-dedans de la Coupelle, & laisse en arriere un gâteau mêlé d'Or & d'Argent: on sépare enfin ces deux derniers métaux l'un d'avec l'autre, par le *Départ* ordinaire.

Outre ces métaux, plusieurs Auteurs, tant anciens que modernes, ont soutenu, que le Plomb contenoit du *Mercur*e, ce qu'ils lui croyoient commun avec tous les autres métaux. Beccher même & Kunckel nous ont laissé des procédés, par lesquels ils en ont retiré, à la vérité une très petite quantité, mais qui ne laisse pas d'être suffisante pour en démontrer l'existence.

Beccher dit dans sa *Physica subterranea*, p. 669. de l'édition de Leipsick, que le plomb en contient beaucoup, mais sans ajouter, qu'il en

en ait retiré, & sans en indiquer le moyen.

C'est cette maniere de retirer le Mercure des métaux, que les Auteurs ont appelée *Mercurification*, comme si par leurs procédés ils eussent fait & produit un Mercure, qui n'existoit pas dans les substances métalliques qu'ils employoient; ce qui fait dans leurs Ouvrages quelque confusion, & paroît tout-à-fait opposé à l'idée qu'ils avoient des métaux, puisqu'ils regardoient le Mercure comme un Principe hypostatique, ou réellement existant & essentiel aux métaux. Cependant comme ils n'appercevoient pas toujours bien clairement ce Mercure, ils le croyoient fixé, retenu ou embarrassé dans les métaux, selon Kunckel, par un *acide vitriolique*, & selon Beccher, par un *Soufre arsenical*.

Déterminés par cette Théorie, ces deux grands Chymistes, & en particulier Kunckel & d'autres après lui, ont employé des matieres alkalines pour retirer le Mercure du Plomb, se proposant de délivrer le Mercure des acides qui le tenoient lié, en présentant à ces acides une matiere, qui leur fût plus convenable que le Mercure, de la même maniere que par un Sel alkali on revivifie le Mercure du Turbith minéral, qui dans cette occasion est lié & comme fixé par l'acide vitriolique.

Je n'entreprendrai point ici de décider, si le Mercure, qu'on retire des métaux, y est arrêté par quelque acide, ou s'il y existe en nature & simplement comme un alliage; ou même, si celui qu'on en obtient, tire en partie son existence des autres matieres, qu'on
em-

employe pour l'en retirer : car j'attends, pour prendre mon parti sur cela, que les expériences, que je me propose de faire pour avoir du Mercure de quelques autres substances métalliques, m'aient fourni les lumières dont j'ai besoin. Mais comme plusieurs Auteurs modernes, & en particulier Rolfinkius dans l'Ouvrage qu'il a intitulé *Non-Entia Chymica*, ont nié qu'on pût retirer du Mercure des métaux, & ont été même jusqu'à révoquer en doute les procédés de Kunckel & de Beccher ; j'ai cru, qu'il seroit avantageux pour la Physique de rapporter le procédé, par lequel j'ai retiré du Mercure du Plomb, d'autant qu'il est simple & aisé à exécuter, & qu'il est tout-à-fait opposé à ceux de Kunckel & de Beccher, puisque bien loin de faire usage des alkalis, je n'ai employé que des acides, comme on en pourra juger par la comparaison des trois procédés, dont voici le détail.

Procédé de Kunckel, dans son Laboratoire Chymic. p. 420. „ Prenez du Plomb vitrifié
„ sans addition, ou de la litharge, ou même
„ du plomb calciné avec quelques Sels, de
„ l'un ou de l'autre deux onces, Sel de tar-
„ tre une once & demie, Chaux vive une
„ once, chargez-en une cornue & distillez
„ par un bon feu ; après l'opération ramassez
„ avec un peu de papier bleu une *poussière*
„ *blanche*, qui est dans le cou de la Cornue,
„ & vous appercevrez quelquefois de petits
„ globules de Mercure coulant ; mais pour
„ vous assurer que la poudre est mercurielle,
„ le, frottez-en une pièce d'or, & vous ver-

„ rez qu'elle la blanchira ". Il ajoute, qu'on peut faire la même chose avec le Saturne corré, qui est le plomb dissous dans l'esprit de Nitre, & précipité par l'esprit de Sel.

Procédé de Becher dans le 2^e. Supplément de sa Physica subterranea, p. 792. édit. de Leipsick.

Cet Auteur veut, „ qu'on mêle du Sel de „ tartre & de la Crème de tartre ensemble, „ comme si l'on vouloit faire du Sel végétal, „ & que dans le tems de la fermentation, „ qui s'y excite, on jette dans la liqueur des „ lamines de plomb, ou quelque autre métal, qui, selon lui, s'y dissoudront, le Sel „ arsenical sera divisé, le Mercure se séparera, & pourra être enlevé par la distillation, avec un esprit très pénétrant & ignée, „ & ensuite précipité par quelques sels, ou „ même attiré par l'or. ”

Je ferai mon possible d'examiner un jour ces Procédés, pour voir ce qui en est.

On peut ajouter à ce que je viens de rapporter, que Wedel, ci-devant Professeur à Jena, en Thuringe, dit, „ qu'ayant mis „ pendant des années de l'encre dans un Cornet de Plomb, & venant enfin à le nettoyer, il y avoit trouvé du Mercure; ce „ qu'il regarde comme une Mercurification „ du plomb faite par le Vitriol, comme il l'a „ rapporté lui-même au long dans les Ephémérides d'Allemagne ”: Mais M. Teichmeyer son successeur regarde la chose comme impossible, & soutient dans sa Chymie, qu'on lui avoit versé du Mercure dans son Cornet.

Pour moi, j'ai pris du plomb en nature, que

que j'ai seulement choisi le plus doux qu'il m'a été possible; quelquefois même, pour être plus sûr de sa ductilité, j'ai pris du plomb tiré en lames par les Vitriers, & d'autres fois j'ai simplement pris du plomb en Saumon, que j'ai fait battre & étendre pour donner plus de prise au dissolvant.

J'ai pris aussi de bon esprit de Nitre, que j'ai affoibli avec son poids d'eau, ce qui lui conserve assez de force pour agir sur le plomb: j'ai jetté à différentes reprises de petits copeaux de plomb dans cet esprit de nitre affoibli, que j'avois mis dans un petit matras, & j'ai remarqué, qu'à mesure que le plomb se dissolvait, il se précipitait quelquefois une poussière grisâtre, qui examinée sur l'Or, ou le Cuivre, est mercurielle, & même dans laquelle il y a assez souvent du Mercure coulant en petits globules. J'ai dit, que j'ai jetté peu-à-peu les copeaux de plomb dans l'esprit de nitre affoibli; car si l'on verse l'esprit de nitre sur une quantité de ces copeaux, ils se couvrent d'une *croûte saline*, dont je parlerai séparément dans la suite, & qui empêche que la dissolution du plomb ne se fasse bien.

J'ai répété cette expérience de différentes manières, quelquefois en faisant, comme dans l'expérience précédente, la dissolution sur un bain de sable tempéré, & d'autres fois avec un chaleur assez vive pour faire bouillir le dissolvant, ce qui réussit bien. Voici comme je m'y suis pris.

J'ai mis dans un matras, par exemple, huit onces de bon esprit de nitre, affoibli par au-

tant d'onces d'eau commune bien pure, dans lequel j'ai jetté à différentes reprises quatre onces de plomb réduit en lames, comme j'ai dit ci-dessus; & quelquefois j'y ai mis un peu plus de plomb.

J'ai fait remarquer, qu'il falloit de bon esprit de nitre, car si cet esprit étoit mêlé de l'acide du Sel marin, cela feroit une Eau régale, dans laquelle le plomb ne pourroit pas se soutenir, mais il se précipiteroit en *Saturne corné* à mesure qu'il se dissoudroit; & si cet esprit de nitre étoit mêlé de l'acide vitriolique, il se feroit un autre précipité, qui produiroit une espece de Vitriol de plomb.

Dans le tems de la dissolution, le plomb se couvre d'abord d'une *poudre grise*, & ensuite d'une *croûte blanche*: c'est cette croûte saline, dont j'ai déjà parlé, qui empêche le plomb de se dissoudre: ainsi pour aider à la dissolution j'ai mis le matras sur un bain de sable assez chaud pour faire bouillir le dissolvant, & dans l'espace de deux à trois heures tout le plomb s'est dissous, & la liqueur est devenue laiteuse. J'ai encore conservé quelque tems cette liqueur sur le feu, jusqu'à ce que j'aye apperçu qu'il se formoit des Crystaux à la superficie de la liqueur; alors je l'ai décantée dans une cucurbite pour l'examiner à part, & j'ai trouvé au fond du matras plus d'une demi-once d'une poudre grisâtre, qui, examinée sur l'Or, étoit assez mercurielle pour le blanchir, & qui contenoit même de petits globules de Mercure coulant; cependant une grande partie de cette poudre étoit encore ou saline ou terreuse, comme je le dirai dans la suite, en rapportant les expériences que j'ai faites pour:

pour reconnoître la nature de ce précipité.

Je ne crois pas, qu'il soit possible de trouver une manière plus simple de démontrer qu'on peut tirer du Mercure du plomb, puisqu'il n'est question pour cela que d'une simple dissolution. Mais comment peut-on imaginer, que se doit faire ici la précipitation du Mercure? Car enfin l'on sait bien, que l'esprit de nitre est aussi bien le dissolvant du vif-argent que celui du plomb, & d'ailleurs, qu'il y a une grande *affinité* entre le vif-argent & le plomb, comme le prouve la facilité d'en faire l'amalgame, & la prétendue fixation du Mercure par le plomb, même dans le tems que le plomb est figé, & seulement encore un peu chaud.

Voilà donc d'un côté le Mercure, qui s'unit très volontiers avec le plomb; d'un autre côté l'esprit de nitre est le dissolvant du Mercure aussi bien que du plomb; comment donc en expliquer la précipitation?

J'avois d'abord pensé, que mon esprit de nitre affoibli pouvoit bien agir sur le plomb, qui est assez aisé à dissoudre, mais non pas sur le vif-argent; & je crois, que cette raison peut bien entrer ici pour quelque chose.

Mais pour mieux éclaircir ce fait, j'ai jeté des morceaux de plomb dans une dissolution de Mercure faite par l'esprit de nitre, & à mesure que le plomb s'est dissous, le Mercure s'est précipité en poudre blanche, & en petits globules; ainsi il ne faut, pour précipiter le Mercure, que donner au dissolvant autant de plomb qu'il en peut soutenir, ce qui revient bien à la Table des Rapports

de feu M. Geoffroy, qui a mis dans la Colonne de l'esprit de nitre le Mercure au dessous du Plomb.

S E C O N D E P A R T I E.

J'E viens de dire dans la premiere partie de ce Mémoire, que le Plomb étoit ordinairement allié avec quelque autre substance métallique, comme le Cuivre, le Zink, l'Antimoine, l'Argent; & j'ai particulièrement indiqué un procédé abrégé & simple pour retirer du Mercure de ce Métal: mais comme ce procédé m'a offert plusieurs Phénomènes assez singuliers, je vais le reprendre dans cette seconde partie, pour en examiner toutes les circonstances avec autant d'attention & d'exactitude, qu'il me sera possible.

J'ai dit, que sur un bon feu de sable quatre onces de Plomb réduit en plaques, ou en lames, s'étoient dissoutes dans huit onces de bon esprit de nitre, affoibli par un poids égal d'eau commune; j'ai encore fait observer, qu'en cet état la dissolution étoit *laitueuse*, & que malgré l'ébullition il s'étoit formé des Crystaux à la superficie de la liqueur, pendant que d'un autre côté il s'étoit précipité au fond *une poudre grise*, qui blanchissoit l'Or, & même qui contenoit des gouttelettes de Mercure coulant.

Pour avoir séparément cette poudre grise, j'ai promptement décanté la dissolution *laitueuse* dans une Cucurbite, & en très peu de tems il s'est encore précipité *une poudre fort blanche, très fine, mais pesante*, & la dissolution,
au-

au lieu de blanche & laiteuse qu'elle étoit, est devenue limpide, & a pris une couleur *jaune*, éclatante, tout-à-fait semblable à une belle dissolution d'Or faite par l'eau régale. Ce précipité m'a encore obligé de décanter la dissolution : ainsi voilà trois choses, qu'il faut examiner, savoir 1. la *dissolution couleur d'Or*. 2. le *précipité blanc*. 3. le *précipité gris ou Mercuriel*.

Examen de la Dissolution couleur d'Or.

1. Cette liqueur fait d'abord sentir sur la langue une faveur douce, mais dans la suite elle la pique assez vivement, & y laisse une forte impression d'âcreté, qui dure longtems : ainsi l'acide nitreux est assez embarrassé par la matiere grasse, qui abonde dans le Plomb, & par la substance métallique, pour ne faire d'abord qu'une impression de douceur sur la langue ; peut-être la couleur jaune de cette dissolution vient-elle aussi de cette matiere grasse du plomb, car l'esprit de nitre que j'ai employé étoit assez clair.

2. L'huile de tartre par défaillance la précipite en blanc : cette précipitation n'a rien de singulier, & arrive pareillement à toutes les autres dissolutions métalliques ; l'alkali du tartre étant plus puissant que les substances métalliques, il se joint à l'acide, pendant que le métal tombe au fond.

3. Le Sel marin ou l'esprit de Sel précipitent cette liqueur ; comme quelques autres solutions métalliques, en flocons blancs ; mais ce qu'il y a de singulier, c'est que ce
pré-

précipité se dissout entièrement dans beaucoup d'eau chaude, ce que ne fait point le précipité blanc mercuriel, ni la Lune cornée.

4. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce Saturne corné, qui a un goût très sucré, étant dissous dans l'eau, peut de nouveau être précipité en blanc par l'huile de Vitriol, & ce précipité étant édulcoré n'a plus aucune saveur, & ne change point de couleur sur le feu, comme le fait la Céruse, mais il y reste très fixe. Cela doit faire une exception à la Table des Rappports de feu M. Geoffroy, colonne 8, dans laquelle l'acide du sel marin est regardé comme capable de dominer tous les autres acides à l'égard des substances métalliques, & l'expérience suivante démontrera encore beaucoup de rapport entre l'acide vitriolique & le plomb.

5. Une forte dissolution de Tartre vitriolé précipite promptement en blanc notre solution couleur d'Or, & elle fait la même chose sur le sucre de Saturne ordinaire dissous dans l'eau, ce qui est fort singulier; car l'huile de tartre est le plus puissant des alkalis, comme l'acide vitriolique est le plus fort des acides, ce qui fait qu'on ne peut séparer ces deux substances, quand elles sont une fois unies ensemble; on a beau jetter de l'esprit de nitre ou de l'esprit de sel sur du Tartre vitriolé, & à plus forte raison du Vinaigre, qui est le plus foible de tous, jamais on ne fera lâcher prise à l'acide vitriolique; de même qu'aucun alkali terreux, métallique, ou salin, ne se substituera à la place du sel de tartre, qui fait la base du tartre vitriolé. Cependant dans l'expérience

périence rapportée, il se fait un échange; l'acide vitriolique se joint au métal, & tombe avec lui au fond, pendant que le sel de tartre quitte l'acide vitriolique pour se joindre à l'acide nitreux, ce qui fait un Nitre régénéré. Il est vrai, que la même chose arrive, quand on mêle la dissolution de tartre vitriolé avec la solution d'argent faite par l'esprit de nitre; ou avec la solution de Mercure faite par le même acide, où il se fait un beau Turbith minéral; & enfin, comme l'a dit M. Boulduc dans son Mémoire sur les Eaux de Bourbon, avec l'huile de Chaux, où il se fait une concrétion Sélénitique: mais tous ces exemples ne rendent pas le fait plus aisé à expliquer.

Il ne faut pas omettre, que cette même solution couleur d'Or se laisse aussi précipiter par l'Alun & par le Vitriol ordinaire.

6. Elle blanchit l'eau commune, comme le fait aussi le sucre de Saturne ordinaire, parce que l'eau affoiblissant les acides, le métal tombe en forme de Magistère; ce qui rend l'eau laiteuse pour quelque tems.

7. Enfin, j'ai évaporé lentement cette liqueur, & par ce moyen j'en ai retiré de beaux Crystaux gros comme des grains de chenevis; 1. figurés en Pyramide régulière, dont la base étoit quarrée. 2. Ces Crystaux étoient jaunâtres, ou comme safranés, & extrêmement doux sur la langue, ce qui me les fait regarder comme un sucre de Saturne fait par l'acide nitreux, car ces Crystaux fusent sur les charbons ardens; bien plus, comme ils sont chargés de la matière grasse du plomb, ils fu-

fusent par eux-mêmes dans un Creuset, sans qu'il soit besoin d'y rien ajouter d'inflammable, & il paroît sur les bords du Creuset une flâme verdâtre. On a pareillement un Nitre fulminant par lui-même, quand on verse de l'huile de tartre par défaillance sur de l'esprit de nitre dulcifié, car le salpêtre qui se forme par ce mélange étant chargé de l'huile de l'esprit de Vin, fuse également de lui-même dans le Creuset. Ainsi notre sel est un sucre de Saturne nitreux, ou un salpêtre particulier, dans lequel l'esprit de nitre se trouve uni avec le Principe inflammable du plomb. Kunckel, dans son *Ars Vitruvia*, dit avoir retiré un semblable sel, en distillant de l'esprit de nitre dans un Alembic de verre, dont le Chapiteau étoit garni de lames de plomb, & il remarque, que voulant distiller de nouveau ce sel, comme l'on fait du sucre de Saturne, le vaisseau avoit crevé avec beaucoup de bruit, & au grand danger des assistans. 3. Ces Crystaux sont très difficiles à fondre dans l'eau, & ils la blanchissent à mesure qu'ils s'y dissolvent; ce qui me paroît venir de ce que les acides ne sont pas unis bien intimement avec ce métal, puisque, quand on affoiblit ces acides en y joignant de l'eau, une partie du métal tombe au fond en maniere de Magistère ou de Céruse, car c'est le Magistère, qui blanchit la solution de nos Crystaux; le sucre ordinaire de Saturne blanchit, comme l'on fait, pareillement l'eau, dans laquelle on le dissout. 4. Enfin nos Crystaux après avoir fusé dans le Creuset se vitrifient com-

comme la Céruse, & donnent aussi comme elle un petit régule.

Sur le Précipité gris ou Poudre Mercurielle.

1. J'ai déjà dit, que l'on appercevoit bien sensiblement dans ce précipité des gouttelettes de Mercure coulant; mais ce Mercure n'y est qu'en petite quantité, & seulement autant qu'il en faut pour démontrer incontestablement son existence.

2. J'ai aussi fait remarquer, que le reste blanchissoit le Cuivre & l'Or, ce qui annonce encore la présence du Mercure. Il est cependant certain, que ce précipité n'est pas entièrement mercuriel, & en l'examinant attentivement j'y ai aperçu, 1. des Crystaux, comme ceux dont je viens de parler, qui étant très difficiles à dissoudre, n'avoient pu se soutenir dans la dissolution de couleur d'Or, & s'étoient précipités au fond. 2. On y reconnoissoit encore une poudre blanche ou une portion de ce Magistère, que j'ai dit s'être précipité au fond de la dissolution couleur d'Or, & qui la rendoit laiteuse avant cette précipitation. 3. On y appercevoit une poudre grise, que je regardois comme la seule partie mercurielle. 4. Enfin il y avoit quelques morceaux de plomb, qui étoient restés en leur entier, parce que j'avois été obligé de donner à la liqueur autant de plomb qu'elle en pouvoit dissoudre, pour faciliter la précipitation du Mercure.

3. Pour séparer ces différentes substances, & avoir, s'il se pouvoit, la portion mercurielle.

rielle toute seule, j'ai versé de l'eau bouillante sur ce précipité, que je tenois toujours sur un fable chaud, dans l'intention de dissoudre les Crystaux, que j'y avois apperçus; &, soit à cause de la dissolution de ces Crystaux, soit à l'occasion d'une portion du Magistère, qui étant très fin pouvoit se soutenir dans l'eau bouillante, toute la liqueur est devenue laiteuse: je l'ai tenue en cet état toujours sur le fable chaud pendant 24 heures, & au bout de ce tems il s'étoit formé à la surface de la liqueur une croute blanche & grasse, & tant aux parois qu'à la partie supérieure du vaisseau, il s'étoit sublimé une *poudre grisâtre* fort légère, en apparence fort grasse, & qui frottée sur l'Or, le blanchissoit, ce qui fait une sublimation mercurielle d'une nature assez singulière; enfin cette édulcoration étant fort chaude, j'ai promptement décanté la liqueur laiteuse dans une grande Cucurbite.

4. J'ai passé pareillement 25 à 30 fois de l'eau bouillante sur ce même précipité, l'eau devenant toujours blanche; & à toutes les fois il se formoit à la superficie une peau grasse presque comme la première fois, c'est pourquoi j'ai versé toutes ces édulcorations dans la même Cucurbite pour les examiner ensemble.

5. Le précipité paroissant toujours considérablement chargé de poudre blanche, fatigué de répéter si souvent ces édulcorations, je voulus l'essayer de nouveau sur l'Or, pour voir, s'il étoit plus mercuriel qu'avant les édulcorations; mais il n'y faisoit plus la moindre

dre impression, & je fus très surpris de n'y plus appercevoir aucune apparence de Mercure: j'étois pourtant bien sûr, que ce précipité blanchilloit l'Or avant les édulcorations, & une portion que j'en avois conservée le blanchilloit encore très promptement. Cependant mon précipité ne contenant plus de Mercure, où devois-je espérer de le trouver? Je ne pouvois m'imaginer, qu'il eût pu passer avec la poudre blanche dans l'édulcoration, le Mercure étant une substance métallique trop pesante; & en effet, je n'en appercevois pas les moindres vestiges dans le précipité blanc: il est bien vrai, comme je l'ai fait remarquer, que dans les premières édulcorations il s'étoit sublimé une petite portion de Mercure, mais elle ne me paroissoit pas suffisante pour avoir consommé tout le mercure du précipité. Enfin ne sachant presque plus où chercher mon mercure, je m'avais d'examiner les petits morceaux de plomb, qui étoient restés au fond de la dissolution, & je fus très surpris de les trouver presque entièrement mercuriels, de sorte qu'il s'étoit fait dans l'eau sur le Bain de sable un amalgame de la portion mercurielle avec le plomb, qui étoit resté en entier & non-dissous; & il se passe ici à peu près la même chose que dans cette opération, qu'on appelle improprement la *fixation du Mercure par le plomb*.

J'ai dit, que j'avois versé pêle-mêle, dans une grande Cucurbite, toutes les liqueurs de mes édulcorations, & qu'il s'étoit précipité au fond une *poudre blanche*, qui ne faisoit aucune impression sur l'Or, & qui étoit tout-à-

à-fait semblable au Magistère, dont j'ai déjà parlé; c'est pourquoy je les examinerai toutes ensemble.

Pour la liqueur furnageante, quoique filtrée, elle étoit légèrement blanchâtre, & elle restoit toujours couverte de la pellicule grasse, dont j'ai aussi déjà parlé, qui s'épaississoit à mesure qu'on l'évaporoit, & étant évaporée à siccité il restoit au fond du vaisseau un mélange du Magistère & du sel, que j'ai examiné dans le premier article.

Au reste, cette liqueur blanchâtre rend l'eau commune bien laiteuse, & fait avec l'huile de tartre, le sel marin, l'esprit de sel, & le tartre vitriolé les mêmes effets que la dissolution de couleur d'Or, à qui elle est tout-à-fait semblable, à la concentration près.

*Sur le Magistère ou la Poudre blanche lavée
& édulcorée.*

1. Cette poudre blanche bien édulcorée & séchée n'a aucune saveur, non plus que la Céruse ordinaire.

2. Elle ne blanchit point du tout l'Or.

3. Les acides l'attaquent vivement, cependant ils n'en dissolvent qu'une partie, qui peut être précipitée par le sel de tartre, mais il en reste une portion indissoluble; ainsi il y a deux matières différentes dans cette poudre, & je crois, que cette différence vient de ce qu'une partie est totalement réduite en Chaux, pendant que l'autre paroît encore un peu métallique.

4. Ayant mis seule dans un Creuset à un feu assez

assez vif une portion de cette poudre blanche, elle s'est calcinée & réduite peu à peu en une cendre jaune, qui n'avoit aucune apparence de métal ni de verre; mais ce qui étoit remarquable, c'est qu'il s'étoit sublimé au haut du Creuset une espèce de *coton* fort léger, sans faveur, & qui ne blanchissoit pas l'Or: ce coton ou duvet étoit en trop petite quantité pour faire dessus d'autres expériences; mais il ressemble fort aux fleurs de Zink, & puisque ce métal se trouve quelquefois dans la mine de plomb, ne seroit-il pas probable, que ces fleurs seroient effectivement des fleurs de Zink, retenu dans le plomb? Cependant ce pourroit être aussi une sublimation de plomb faite par l'acide nitreux.

5. Ayant répété la même expérience avec une autre portion de la même poudre blanche, mais à un feu brusque & violent, elle s'est convertie, comme la Céruse ordinaire, partie en verre, & partie en petits globules de plomb; ce qui vient probablement de ce que cette poudre retient encore assez de phlogistique pour faire la réduction d'une partie en plomb, pendant que l'autre, qui en est totalement privée, se vitrifie.

6. La poudre blanche mise sur un charbon ardent se régénère en bonne partie & assez promptement en plomb.

7. Enfin cette poudre étant traitée par le flux noir ou réductif, la moitié de son poids se ressuscite en plomb, qui est fort ductile, & qui est presque aussi blanc que l'Etain. Il est bon de remarquer, que le *Caput mortuum* de la distillation du sucre de Saturne ordinaire
peut

peut aussi par cette voye donner la moitié de son poids de plomb bien conditionné.

Après les expériences, que je viens de rapporter, je crois, qu'il n'est plus douteux, qu'on puisse retirer du Mercure du plomb, puisque je l'ai eu (1.) en globules, (2.) en poudre grise, (3.) sublimé au haut du vaisseau, & (4.) amalgamé avec le plomb même.

Outre cela le plomb fait avec l'acide nitreux un sel fort approchant du sucre de Saturne, mais un des plus difficiles à dissoudre que je connoisse. Enfin ce sel se décompose *fort aisément*, & par une simple dissolution, il s'en détache une matiere grasse, qui forme la peau, dont j'ai parlé, & ce métal se précipite en une Chaux, ou en un Magistère, qu'on pourroit comparer à la Céruse ordinaire; mais quand on verse de l'huile blanche de Vitriol sur cette poudre, au bout de 24 heures elle prend une couleur rouge & une odeur vineuse assez agréable, ce qui vient de ce que l'huile de Vitriol, qui change de couleur, & acquiert de l'odeur sur les matieres grasses qu'elle rencontre, souffre encore ici du changement par la même raison, parce qu'elle trouve un principe inflammable dans le Magistère du plomb.

OBSE^RVATION DU SOLEIL
VU ELLIPTIQUE

A environ 10 degrés de hauteur sur l'horizon,
le 28 Juin 1733.

Par M. DE MAIRAN. *

LA Réfraction qui, dans notre Climat, élève ordinairement les Astres de 32 ou 33', lorsqu'elle est horizontale, ou qu'ils sont à 0° de hauteur, ne les élève plus que d'environ 16' lorsqu'ils sont à 3°, de 8 à 9' lorsqu'ils sont à 6°, & enfin d'environ 5' $\frac{1}{2}$ lorsqu'ils sont à 10° de hauteur. Le décroissement est d'abord très rapide auprès de l'horizon, la différence de la Réfraction de 0 à 1° étant de près de 5'; ensuite, & de plus en plus, il est très lent, la différence de 9 à 10°, ou de 10 à 11° n'étant que d'environ 30". C'est donc un phénomène très rare, que de voir le Soleil sensiblement elliptique à 10° de hauteur, tel qu'il l'étoit le Dimanche 28 Juin, vers les 6^h $\frac{1}{4}$ du soir. Je ne me souviens pas du moins d'en avoir lu d'exemple dans les Ouvrages qui ont été faits sur cette matière, & principalement dans le *Solis Elliptici Phenomenon*, &c. du P. Scheiner, qui a, comme on sait, traité amplement de cette matière. C'est toujours le Soleil vu à l'ho-
ri.

* 1 Juillet 1733.

Mém. 1733.

X

rizon, ou fort près de l'horizon, qui prend cette forme par le moyen de la Réfraction, & la Table que cet Auteur donne de pareils phénomènes ne leur fait pas passer $1^{\circ} 30'$. Mais le 28 Juin, ayant regardé par hasard le Soleil, dont le disque étoit depuis près d'une heure fort rouge, & si dépouillé de rayons, qu'on pouvoit le regarder sans en être ébloui, je fus bien étonné de le trouver visiblement elliptique, à une si grande hauteur. Je n'étois nullement en lieu propre à observer autrement qu'à la vue simple; tout ce que je fis donc, fut de regarder à ma Montre, où je vis, comme je m'en assurai le soir à une Pendule réglée, qu'il étoit $6^h \frac{1}{2}$; & d'où je tirai la hauteur. Je courus d'abord après à une promenade qui étoit tout proche, & qui donne sur le Couchant, pour voir jusqu'où iroit cette ellipticité lorsque le Soleil feroit plus près de l'horizon. Je l'avois jugée auparavant telle que le diamètre horizontal pouvoit avoir sur sept à huit parties, une partie de plus que le vertical. Mais je ne pus continuer l'observation que jusqu'à $7^h 25'$, où le Soleil se cacha derrière un brouillard si épais, quoiqu'il me semblât auparavant uniforme avec la partie supérieure du ciel, qu'il trancha d'abord le disque du Soleil, comme auroit pu faire le corps le plus solide & le plus opaque; & que bien-tôt après ce disque ne parut plus du tout. Le ciel étoit grisâtre, sans aucun nuage apparent, quoiqu'il y en eût eu quelques-uns répandus çà & là vers les 6^h , où le globe du Soleil paroissoit déjà comme un boulet rouge.

Ce

Ce qui m'a confirmé que l'ellipticité dont je viens de parler, & qui se soutint jusqu'au moment où le Soleil me fut caché, devoit être très sensible pour des yeux un peu accoutumés à considérer les objets célestes, c'est qu'ayant rencontré le lendemain une personne de ma connoissance * qui les observe quelquefois, & lui ayant demandé s'il avoit regardé le Soleil de la veille, il me répondit tout aussi-tôt, qu'il l'avoit vu elliptique, à la même heure, de la manière, & avec toutes les mêmes circonstances que je viens de décrire.

J'oubliois de dire que le bord inférieur me parut souvent faire partie d'une plus grande Ellipse, ou plus allongée, que le supérieur, qui au contraire sembla quelquefois s'élever au dessus de la circularité, ainsi que l'on fait en effet que la chose doit arriver. Cependant je dois remarquer qu'à 6^h $\frac{1}{4}$, lorsque je commençai à m'appercevoir de ce Phénomène, la partie supérieure du disque étoit sensiblement surbaissée, & il n'y eut même d'abord que sa partie supérieure qui me fit aviser d'y regarder, l'inférieure m'étant cachée par le comble d'une maison qui étoit vis-à-vis.

J'ai appris depuis, que le Soleil avoit été vu pâle & défaillant le même jour en Languedoc à Béziers.

DE

* M. de la Chevalerie, Gouverneur de S. A. S. M. le Prince de Conti.

~~~~~

# DE LA DETERMINATION

DE

## L'ORBITE DES COMETES.

Par M. BOUGUER. \*

**I**L est avantageux pour la perfection de l'Astronomie, de même que pour celle de toutes les autres Sciences qui ne sont pas purement spéculatives, d'avoir un certain nombre de différentes Méthodes pour parvenir aux mêmes déterminations. Il arrive souvent qu'une opération qui est extrêmement simple dans l'application qu'on en fait dans certains cas, ne l'est pas également dans les autres rencontres ; & lorsqu'on a plusieurs moyens, on peut en changer selon les circonstances, & se servir de l'un au défaut de l'autre. C'est-là principalement l'avantage que nous avons en vue, en communiquant cet Ecrit : mais il se trouvera, peut-être, que notre travail aura encore quelque autre espece d'utilité. Dans toutes les Méthodes qu'on a proposées jusqu'à présent pour déterminer l'orbite des Comètes, on est obligé d'attendre que la courbure de leur chemin se déclare sensiblement, ou il faut en connoître au moins une portion qui soit déjà considérablement curviligne. Ce-  
la

\* 19 Décembre 1733.



la est cause qu'il faut avoir dans quelques-unes de ces Pratiques un grand nombre d'observations; & un inconvénient qui leur est encore commun à toutes, sans même excepter celle qu'enseigne M. Newton dans son troisième Livre, (quoiqu'elle soit très belle & très savante) c'est que pour peu qu'on se trompe dans la courbure de la petite portion déterminée du chemin de la Comete, on commet ensuite dans tout le reste des erreurs très considérables. La méthode que nous proposons n'est pas dans le même cas; outre qu'elle nous paroît plus conforme aux propres principes du célèbre Auteur que nous venons de citer, elle sera encore moins sujette à l'inconvénient dont il s'agit, puisqu'elle exige simplement qu'on connoisse la vitesse de la Comete dans un seul point, avec la plus petite portion rectiligne de son orbite.

A l'égard de cette portion rectiligne ou de la tangente à l'orbite, nous pouvons supposer qu'on l'ait déjà trouvée par la méthode même de M. Newton, ou par celle de M. Wren qui est expliquée dans la Proposition XI. du cinquieme Livre des Elémens d'Astronomie de M. Gregori. On pourra encore, si on le veut, employer pour la découvrir, la construction fort simple & fort élégante que M. Cassini a publiée en 1727 dans les Mémoires de l'Académie. Cependant pour rendre notre Ecrit plus complet, nous allons aussi examiner le même Problème: nous viendrons à bout de le résoudre en n'employant que trois observations; parce qu'au-lieu de ne faire attention qu'aux seules longitudes de

X 3

la

la Comete, nous ferons attention à ses longitudes & à ses latitudes.

# PROBLEME I.

*Trois observations d'une Comete étant données à peu de distance l'une de l'autre, déterminer sa vitesse avec la petite portion de son Orbite?*

\* Nous supposons que  $1A$ ,  $2A$ , &  $3A$  (Fig. 1.) marquent les trois lieux où étoit la Terre, lorsqu'on a observé la Comete: on fait toujours par la Théorie du Soleil la situation de ces trois points les uns par rapport aux autres, de même que par rapport au point  $S$  occupé constamment par le Soleil. Les lignes  $1AD$ ,  $2AD$  &  $3AD$ , qui sont dans le plan de l'Ecliptique, sont disposées selon la longitude qu'avoit la Comete vue de la Terre dans les trois observations. La Comete étoit d'abord en  $1B$  sur le rayon visuel  $1A1E$ , ensuite en  $2B$  sur le rayon visuel  $2A2E$ , & enfin en  $3B$  sur le troisieme rayon visuel  $3A3E$ , de sorte que  $1B3B$  est la petite portion de son orbite, & c'est cette petite portion que nous voulons déterminer. Nous supposons d'ailleurs que cette ligne est droite & parcourue d'un mouvement uniforme, à cause du peu d'intervalle qu'il y a entre les trois observations; & il faut remarquer que cette même ligne n'est pas dans le plan de l'écliptique, parce que la Comete est censée avoir de la latitude. Le point  $1B$  est élevé au dessus du plan  $S1AD3A$  de l'Ecliptique de la quantité.

té perpendiculaire \*  $1B1C$ , & les points  $2B$  &  $3B$  des quantités  $2B2C$  &  $3B3C$ . Ainsi la ligne droite  $1C3C$  est la projection de la partie  $1B3B$  de l'orbite de la Comete, ou, ce qui revient au même, c'est l'orbite réduite à l'Ecliptique: & il est clair encore que les angles  $1B1A1C$ ,  $2B2A2C$  &  $3B3A3C$  marquent les trois différentes latitudes de la Comete que les observations nous ont fournies.

## PREMIERE SOLUTION.

Cela posé, nous nommons  $a$  &  $b$  la longueur des deux lignes  $1AD$  &  $2AD$ , &  $i$  le sinus de l'angle  $1AD2A$  qu'elles forment, qui est le changement en longitude de la Comete entre les deux premieres observations. Nous nommerons  $C$  la partie  $D3D$  de la premiere ligne, interceptée entre la seconde  $2AD$  & la troisieme  $3A3D$ , & nous nommons  $e$  cette derniere ligne  $3A3D$ .  $k$  fera le sinus du changement en longitude fait entre la deuxieme & la troisieme observation, c'est-à-dire, qu'en tirant  $2CF$  parallelement à  $3A3D$ ,  $k$  fera le sinus de l'angle  $D2CF$ ; & nous marquerons par  $l$  le sinus du changement total fait entre la premiere & la troisieme observation, de sorte que  $l$  sera le sinus de l'angle  $1A3D3A$ , ou de l'angle  $1AF2C$ . Je désigne de plus par les trois lettres  $f, g$  &  $h$ , les trois lignes  $D1E$ ,  $D2E$  &  $3D3E$  qui sont perpendiculaires au plan de l'Ecliptique, & qui marquent combien les trois rayons vi-

suels

\* Fig. 1.

fuels 1  $A$  1  $E^*$ , 2  $A$  2  $E$  & 3  $A$  3  $E$ , sont élevés en 1  $E$ , en 2  $E$  & en 3  $E$ , au dessus des points  $D$  & 3  $D$ . Toutes ces grandeurs sont données, de même que le tems  $m$  écoulé entre les deux premieres observations, & le tems total  $n$  écoulé entre la premiere & la troisieme. Mais enfin comme nous ne connoissons point la situation de la portion 1  $B$  3  $B'$  de l'orbite de la Comete, non plus que celle de sa projection 1  $C$  3  $C$ , nous ignorons combien le point 2  $C$  est éloigné du point  $D$ : nous nommons  $x$  cette distance, & nous allons travailler à la découvrir, parce qu'il sera facile d'en conclure tout le reste.

Je cherche d'abord 2  $B$  2  $C$  par cette analogie,  
 $2AD = b : D2E = g :: 2A2C = b - x : 2B2C$   
 $= \frac{bg - gx}{b}$ .

Je cherche ensuite l'expression de 2  $CF$  & celle de  $FD$  par ces deux autres proportions; le sinus  $l$  de l'angle  $F$  qui est égal au changement en longitude de la Comete entre la premiere & la troisieme observation, est à 2  $CD = x$  comme le sinus  $i$  de l'angle  $FD2C$  est à  $F2C = \frac{ix}{l}$ , & comme le sinus  $k$  de l'angle  $F2CD$  qui est égal au changement en longitude survenu entre la seconde & la troisieme observation est à  $FD = \frac{kx}{l}$ . Je fais attention après cela que comme la Comete est censée se mouvoir en ligne droite avec une vitesse uniforme, les espaces 1  $B$  2  $B$  & 1  $B$  3  $C$

\* Fig. 1.

$1B3B$  \* qu'elle parcourt sur  $1B3B$  depuis le point  $1B$  de la première observation, sont proportionnels aux tems  $m$  &  $n$  qu'elle met à parcourir ces espaces. Mais  $1C2C$  &  $1C3C$  sont dans le même rapport, &  $F2C$  &  $3D3C$  doivent être aussi en même raison. Ainli nous

avons cette analogie,  $m : n :: F2C = \frac{ix}{l}$   
 $: 3D3C = \frac{inx}{lm}$ ; d'où il suit que  $3C3A$   
 $(= 3D3A - 3D3C)$  est égal à  $e - \frac{inx}{lm}$  ou  
à  $\frac{elm - inx}{lm}$ ; & la ressemblance des triangles  
 $3E3D3A$  &  $3B3C3A$  nous donnera ensui-  
te  $3A3D = e : 3E3D = b :: 3A3C = \frac{elm - inx}{lm}$   
 $: 3B3C$ , de sorte que nous aurons  $\frac{eb lm - enx}{elm}$

pour la valeur de la perpendiculaire  $3B3C$ .

Je considère d'un autre côté que  $1C3C$  étant à  $1C2C$  comme  $n$  est à  $m$ , il y a même rapport de  $2C3C$  à  $1C2C$  que de  $n - m$  à  $m$ , & qu'il y a aussi même rapport de  $F3D$

$(= FD + D3D = \frac{kx}{l} + C) = \frac{elm + kx}{l}$  à  
 $1CF$  qui doit être de cette sorte, égale à  
 $\frac{elm + kmx}{ln - lm}$ . Or si l'on ôte  $1CD (= 1CF$

$+ FD = \frac{elm + kmx}{ln - lm} + \frac{kx}{l} = \frac{elm + knx}{ln - lm}$  de

$1AD = a$ , nous aurons  $1A1C = \frac{aln - alm - elm - kax}{ln - lm}$ .

X 5

Et

Et nous n'aurons plus ensuite qu'à faire cette analogie, \*  $1AD = a : D1E = f :: 1A1C$

$$= \frac{aln - alm - clm - knx}{ln - lm} : 1C1B$$

$$= \frac{afln - aflm - cflm - fknx}{aln - alm}$$

Ainsi nous avons maintenant en  $x$  l'expression des trois perpendiculaires  $1C1B$ ,  $2C2B$  &  $3C3B$ , dont la Comete étoit éloignée du plan de l'écliptique au tems des trois observations: nous avons d'abord trouvé l'ex-

pression  $\frac{bg - gx}{b}$  de  $2C2B$ , ensuite celle

$\frac{eblm - binx}{elm}$  de  $3C3B$ , & en dernier lieu

celle  $\frac{afln - aflm - cflm - fknx}{aln - alm}$  de  $1C1B$ .

Ces trois quantités sont indéterminées: mais puisqu'elles ne le sont qu'à cause de la seule inconnue  $x$  qu'elles renferment, & que d'ailleurs nous avons déjà fait en sorte que les parties  $1C2C$  &  $1C3C$  de l'orbite réduite à l'écliptique sont entre elles comme les tems  $m$  &  $n$ , il ne nous reste plus qu'à mettre entre les trois perpendiculaires  $1C1B$ ,  $2C2B$  &  $3C3B$ , la relation qui est nécessaire, pour que la portion  $1B3B$  de l'orbite de la Comete se trouve droite. Car il est facile de remarquer que comme les trois rayons visuels  $1A1E$ ,  $2A2E$  &  $3A3E$  ne sont pas dans le même plan, il se pourroit faire que la projection  $1C3C$  de l'orbite fût une ligne droite, & que l'orbite même  $1B2B3B$  ne le fût

fût pas. Nous devons donc considérer que dans la supposition que nous faisons que la portion \* 1 B 3 B du chemin de la Comète est exactement rectiligne, l'excès de 1 C 1 B sur 2 C 2 B est à l'excès de 1 C 1 B sur 3 C 3 B comme 1 C 2 C est à 1 C 3 C, ou comme  $m$  est à  $n$ , c'est-à-dire, que nous avons en termes algébriques

$$\text{ques } \frac{abfln - abflm - bcfm - bfkx - abglx + aglx + abglm - aglmx}{abln - ablm}$$

$$= \frac{aeflmn - aeflm^2 - ceflm^2 - efkmnx - aeflmn + abimx + ablm^2 - abimnx}{aclm - aeflm^2}$$

::  $m : n$ . Nous en déduisons l'équation

$$\frac{abfln^2 - abflmn - bcfm - bfkx - abglx + aglx + abglm - aglmx}{abln - ablm} = \frac{aeflmn - aeflm^2 - ceflm^2 - efkmnx - aeflmn + abimx + ablm^2 - abimnx}{aclm - aeflm^2}$$

$$= \frac{aeflmn - aeflm^2 - ceflm^2 - efkmnx - aeflmn + abimx + ablm^2 - abimnx}{acim - aeflm}$$

qui se réduit en donnant le même dénominateur aux deux membres, & en les divisant par  $n - m$ , à  $abimx - aeflx + bcfm - abglm - abglm - abeflm + abeflm - bcfm$ . Or on tire de cette équation la formule

\* Fig. 1.

$$x = \frac{abefln - abegln - abeflm + abebim - bceflm}{abbin - aegln + befk n}$$

$$= \frac{l \times f - g + \frac{lm}{n} \times b - f - \frac{cf}{a}}{\frac{bi}{e} - \frac{gl}{b} + \frac{fk}{a}} \text{ qui exprime,}$$

comme on le voit, en grandeurs entierement connues & d'une maniere assez simple, la valeur de  $x$  ou de  $D2C$  que nous nous proposons de découvrir.

On peut introduire à présent, si l'on veut, cette valeur de  $x$  dans les expressions de toutes les lignes qui déterminent la situation de la portion  $*1B3B$  de l'orbite; ou bien après avoir trouvé  $x$ , on n'aura qu'à chercher toutes les autres lignes par la simple résolution des triangles. Connoissant  $D2C$ , on connoitra  $2A2C$ , & dans le triangle  $2A2C2B$  rectangle en  $2C$ , & dans lequel l'angle  $2A$  est connu, puisqu'il marque la latitude qu'avoit la Comete dans la seconde observation, on trouvera  $2C2B$ , & la vraie distance  $2A2B$  de la Comete à la Terre. On résoudra ensuite le triangle  $F2CD$ , dont on a découvert le côté  $D2C$ , & dont on connoit les trois angles, qui sont égaux aux différences qu'a reçues la longitude de la Comete dans l'intervalle des observations. Il n'y aura plus après cela qu'à faire cette analogie,  $m$  est à  $n$  comme  $F2C$  est à  $3D3C$ ; & aussitôt que  $3D3C$  sera trouvée, on connoitra  $3C3A$ , & on découvrira  $3C3B$  en résolvant le triangle rectangle  $3B3C3A$ . D'un autre côté,

on.



on ajoutera selon les differens cas, \*  $FD$  avec  $D_3D$ , ou l'on soustraira l'une de ces lignes de l'autre pour avoir  $F_3D$ , & on cherchera ensuite  $1CF$  par cette analogie  $n - m$  est à  $m$  comme  $F_3D$  est à  $1CF$ . Après cela on connoitra  $1A1C$ , & on trouvera  $1C1B$  dans le triangle rectangle  $1A1C1B$ . Enfin, si dans le triangle  $1C_3D_3C$  dont on connoit l'angle compris  $3D$ , les deux côtés  $1C_3D$ ,  $3C_3D$ , on cherche le troisieme côté  $1C_3C$ , on aura le chemin de la Comete réduit à l'Ecliptique; & il sera facile de trouver le chemin même  $1B_3B$ , en concevant une ligne égale & parallèle à  $1C_3C$ , qui partant du point  $3B$ , & venant rencontrer  $1B1C$ , forme avec cette ligne, & avec  $1B_3B$ , un triangle rectangle qu'il n'y aura qu'à résoudre. On aura de cette sorte l'espace parcouru par la Comete sur son orbite dans le tems  $n$ , & on pourra trouver l'espace qu'elle parcourt à proportion dans un jour ou dans une heure, &c. Il faut remarquer que si l'on ne veut point employer de calcul dans toutes ces opérations, on pourra résoudre par le moyen d'une figure les triangles que nous venons de considérer; après qu'on aura trouvé la valeur de  $2CD$ , en construisant la formule

$$x = \frac{l \times \overline{f-g} + \frac{lm}{n} \times \overline{b-f} - \frac{cf}{a}}{\frac{bi}{e} - \frac{gl}{b} + \frac{fk}{a}}.$$

## SECONDE SOLUTION.

Cette construction ne sera pas difficile à former; mais en voici une qui est extrêmement simple, que nous avons trouvée en cherchant immédiatement les lieux géométriques qui conviennent à la nature du Problème, & qui doivent le résoudre par leur combinaison. Je joins les points  $1A$  &  $3A$  où étoit la Terre au tems de la première & de la troisième observation par une ligne droite  $1A3A$ , qui rencontre en  $K$  la ligne  $D2A$  prolongée s'il est besoin. Je fais ensuite  $1AL$  &  $1AK$  comme le tems  $n$  écoulé entre la première & la troisième observation est au tems  $m$  écoulé entre la première & la seconde; & après avoir conduit  $LM$  parallèlement à  $KD$ , j'éleve du point  $M$ , la perpendiculaire  $MN$  au plan de l'Ecliptique; & des points  $M$  &  $N$ , je conduis les deux lignes  $MLA$  &  $NIA$  qui coupent en  $O$  & en  $Q$  le plan  $KD2E$ , qui est élevé perpendiculairement à l'Ecliptique, sur la ligne  $KD$ . Il est facile de voir que toute cette opération ne tend qu'à trouver une ligne  $1AN$  conduite du premier rayon visuel  $1A1E$  au troisième  $3A3E$ , & à faire en sorte que cette ligne  $1AN$  soit partagée par le point  $Q$ , de manière que  $1AQ$  soit à  $1AN$ , comme le tems  $m$  écoulé entre les deux premières observations est au tems total  $n$  écoulé entre la première & la troisième. Ainsi, si l'on n'avoit point observé la latitude de la

Co.

Comete la seconde fois, ou qu'on n'eût pas vu cette Comete sur le rayon \* 2 *A* 2 *E*, on pourroit prendre la ligne 1 *A* *N* pour sa trajectoire ou pour son chemin; puisque cette ligne satisfait à toutes les autres conditions du Problème.

Mais on peut imaginer une infinité d'autres trajectoires qui satisferont également aux conditions, aussi-tôt qu'on exceptera toujours l'observation de la latitude, faite lorsque la Terre étoit en 2 *A*. Si l'on cherche *DG* par cette analogie,  $n - m : m :: D_3 D : GD$ , ce qui donne  $n : m :: G_3 D : GD$ , & que du point *G*, on élève la perpendiculaire *GH* au plan de l'Ecliptique, jusqu'à la rencontre *H* du premier rayon visuel, on n'aura qu'à conduire de ce point *H* au point 3 *E*, la ligne droite *H* 3 *E*; & cette ligne aura encore la propriété d'être partagée en *I* par le plan 2 *A* *D* 2 *E*, de maniere que *HI* sera à *H* 3 *E*, comme le tems *m* écoulé entre les deux premieres observations est au tems *n* écoulé entre la premiere & la troisieme; puisque *HI* est à *H* 3 *E* comme *GD* à *G* 3 *D*. Ainsi, si la Comete parcouroit *H* 3 *E*, en parvenant en *I* & en 3 *E*, en même tems que la Terre passe de 1 *A* en 2 *A* & en 3 *A*, les Phénomènes seroient encore entierement conformes aux observations; sinon que la Comete étant en *I* dans la seconde, ne seroit pas sur le rayon visuel 2 *A* 2 *E*, & n'auroit pas par conséquent, étant vue de la Terre, la latitude qu'on lui a observée. En un mot, tant qu'on veut que la

la trajectoire ne satisfasse qu'aux latitudes & longitudes de la premiere & de la troisieme observation, & à la seule longitude de la seconde, le Problème est indéterminé, on peut tirer du rayon visuel  $\cdot 1 A 1 E$  au rayon visuel  $3 A 3 E$  une infinité de trajectoires, comme  $1 A N$ ,  $1 B 3 B$ ,  $H 3 E$ , &c. Et il est constant, puisque le Problème est du nombre de ceux qu'on nomme simples, qu'en conduisant du point  $Q$  au point  $I$  la ligne droite  $Q I$ , on aura le lieu de tous les points  $Q$ ,  $2 B$ ,  $I$ , &c. du plan  $K D 2 E$  par où passent toutes les trajectoires; ou ce qui revient au même, qu'on aura le lieu de tous les points dans lesquels la Comete peut se trouver au tems de la seconde observation. On peut, pour une plus grande conviction, chercher la nature de ce lieu, & comme on trouvera fort aisément qu'il est à la ligne droite, on conclura qu'on peut le tracer, aussi-tôt qu'on a trouvé deux points qui lui appartiennent comme  $Q$  &  $I$ . Mais enfin, si l'on veut que toutes les conditions soient absolument remplies; si l'on veut que la Comete se trouve au tems de la seconde observation, non seulement dans le plan  $K D 2 E$ , mais qu'elle se trouve aussi sur le rayon visuel  $2 A 2 E$ , afin d'avoir la longitude & la latitude observées, le Problème deviendra alors déterminé; & il faudra nécessairement que la trajectoire  $1 B 3 B$  passe par le point d'intersection  $2 B$  du lieu  $Q I$ , & du rayon visuel  $2 A 2 E$  qui sert de second lieu. Car entre tous les points de la ligne  $Q I$  sur la-

laquelle la Comete doit nécessairement se trouver dans la seconde observation, il n'y a, comme il est évident, que le point \* 2 *B* dans lequel la Comete vue de la Terre, puisse avoir la latitude qu'on lui a observée. Ce point 2 *B* par lequel doit passer la trajectoire étant trouvé, il est facile de découvrir toutes les circonstances de la situation de cette même trajectoire. Il sera aussi très facile de former d'autres constructions sur le modele de celle-ci, pour découvrir immédiatement les points 1 *B* & 3 *B*.

## PROBLEME II.

*Connoissant la plus petite portion de l'orbite d'une Comete, ou la tangente de cette orbite dans un seul point, avec la vitesse de la Comete, déterminer les dimensions de l'orbite entiere & toutes les autres circonstances du mouvement?*

Nous n'insisterons pas beaucoup ici sur la maniere de découvrir le lieu des nœuds de la Comete, ni l'inclinaison de son orbite par rapport à l'Ecliptique. Il est évident que la ligne 1 *B* 3 *B* étant une petite portion de l'orbite, ou une tangente à cette même orbite au point 2 *B*, il n'y a qu'à la prolonger jusqu'à ce qu'elle rencontre le plan de l'Ecliptique en *R*, & la ligne entiere 2 *B R*, quelque longue qu'elle soit, sera toujours dans le plan de l'orbite: d'où il suit que la ligne *SR* tirée du Soleil *S* au point *R* sera l'intersection des plans de l'orbite & de l'Ecliptique, & sera  
par

\* Fig. 1a.

par conséquent la ligne des nœuds. Si du point  $2B$  on abaisse ensuite une perpendiculaire  $* 2BT$  sur  $SR$ , & que du point  $2C$  on abaisse une autre perpendiculaire  $2CT$  sur la même ligne  $SR$ , ces deux perpendiculaires viendront, comme il est évident, tomber dans le même point  $T$ , & formeront l'angle  $2BT2C$  qui mesure l'inclinaison de l'orbite par rapport à l'Ecliptique. Comme il suffit d'employer dans toutes ces recherches la simple résolution des Triangles rectilignes, nous n'entrons pas dans un plus grand détail; & nous n'expliquons pas non plus à calculer la distance  $2BS$  de la Comète au Soleil, distance qui est l'hypothénuse du triangle rectangle qui a  $S2C$  &  $2C2B$  pour ses deux autres côtés. On découvrira avec la même facilité l'angle que fait en  $2B$  la ligne  $S2B$  avec la portion  $1B3B$  de l'orbite: il n'y aura qu'à résoudre le triangle  $S2BR$ , dont on aura trouvé les trois côtés.

† Mais pour venir au principal objet de notre recherche, nous supposerons dans la Fig. 2. que  $S$  représente le Soleil, &  $Cc$  la petite portion de l'orbite de la Comète que nous avons déterminée dans le Problème précédent, ou qu'on a déterminée par quelque autre méthode. Nous connoissons la distance  $SC$  de la Comète au Soleil; nous nommons  $a$  cette distance, & comme nous avons aussi l'angle  $SCD$  que fait la ligne  $SC$  avec  $Cc$  prolongée, nous devons regarder comme connue la perpendiculaire  $SD$  qui sert de sinus à cet an.

\* Fig. 1.

† Fig. 2.

angle, lorsque \*  $SC$  est pris pour sinus total; & nous désignerons cette perpendiculaire par  $b$ . La lettre  $e$  marquera le petit espace  $Cc$  qu'a parcouru la Comete dans le tems  $f$ ; &  $x$  marquera le grand axe  $AB$  de l'ellipse que décrit la Comete par une révolution entiere autour du Soleil  $S$  qui occupe un des foyers de cette ellipse, &  $t$  fera la durée de la révolution. Enfin comme nous ne pouvons parvenir à découvrir ces deux dernieres quantités  $x$  &  $t$ , qu'en supposant que la Comete observe exactement les règles de Kepler, & qu'en comparant par le moyen de ces règles le mouvement de la Comete au mouvement connu de quelque Planete, nous nommerons  $q$  le grand axe de l'ellipse que décrit cette Planete que nous prendrons pour terme de comparaison, &  $u$  le tems qu'elle met à accomplir sa révolution entiere. Et comme nous aurons aussi besoin du rapport de la circonference du cercle à son diametre, nous désignerons par  $p$  la périmétrie ou circonference du cercle dont  $q$  est le diametre.

Une de ces règles, dont nous venons de parler, nous apprend que les quarrés des tems que les Planetes employent à achever leur circulation autour du Soleil, sont proportionnels aux cubes de leurs moyennes distances à cet Astre. Ce sont non seulement les Planetes principales qui observent exactement cette règle en circulant autour du Soleil, ce sont aussi les Lunes ou Satellites en circulant autour des Planetes principales: de sorte que

cet-

\* Fig. 2.

\* cette règle que Kepler n'avoit pu former que sur un petit nombre d'observations, s'est, comme par une espece de prodige, trouvée confirmée de plus en plus à mesure qu'on a mieux connu le Ciel. Le grand axe de l'ellipse que trace chaque Planete est formé de la plus grande & de la moindre distance de la Planete au Soleil; & ainsi on a la distance moyenne de la Planete au Soleil, en prenant la moitié du grand axe. C'est-à-dire donc que  $\frac{1}{2} x$  est la distance moyenne de notre Comete, &  $\frac{1}{2} q$  celle de la Planete; & si conformément à la règle nous faisons cette proportion, le cube  $\frac{1}{8} q^3$  de la distance moyenne de la Planete au Soleil est au quarré  $n^2$  du tems qu'elle met à accomplir sa révolution; ainsi le cube  $\frac{1}{8} x^3$  de la distance moyenne de la Comete au Soleil est à un quatrieme terme  $\frac{n^2 x^3}{q^3}$ ;

nous aurons  $\frac{n^2 x^3}{q^3}$  pour le quarré  $t^2$  du tems que la Comete doit employer à achever sa circulation, & par conséquent  $t = \frac{x x}{q} \sqrt{\frac{x}{q}}$ , pour l'expression de ce tems, ou pour la durée entiere de la révolution.

Mais il nous faut avoir une autre expression de cette même durée, afin de pouvoir l'égalér à celle-ci; c'est l'autre règle de Kepler qui nous la fournira; règle qui porte, comme on le fait, que chaque Planete en décrivant la circonference d'une ellipse autour du So-



Soleil, les secteurs de cette ellipse qui sont terminés par des lignes droites tirées de la Planete au Soleil, sont proportionnels aux tems que la Planete met à parcourir les arcs correspondans. C'est à dire, que si le secteur \*  $CSB$  est quarante ou cinquante fois plus grand que le petit secteur  $CSc$ , la Comete fera quarante ou cinquante fois plus de tems à parcourir l'arc  $CB$ , qu'à parcourir l'arc  $Cc$ : & il n'y a donc, par la même raison, qu'à chercher combien toute la surface de l'ellipse est plus grande que le petit secteur  $CSc$ , pour pouvoir connoître la durée entière  $t$  de la révolution, par rapport au tems  $f$  employé à faire le petit chemin  $Cc$ . Comme ce dernier chemin est supposé extrêmement petit, nous pouvons considérer le secteur  $CSc$  comme un triangle rectiligne dont  $\frac{1}{2}be (= \frac{1}{2}SD \times Cc)$  est la surface. Ainsi nous pouvons faire cette analogie,  $\frac{1}{2}be$  est à  $f$  comme la surface  $ACBI$  de l'ellipse est à la durée  $t$  de la circulation, & nous aurons par conséquent  $t = \frac{f}{\frac{1}{2}be} \times ACBI$ , mais il nous faut chercher la surface  $ACBI$ .

Nous conduisons pour cela du point  $C$  au second foyer  $F$  de l'ellipse, la ligne  $CF$  qui se trouvera, par la propriété de la courbe, égale à  $x - a (= AB - SC)$ . Du même foyer  $F$ , nous conduisons la perpendiculaire  $FE$  sur  $Cc$  prolongée, & nous tirons  $SG$  parallèlement à  $DE$ , ou perpendiculairement à  $FE$ . La ressemblance des triangles  $SCD$  &  $FCE$ , qui sont tous les deux rectangles,

& qui ont outre cela leurs angles \*  $SCD$  &  $FCE$  égaux par la nature de l'ellipse, nous donnera ensuite  $SC=a:SD=b::FC=x-a:FE=\frac{bx-ab}{a}$ ; & si de  $FE$ , on retranche  $GE=SD=b$ , on aura  $FG=\frac{bx-2ab}{a}$ . La ressemblance des mêmes triangles nous donnera en-

core  $SC=a:CD(=\sqrt{SC^2-SD^2})=\sqrt{a^2-b^2}::FC=x-a:CE=\frac{x-a}{a}\sqrt{a^2-b^2}$ ; & ajou-

tant  $CE$  avec  $CD$ , il nous viendra  $\frac{x-a}{a}\sqrt{a^2-b^2}+\sqrt{a^2-b^2}=\frac{x}{a}\sqrt{a^2-b^2}$  pour la valeur de  $DE$ , ou pour celle de  $SG$ . Mais comme nous avons déjà trouvé  $FG=\frac{bx-2ab}{a}$ , le triangle rectangle  $SGF$  nous donnera

$$\sqrt{\frac{b^2x^2-4ab^2x+4a^2b^2}{a^2}}+\frac{a^2x^2-b^2x^2}{a^2} \\ =\sqrt{\frac{a^2x^2-4ab^2x+4a^2b^2}{a^2}} \text{ pour l'expression}$$

de l'hypothénuse  $SF(=\sqrt{SG^2+FG^2})$  qui est l'intervalle entre les deux foyers ou la double excentricité. Ainsi  $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{a^2x^2-4ab^2x+4a^2b^2}{a^2}}$

fera la distance  $SH$  ou  $FH$  des foyers au centre  $H$  de l'ellipse; & si nous considérons que

$SH$

$SH^*$  formé avec la moitié  $HI$  du petit axe, un triangle rectangle  $SHI$ , dont  $SI$  qui est égale à la moitié  $\frac{1}{2}x$  du grand axe est l'hypothénuse,

nous aurons  $\sqrt{\frac{1}{4}x^2 - \frac{a^2x^2 - 4ab^2x - 4a^2b^2}{4a^2}}$ ,

ou  $\frac{b}{a} \sqrt{ax - a^2}$  ( $= \sqrt{SI - SH}$ ) pour  $IH$ ,

& par conséquent  $\frac{2b}{a} \sqrt{ax - a^2}$  pour le petit axe entier  $IK$ . Enfin multipliant ce petit

axe par le grand, il nous viendra  $\frac{2bx}{a} \sqrt{ax - a^2}$

pour la superficie du rectangle circonscrit à l'ellipse, rectangle qui a le grand axe pour longueur, & le petit pour largeur; & si l'on fait attention qu'il y a même rapport de la superficie de ce rectangle à celle de l'ellipse, que de celle d'un quarré à celle du cercle inscrit, on pourra faire cette analogie; le quarré  $q^2$  du diametre  $q$  est à la surface  $\frac{1}{4}qp$  du cercle dont  $q$  est le diametre, comme la superficie  $\frac{2bx}{a} \sqrt{ax - a^2}$  du rectangle est à la surface  $\frac{bpx}{2aq} \sqrt{ax - a^2}$  de l'ellipse  $ACBI$ .

Ainsi nous pouvons maintenant, en nous servant de la seconde règle de Kepler, trouver l'expression dont nous avons besoin de la durée  $t$  de la révolution de la Comete. Il y a, comme nous l'avons dit, même rapport du petit secteur  $CSc = \frac{1}{2}be$  au tems  $f$  que la Comete employe à parcourir la petite ligne  $Cc$ ,

\* Fig. 2.

$Cc^*$ , que de la surface entière  $\frac{bpx}{2aq} \sqrt{ax-a^2}$  de l'ellipse à toute la durée de la révolution sur l'orbite  $ACBI$ . On trouve par cette proportion  $t = \frac{fpx}{acq} \sqrt{ax-a^2}$  pour cette durée; & comme nous avons déjà trouvé, en nous servant de la première règle de Kepler,  $t = \frac{nx}{q} \sqrt{\frac{x}{q}}$ , nous aurons, en combinant ces deux expressions, l'équation  $\frac{nx}{q} \sqrt{\frac{x}{q}} = \frac{fpx}{acq} \sqrt{ax-a^2}$  qui se réduit à  $a^2 c^2 n^2 x = af^2 p^2 q x - a^2 f^2 p^2 q$ , dont on déduit la formule  $x = \frac{af^2 p^2 q}{f^2 p^2 q - ac^2 n^2}$ . Cette formule nous donne le grand axe  $AB$  de l'orbite de la Comète en grandeurs entièrement connues; & il est clair que nous n'avons plus, pour déterminer tout le reste, qu'à substituer cette valeur dans l'expression du petit axe, dans celle de l'excentricité, dans celle de la durée de la révolution, &c. L'expression  $\frac{2b}{a} \sqrt{ax-a^2}$  du petit axe  $IK$  se change en  $\frac{2ben}{f^2 p^2 q - ac^2 n^2} \sqrt{\frac{a}{f^2 p^2 q - ac^2 n^2}}$ , & celle  $\frac{nx}{q} \sqrt{\frac{x}{q}}$ , ou  $\frac{fpx}{acq} \sqrt{ax-a^2}$  de la durée  $t$  de la révolution, devient  $f^3 p^3 n x \frac{a^{\frac{1}{2}}}{f^2 p^2 q - ac^2 n^2}^{\frac{1}{2}}$ . Et

ce

ce font donc là autant de formules, par le moyen desquelles on pourra toujours trouver toutes les particularités du mouvement d'une Comete, aussi-tôt qu'on aura une fois découvert la plus petite partie \* *Cc* de son orbite.

Si toutes ces quantités sont finies & positives, l'orbite *ACBI* sera effectivement une ellipse; & la Comete aura un retour. Le cercle étant une espece d'ellipse, la Comete peut aussi en décrire un; & nous découvrirons en quel cas, si nous considérons que comme toutes les distances *SA*, *SC*, *SB*, &c. de la Comete au Soleil sont alors égales, le

grand axe  $AB(x) = \frac{af^2p^2q}{f^2p^2q - ae^2n^2}$  est double de la distance *AC* (*a*), & qu'on a l'é-

quation  $\frac{af^2p^2q}{f^2p^2q - ae^2n^2} = 2a$ , qui nous donne

$e = \frac{fp}{n} \sqrt{\frac{q}{2a}}$  pour la valeur du petit espa-

ce *Cc* que la Comete doit parcourir dans le tems *f*. Toutes les fois que la Comete ira plus ou moins vîte, au-lieu de cercle elle tracera une ellipse, pourvu cependant que sa vîtesse ne soit pas trop grande. Car cette vîtesse pourroit être telle que les expressions

$\frac{af^2p^2q}{f^2p^2q - ae^2n^2}$  du grand axe †  $2ben \sqrt{\frac{a}{f^2p^2q - ae^2n^2}}$

du petit axe, &  $f^2p^2n \times \frac{a^{\frac{3}{2}}}{f^2p^2q - ae^2n^2^{\frac{3}{2}}}$  de la

durée de la révolution, se trouveroient in-

finies.

\* Fig. 2.

† Fig. 3.

finies. C'est ce qui doit arriver aussi-tôt que  $ae^2 n^2$  est égal à  $f^2 p^2 q$ , puisque le dénominateur des expressions précédentes devient égal à zero & alors l'orbite \*  $ACBI$  doit être une ellipse infiniment allongée, elle doit être une parabole, & il ne faut donc nullement s'attendre à revoir la Comete. Ce second cas n'a lieu, comme on le voit, que lorsque  $ae^2 n^2 = f^2 p^2 q$ , ou que lorsque

$$e = \frac{fp}{n} \sqrt{\frac{q}{a}}; \text{ ce qui nous montre, con-}$$

formément à ce que nous savons d'ailleurs, que l'espace  $e$  que la Comete doit alors parcourir dans le tems déterminé  $f$  est à l'espace

$$e = \frac{fp}{n} \sqrt{\frac{q}{2a}} \text{ qu'elle parcourt lorsqu'elle}$$

trace un cercle, comme 1 est à  $\sqrt{\frac{1}{2}}$ , ou comme à peu près 1414 est à 1000. † Enfin si quelque agent extérieur avoit encore imprimé un plus grand mouvement à la Comete,

& qu'il se trouvât que  $e$  surpassât  $\frac{fp}{n} \sqrt{\frac{q}{a}}$ ,

il n'importe de combien, ou que  $ae^2 n^2$  fût plus grand que  $f^2 p^2 q$ , le grand axe  $AB$  dont

$$\frac{af^2 p^2 q}{f^2 p^2 q - ae^2 n^2} \text{ est l'expression, seroit alors}$$

négatif, & ne seroit plus la somme des lignes  $SC$  &  $FC$ , mais leur difference. Ainsi dans ce troisieme cas l'orbite seroit une hyperbole qui ne permettroit point encore à la Comete de nous revenir. Aussi voit-on que

$$f^3 p^3 n \times$$

\* Fig. 3.

† Fig. 4.

$f^3 p^3 n \times \frac{a^{\frac{3}{2}}}{f^3 p^3 q - a c^3 n^3}^{\frac{1}{2}}$  qui exprime la durée

de la révolution, seroit alors une quantité *imaginaire*.

\* Au surplus, il sera également facile dans ces trois cas de déterminer la situation de la ligne des apsides, le point du Périhélie, & celui de l'Aphélie, lorsqu'il y en aura un. Si l'orbite est une ellipse, on voit assez qu'il n'y aura, après avoir trouvé par la formule

$\kappa = \frac{a f^2 p^2 q}{f^3 p^3 q - a c^3 n^3}$  la valeur du grand axe

$AB$ , (*Fig. 2.*) qu'à tirer la ligne  $CF$  qui fasse avec la petite portion  $Cc$  de l'orbite, qu'on a déterminé par le premier Problème, l'angle  $FCE$ , égal à l'angle  $SCD$ ; & que si l'on fait cette ligne  $CF$ , égale à l'excès du grand axe sur  $SC$ , on aura le second foyer  $F$ , par lequel, & par le premier  $S$ , il n'y aura qu'à conduire la ligne des apsides  $AB$ . Il est également clair que le point  $H$  qui partage  $SF$  par la moitié, sera le centre de l'ellipse, & qu'ainsi il ne restera plus qu'à porter depuis  $H$ , jusqu'en  $A$  & en  $B$ , la moitié du grand axe, pour déterminer les points du Périhélie & de l'Aphélie. Si en second lieu l'orbite est une parabole, ou, ce qui revient au même,

si la valeur  $\frac{a f^2 p^2 q}{f^3 p^3 q - a c^3 n^3}$  du grand axe se

trouve infinie, la ligne  $Cf$  (*Fig. 3.*) qui fait avec la petite portion  $Cc$  de l'orbite l'angle  $fCE$

\* *Fig. 2.*

$fCE^*$ , égal à l'angle  $SCD$ , ne rencontrera plus l'axe de l'orbite, mais lui sera parallèle. Ainsi il n'y aura qu'à tirer par le foyer  $S$ , qui est occupé par le Soleil, la ligne  $AS$  parallèlement à  $Cf$ , pour avoir la ligne des apsides. Et si l'on prolonge  $CD$  jusqu'à ce qu'elle rencontre en  $M$  cette ligne des apsides, & que du point  $C$ , on abaisse sur cette même ligne la perpendiculaire  $CN$ , on n'aura qu'à partager  $MN$  par la moitié au point  $A$ , pour avoir conformément à la nature de la parabole, le sommet de cette ligne courbe ou le point du Périhélie de la Comete. Enfin, dans

le troisieme cas † où l'axe  $x = \frac{af^2p^2q}{f^2p^2q - ac^2n^2}$

est négatif, & où l'orbite est une Hyperbole, comme dans la *Fig. 4.* il faudra faire de l'autre côté de  $CD$ , l'angle  $DCF$  qui doit être égal à l'angle  $SCD$ ; & pour avoir le second foyer  $F$ , il n'y aura qu'à rendre  $CF$  égale, non pas à la difference de  $SC$ , & du grand axe, comme dans l'ellipse, mais à la somme de ces deux lignes. Le point  $H$  qui sera au milieu des deux foyers sera toujours le centre; & il n'y aura plus par conséquent qu'à porter depuis  $H$  jusqu'en  $A$ , la moitié de l'axe, pour avoir le sommet  $A$  ‡ de l'Hyperbole qui sert d'orbite à la Comete.

On voit que toutes ces opérations n'ont rien de difficile, aussi-tôt qu'on a une fois trouvé la valeur de l'axe par la formule

$$x = \frac{af^2p^2q}{f^2p^2q - ac^2n^2} : \text{ \& à l'égard de cette valeur,}$$

\* *Fig. 3.*† *Fig. 4.*‡ *Fig. 2. 3. & 4.*



leur, nous pouvons épargner la plus grande partie du calcul qu'il faudra faire pour la découvrir, en introduisant d'avance des nombres convenables à la place de  $p$ , de  $q$ , de  $n$  & de  $f$ . Comme de toutes les Planetes, c'est la Terre dont nous connoissons mieux le mouvement, il nous paroît que nous ne saurions mieux faire que de la prendre toujours pour le terme de comparaison dont nous avons besoin; & ainsi nous n'avons qu'à mettre à la place de  $q$  le diametre de l'écliptique ou le double de notre distance moyenne au Soleil, à la place de  $p$  la circonférence du cercle dont  $q$  est le diametre, & à la place de  $n$  la durée de l'année fyderale, qui est, comme on le fait, de 365 jours 6 heures 9 minutes. Ayant fait, pour une plus grande commodité, la distance moyenne de la Terre au Soleil de 1000000 parties, ce qui donne  $20000000 = q$ , &  $62831853 = p$ ; & ayant supposé que le tems  $f$  que la Comete met à parcourir le petit espace connu  $Cc = e$ ,

étoit d'un jour, la formule  $x = \frac{af^2p^2q}{f^2p^2q - ae^2n^2}$  s'est trouvé changée en

$$x = \frac{20212949767237678080000000000 \times a}{2021294976723767808000000000 - 3415350481 \times ae^2}$$

$$\text{ou en } x = \frac{591826599535557939 \times a}{591826599535557939 - ae^2}; \text{ de sorte}$$

qu'il ne restera plus dans les différentes applications qu'on voudra faire de cette formule générale, qu'à mettre à la place de  $a$  & de  $e$  la distance \*  $SC$  de la Comete au Soleil, & le

\* Fig. 2. 3. & 4.

le petit espace \*  $Cc$  qu'elle a parcouru dans un jour; & on aura la longueur  $x$  du grand axe  $AB$  de l'orbite  $ACBI$ . On trouvera par de pareilles substitutions, en se servant

de la formule  $t = \frac{185927809517540232 \times a^{\frac{3}{2}}}{591826599535557919 - ae^{\frac{1}{2}}}$ , à la-

quelle se réduit  $t = f^3 p^3 n \times \frac{a^{\frac{3}{2}}}{f^3 p^3 q - ae^{\frac{1}{2}} n^{\frac{3}{2}}}$  la

durée  $t$  exprimée en jours de la révolution de la Comete autour du Soleil. Ainsi pour savoir si une Comete doit avoir un retour ou n'en doit point avoir, il ne s'agira toujours que de multiplier le quarré  $e^2$  de son mouvement journalier  $Cc$ , par sa distance  $Sc$  ( $a$ ) au Soleil; & de voir si ce produit  $ae^2$  est plus petit ou plus grand que le nombre constant.

591826599535557939.

Si au-lieu de supposer la distance moyenne d'ici au Soleil de 10000000 parties, on se contente de la faire de dix mille, les deux formules précédentes seront plus simples. On aura  $x = \frac{1859278095 \times a}{591826599 - ae}$  &

$t = \frac{1859278095 \times a^{\frac{3}{2}}}{591826599 - ae^{\frac{1}{2}} \times \sqrt{591826599 - ae}}$ ; de sorte

qu'il ne sera plus nécessaire de s'engager dans de si longues supputations. C'est ce que j'ai en quelque façon éprouvé sur la Comete qui parut en 1729 & en 1730, proche du Dauphin, laquelle est très remarquable par la

\* Fig. 2. 3. & 4.

La durée du spectacle qu'elle donna aux Astronomes, & qui a encore cet avantage, qu'il est impossible d'en choisir une autre, qui ait été observée par des yeux plus savans. Il résulte principalement des observations de M. Cassini, que le 13 d'Octobre 1729 la distance \*  $SC - a$  de cette Comete au Soleil étoit de 42998 parties, que la petite portion  $Ce = e$  de l'orbite parcourue dans un jour, étoit de  $122\frac{4}{15}$  parties, & que cette petite portion faisoit avec la ligne  $SC$ , tirée du Soleil à la Comete, un angle  $DCS$  de 82 degrés 11 minutes. Mais si l'on multiplie le quarré 14895 de la vitesse  $e$  par la distance  $a = 42998$ , il vient pour  $ae^2$  un nombre plus grand que 591826599, ce qui nous montre que l'orbite est une Hyperbole, comme dans la *Fig. 4.* & que la Comete est du nombre de celles qui ne doivent point avoir de retour, parce qu'elle se meut avec trop de vitesse. L'axe  $AB$  ( $x$ ) qui est négatif se trouve de 523277 parties, ce qui en donne 566275 pour  $FC$ , qui est ici égale à la somme de  $SC$  & de  $AB$ : & si l'on résout le triangle  $FC S$ , dont on connoit maintenant les deux côtés  $SC$  &  $FC$ ; & outre cela l'angle compris  $SCF$  qui est de 164 degrés 22 minutes double de l'angle  $SCD$ , on trouve que l'angle  $ASC$  est de 14 degrés 32 minutes, & le côté  $FS$  de 607890 parties. Ainsi la Comete avoit fait depuis son périhélie  $A$ , jusqu'au 13 d'Octobre, un arc de 14 degrés 32 minutes par rapport au Soleil: & cette Comete dans son périhélie étoit

\* *Fig. 2. 3. & 4.*

étoit encore éloignée du Soleil de 42306 $\frac{1}{2}$  parties. Il est vrai que la précision de toutes ces déterminations dépend de l'exactitude avec laquelle la Comete s'est conformée aux loix que nous avons supposées: mais la remarque d'une nouvelle Planete qui n'observeroit pas les règles reconnues par Kepler feroit, peut-être, encore plus singuliere, que la découverte même de toutes les particularités de son mouvement, lorsqu'elle suit exactement ces règles.




## E X A M E N

*Des causes qui ont altéré l'eau de la Seine, pendant la secheresse de l'année 1731.*

Par M. DE JUSSIEU. \*

**L**A bonne qualité des eaux étant une de ces choses qui contribuent le plus à la santé des Citoyens d'une Ville, il n'y a rien à quoi les Magistrats aient plus d'intérêt, qu'à entretenir la salubrité de celles qui y servent à la boisson commune des hommes & des animaux, & à remédier aux accidens par lesquels ces eaux pourroient être altérées, soit dans le lit des fontaines, des rivières, des ruisseaux où elles coulent, soit dans les lieux où sont conservées celles qu'on en dérive, soit enfin dans les puits d'où naissent des sources.


Les




THE END OF THE WORLD



*Fig. 2.*







Les causes de leur altération sont ou naturelles, ou accidentelles ; j'appelle *naturelles*, celles qui ne proviennent que d'un dérangement de saisons, & *accidentelles*, celles qui proviennent du peu de soin, de la malpropreté, ou de la malice des hommes. Ces dernières ne sont pas l'objet de nos recherches, parce qu'il y a des règles qui dépendent du bon ordre, de la police, par le moyen desquelles on a accoutumé d'y remédier.

C'est aux causes naturelles auxquelles je m'attache, & sur-tout à celle qu'une sécheresse, telle que nous l'avons éprouvée à Paris en 1731, nous a fait appercevoir dans l'usage des eaux de la Marne & de la Seine, dont la qualité se trouva assez considérablement altérée, pour qu'il s'ensuivît plusieurs maladies populaires qui ont régné pendant l'Été & l'Automne de cette année-là.

Et comme il nous parut alors, que pour mieux juger de ces causes, il étoit à propos d'observer dans quel état se trouveroient les eaux de ces rivières les années suivantes, & les effets que produiroit l'usage qu'on en feroit, nous avons différé jusqu'à présent de rendre publiques les observations qu'elles nous ont donné lieu de faire.

L'opinion commune & reçue de toutes les Nations depuis plusieurs siècles, sur la meilleure qualité de l'eau qui doit servir de boisson ordinaire, est qu'il faut, autant qu'il se peut, pour qu'elle soit salubre, qu'elle soit pure, limpide, sans aucune odeur ni saveur qui se fassent remar-

quer, & que son usage ne cause aucun mauvais effet.

Bien-loin que le défaut de pluye de l'année 1731 eût ôté à celle de la riviere de Seine les premieres de ces qualités, il sembloit au contraire qu'elle fût devenue plus légère, plus limpide que jamais, parce qu'elle ne se trouvoit mêlée ni avec de la terre, ni avec d'autres particules de substances étrangères capables de l'épaissir, & de lui ôter sa couleur & sa limpidité naturelle, comme il arrive aux rivières, qui étant grossies par des pluies, par des ravines & par des torrens, charrient pendant long-tems un limon qui les trouble.

Il ne laissoit pas néanmoins de se trouver alors dans la riviere de Seine une certaine quantité de ces particules étrangères, qui pour être imperceptibles à la vue, n'en étoient pas moins sensibles au goût & à l'odorat.

On ne pouvoit pas accuser le fond du lit de la riviere, sur lequel son eau a coutume de couler, parce que bien-loin d'être par-tout limoneux, son sable en plusieurs endroits paroissoit très pur & bien lavé.

On ne pouvoit pas non plus attribuer ces mauvaises qualités aux terres qui forment les bords de ce lit, parce que la quantité d'eau qui s'y trouvoit, étoit réduite au point de ne les plus toucher, & qu'elle se resserroit tous les jours de plus en plus dans le milieu de son lit.

Quelle a donc pu être la cause de cette altération, si ce n'est la production de quelques corps naturels, qui dans certains tems

nais-

naissent d'eux-mêmes dans ce lit, une partie desquels y occupe le terrain des deux bords, & l'autre celui du fond?

On ne voyoit aucun corps plus apparent que certaines plantes qui, à l'occasion de cette secheresse, ont été cette année-là plus abondantes, mieux nourries & plus étendues dans le lit de la riviere qu'elles ne le sont ordinairement; & la preuve qu'on n'a pu attribuer leur multiplication qu'à cet état de diminution des eaux de cette riviere, est qu'on a vu le même phénomène dans la Marne, dans tous les ruisseaux des environs de Paris qui se perdent dans la Seine, même dans les étangs, & dans les réservoirs dont les eaux se tirent de cette riviere & des autres ruisseaux.

Dira-t-on que ces plantes, naturellement aquatiques, n'ayent pas accoutumé de croître dans la Seine; & si elles y ont cru les autres années, comment pendant leurs Etés n'en auroit-on point éprouvé les mêmes incommodités?

On convient qu'il n'étoit pas extraordinaire de voir ces plantes dans le lieu qui leur est propre; mais elles y parurent en 1731 en si grande abondance, & avec des différences si remarquables, qu'il étoit impossible qu'elles ne causassent les effets dont on s'est apperçu.

A considérer l'état ordinaire du lit d'une riviere au Printems & en Été par rapport aux plantes aquatiques qui y croissent, & qui s'y multiplient dans les années communes, le nombre de ces sortes de plantes est tous

les ans à peu près le même, parce que ce sont celles qui lui sont propres; leur maniere d'éclorre, de végéter, de fleurir & de fructifier est toujours la même, parce que l'eau n'étant ni trop haute, ni trop basse pour elles, elles peuvent atteindre à sa superficie, sur laquelle il est nécessaire que leurs sommités se montrent, pour que l'air qui doit servir au développement de leurs fleurs, les frappe & les pénètre: opération après laquelle leurs sommités rentrent ordinairement dans l'eau, afin que leurs graines y mûrissent & s'y répandent.

La corruption qui se fait chaque année sur la fin de l'Automne, des feuilles & des tiges de ces mêmes plantes, est toujours insensible à notre égard, parce que comme elle se fait peu à peu & successivement, & que les eaux qui dans cette saison s'accroissent ordinairement, occupent dans le lit de ces rivières un espace plus considérable, elles sont moins susceptibles de l'altération que peut y causer la corruption de ces plantes, dont les principes d'odeur & de saveur qu'elles contiennent, étant étendus dans une plus grande quantité de liquide, perdent imperceptiblement leur force.

Voyons à présent quels changemens sont arrivés dans le lit de la rivière de Seine, par rapport à ces plantes, pendant cette année de sécheresse; mais pour le mieux comprendre, il faut auparavant supposer deux faits qu'on peut regarder comme certains.

Le premier, que toutes les plantes aquatiques ont, généralement parlant, des qualités

tés plus sensibles que celles de la plupart des plantes terrestres : car les unes se font distinguer par une odeur aromatique si forte, qu'elle en devient désagréable, comme sont les Menthes d'eau ; les autres sont remarquables par une odeur fétide marécageuse, telles sont les Millefeuilles & les Prêles d'eau : presque toutes ont une âcreté intérieure plus ou moins perceptible au goût, comme sont les Cresçons, les Poivres & les Renoncules aquatiques ; & quelques-unes enfin, telles que les Conferves ou Mouffes d'eau, semblables par leur effet à celui que l'Ortie cause au toucher, échauffent subitement la main qui les presse.

Le second fait est, que tant que ces mêmes plantes sont vivantes & dans leur entier dans le lit des rivières où elles croissent, quelque fortes qu'en soient les odeurs, & quelque âcres & fétides qu'en soient les saveurs, elles ne communiquent rien de leur bonne ou mauvaise qualité à l'eau qui les y environne, qui les y couvre, & qui les arrose, & que l'on ne s'apperçoit à l'odorat & au goût que ces eaux soient altérées que lorsque par la dissolution des parties de ces plantes, & par leur corruption, elles font participer l'eau dans laquelle elles se trouvent, ou celle dans laquelle on les fait macérer, de leur bonne ou mauvaise qualité.

Ce n'est donc point à la production d'une quantité de plantes que l'on n'avoit point accoutumé de voir dans la Seine & dans la Marne, & qui y feroient crues extraordinairement cette année-là, qu'il faut attribuer

ces effets ; les mêmes plantes qui sont propres à ces rivières , parce qu'elles y naissent tous les ans , y parurent , à la vérité , dès le Printemps de la même année , mais très différemment , en ce que celles dont la qualité est plus mauvaise , & qui les années précédentes y étoient moins communes , y ont pullulé en abondance , au-lieu que celles dont la qualité n'est point nuisible , & qui y étoient plus ordinaires , s'y sont trouvées en moindre quantité en comparaison des autres..

La raison de ce phénomène est que la plupart de ces plantes , que nous regardons comme pernicieuses , par les effets les plus apparens qu'elles produisent , étant d'une nature à ne végéter que dans les endroits du lit de ces rivières , où l'eau est plus basse & plus dormante , ne pulluloient que très peu dans les années où le lit de ces rivières étoit plus plein ; parce que la tige de ces plantes , dont la longueur est en quelque façon déterminée , ne pouvoit atteindre à la surface de l'eau , à laquelle j'ai fait remarquer qu'il est si important que les sommités de ces plantes aquatiques se montrent à découvert , pour pouvoir fleurir & fructifier.

De la facilité de végéter qu'avoient les plantes pernicieuses , & de leur abondance , il suivoit nécessairement l'inconvénient de la suffocation des autres plantes ordinaires , dont les effets ne sont point à craindre , en ce que celles-là prenant leur place , celles-ci ne pouvoient plus être que très maigres , & couvertes par l'étendue qu'occupoient les premières.

Tel est le phénomène que l'on apperçoit dans la végétation des plantes terrestres, au Printems de certaines années humides & pluvieuses, où il arrive que le bon grain se trouve étouffé, maigri & couvert par l'Yvroye, le Chien-dent, la Moutarde, & par une multitude d'autres mauvaises plantes qui prennent tellement le dessus que toute la campagne en est couverte; aussi sont-ce ces années-là où les maladies populaires sont plus fréquentes, soit par la mauvaise qualité des grains qui n'ont pas eu assez de nourriture, soit par le mélange qui s'y fait des semences de ces plantes pernicieuses, soit même par ces odeurs fades & fétides que ces plantes exhalent dans les campagnes, & que l'on n'est point accoutumé d'y respirer.

Ce n'est point que les semences de ces plantes pernicieuses aient nouvellement été apportées pour infecter ces campagnes; mais c'est qu'ayant été enfoncées & conservées dans la terre, pendant des années seches, ou d'une constitution ordinaire, elles n'ont pu végéter qu'en certains endroits où les graines des autres plantes ne pouvoient germer & les couvrir; au-lieu que dans les années humides, la terre étant pénétrée d'eau, ces mauvaises graines ont eu plus de facilité à germer plus promptement que celles des bons grains. La même chose arrive aux plantes aquatiques dans le lit des rivières, où les eaux se trouvant basses dans les années de sécheresse, s'arrêtent en différens endroits, & y forment de petites mares: c'est dans ces endroits surtout que les graines de ces plantes aquatiques,

ques, que nous regardons comme pernicieuses, ayant lieu d'être échauffées par le Soleil, y végètent plus promptement que les autres, y pullulent par la facilité qu'elles ont de germer & d'atteindre à la superficie de l'eau, enforte que les premières ayant occupé la plus grande partie du lit de la rivière, elles étouffent celles qui, dans les autres années, avoient plus accoutumé d'y paroître.

Entre les plantes pernicieuses aquatiques dont je veux parler, il y en a deux principales, l'une que les Botanistes appellent *Hippuris*, genre de plante semblable par son port extérieur à la Prêle de nos campagnes; elle en diffère néanmoins par son odeur, par la configuration de sa fleur & de son fruit, & parce qu'elle est toujours couverte d'eau.

L'autre porte en Latin le nom de *Conserua*, tiré de sa qualité brûlante, & en François celui de *Mousse d'eau*, à cause de sa verdure & de son étendue, par lesquelles elle a quelque rapport à nos mousses ordinaires, dont elle diffère néanmoins par la multitude des filamens longs & entortillés qui forment sa substance.

La qualité de la première de ces plantes, est d'être d'une odeur marécageuse & très-fétide, de communiquer promptement à la main qui la touche, & à l'eau dans laquelle on la met tremper, son odeur désagréable, & de rendre cette eau fade & dégoûtante.

La seconde ne fait pas moins promptement sentir sa malignité; car elle ne communique pas seulement à l'eau dans laquelle on la met tremper, un feu qui, en la buvant, laisse  
dans.



dans le gosier une âcreté, & dans la bouche une secheresse incommode ; mais elle imprime même dans la main qui la serre, une ardeur à peu près semblable à celle que cause l'eau qui seroit un peu trop chaude.

C'étoient donc sur-tout ces deux especes de plantes, dont ces petites mares d'eau dormante, répandues tout le long du lit de la riviere, étoient pleines, qui par le défaut d'eau suffisante pour les couvrir entierement, se fanoient à l'extrémité de leurs tiges, & se corrompoient ensuite par le pied.

La chaleur du Soleil qui tiédissoit encore cette eau dormante, dans laquelle ces plantes étoient comme en macération, l'impré-  
gnoit tellement de leurs mauvaises qualités, qu'elles exhaloient jusqu'au-delà des bords de la riviere, une odeur marécageuse & dés-  
agréable que l'on s'appercevoit n'être point ordinaire.

Quelque dormante que l'eau paroisse en tout tems, en divers endroits du lit de la riviere, plus profonds les uns que les autres, comme étoient ceux qui formoient ces especes de mares, elle ne laisse pas de communiquer avec celle qui est courante ; & cette communication qu'avoient ces eaux pendant l'Été de 1731, étoit plus que suffisante pour alterer totalement & continuellement celle de tout le lit de la riviere, en sorte qu'elle devint par-là semblable, en quelque façon, à celles de marais & de lac qui sont chargées de la qualité des plantes qui s'y pourrissent ; eaux desquelles on ne peut goûter, sans s'appercevoir d'une odeur & d'une saveur tout-  
à-

à fait étrangères à l'eau qui doit servir de boisson ordinaire.

Telle fut à peu près pendant l'Eté & l'Automne de cette année-là l'eau de la Seine, ce qui, par l'habitude qu'on se faisoit de la boire, paroissoit à la vérité insensible, mais qui ne le fut pas pour ceux qui, recherchant la cause des diverses maladies qui regnerent dans ces saisons, comparèrent cette eau à celle des fontaines, lesquelles n'ayant point eu à leur source de ces sortes de plantes, n'étoient point altérées, & se trouvoient sans faveur & sans odeur.

Nous observâmes même que les personnes qui, par la situation de leurs maisons, étoient dans des quartiers où l'on avoit la facilité de n'user ordinairement que de l'eau de fontaine, furent exemptes des incommodités que ressentirent la plupart de ceux qui étoient obligés de boire de celle de la Seine.

Les maladies qui regnerent parmi ceux qui burent de celle-ci furent des secheresses de bouche qui caufoient une altération fréquente, des dégoûts & des nausées qu'on ne savoit à quoi attribuer, quantité de maux de gorge, dont quelques-uns se tournèrent en squinancie, différentes fluxions à la tête, & plusieurs sortes de fièvres irrégulières & opiniâtres : en sorte que ces incommodités se faisant remarquer, principalement dans les Communautés Religieuses, dans les Collèges & dans les Pensions qui ne pouvoient user que de l'eau de la Seine, parurent épidémiques, & ne se guérissent que par le changement de boisson, ou par les tisanes dont la coction

ser-

fervoit de correctif à la mauvaise qualité de l'eau ordinaire.

Pour m'assurer davantage, si c'étoit véritablement à l'abondance & à la malignité de ces plantes qu'on pouvoit attribuer ces mauvais effets, je fis arracher de la rivière une quantité de l'une & de l'autre de celles que je viens de nommer *Hippuris* & *Conserva*, & les fis infuser dans des vaisseaux remplis d'eau de fontaine, tantôt séparément, tantôt toutes deux ensemble, les y laissant pendant l'espace de quelques heures, pendant même une ou deux journées; expériences par lesquelles je m'assurai de l'altération qu'étoit capable de causer à l'eau la plus pure, l'infusion ou la macération de ces plantes; car elles communiquèrent à l'eau dans laquelle je les avois fait tremper, la même odeur & la même saveur désagréable que j'avois remarquées dans l'eau de la Seine, bureau courant même de son lit, au-dessus de Bercy.

Outre cette observation qui regarde l'odeur & la saveur de l'eau, je ne manquai pas d'examiner plus à fond, & sur-tout au Microscope, cette eau macérée, dans laquelle, comme dans celle de marais, on decouvroit plusieurs insectes très petits qui ne se voyent ni dans l'eau de fontaine, ni dans celle de rivière qui n'aura point été altérée par la multitude de ces sortes de plantes qui s'y seront corrompues: nouvelle cause d'altération, à laquelle on pourroit même attribuer quelques uns des effets dont je viens de parler.

Je ne disconviens pas qu'il ne pût y en avoir quelque autre, telle que seroit la corruption-

ruption des petits poissons, qui, faute de la quantité d'eau qui leur est nécessaire, périssent ordinairement dans les années de sécheresse, & communiquent à l'eau l'odeur fétide de leur pourriture; mais je regarde toujours comme la principale de ces causes, cette végétation extraordinaire de ces sortes de plantes aquatiques, puisque l'abondance & l'accroissement en devinrent si prodigieux en plusieurs endroits des rivières de Marne & de Seine, qu'on fut obligé de les y faire déraciner avec une espèce de ratifloire, pour remédier aux obstacles qu'elles mettoient à la Navigation, & pour rendre le cours de l'eau plus libre.

Enfin, je crois qu'il y a d'autant moins lieu de douter, que la végétation extraordinaire des plantes pernicieuses dont je viens de parler, ait été la principale cause de l'altération de l'eau de la Seine, que par la comparaison que nous avons faite de l'état de cette rivière pendant l'Été & l'Automne de l'année dernière & de celle-ci, avec l'état où elle étoit en 1731, nous n'y avons remarqué que les plantes ordinaires & qu'on a accoutumé d'y voir, plus abondamment; aussi n'avons-nous point observé dans la pratique de la Médecine, que les maladies qui ont régné pendant l'Été & l'Automne de l'année 1731, aient encore paru parmi le peuple durant l'Été & l'Automne de l'année dernière & de celle-ci.

Comme ce n'est donc qu'à l'attention aux maux passés que l'on doit les précautions pour se parer contre leurs retours; ces ob-  
ser-

servations semblent indiquer trois sortes de remèdes pour prévenir ces effets de la sécheresse de certaines années.

Le premier, de faire tenir net, autant qu'il se peut, le lit de la rivière, au moins dans une étendue assez considérable, avant qu'elle aborde à Paris, en empêchant qu'il ne se forme sur ses bords, de ces sortes de mares dans lesquelles l'eau croupit.

Le second, de veiller à ce que les cuvettes de tous les réservoirs qui distribuent l'eau de la rivière, soient exactement nettoyées, & que toutes les plantes qui naissent en forme de mousse contre leurs parois, en soient arrachées.

Et le troisième, que les aqueducs & canaux des fontaines d'eau vive soient en si bon état, que l'eau qu'ils conduisent puisse par son abondance, dans de pareilles occasions, & dans des années de sécheresse, suppléer pour la boisson au défaut de celle de la rivière, ou corriger par le mélange de l'une & de l'autre, les mauvaises qualités que celle-ci pourroit contracter.

~~~~~

METHODE TRÈS SIMPLE

POUR CALCULER

LA PREMIERE EQUATION
DES PLANETES.

Par M. P I T O T. *

LEs Calculs astronomiques sont, par leurs trop grandes longueurs, si pénibles & si ennuyeux, que c'est avec raison que la plupart des Astronomes se sont appliqués particulièrement à chercher des méthodes simples pour les abréger.

C'est aussi par cette seule raison que j'ose donner une nouvelle Méthode pour calculer la premiere Equation des Planetes: car on en a un si grand nombre, qu'il seroit fort inutile d'en donner de nouvelles, si celle que je propose n'avoit cet avantage essentiel d'être très courte & très aisée.

Suivant l'hypothese de Kepler, confirmée par les observations astronomiques, & par de savantes théories, les Planetes décrivent, en tems égaux, des arcs d'Ellipses autour du Soleil, placé à un des foyers, capables de secteurs égaux. Les surfaces ou les aires de ces secteurs proportionnelles aux tems, dé-
ter-

• 2 Septembre 1739.

terminent l'anomalie moyenne des Planetes, les angles au foyer donnent la vraie anomalie ; & la difference entre la moyenne & la vraie anomalie, est la premiere équation des Planetes, appelée aussi *Equation du Centre*.

Si la vraie anomalie d'une Planete étoit donnée, on trouveroit très aisément la moyenne, par une méthode exacte, & par conséquent l'équation du centre ; mais il n'en est pas de même, pour passer de l'anomalie moyenne à la vraie anomalie, ce qui est la résolution directe du Problème de Kepler, car l'anomalie moyenne est toujours donnée par le mouvement moyen des Planetes.

Ce Problème est si important pour l'Astronomie, que plusieurs grands Astronomes ont cherché des méthodes pour le résoudre : on trouve de ces méthodes dans les *Traité*s d'Astronomie de Keill & de Gregori ; le P. Reneau en a inséré une dans l'Analyse démontrée ; M. de la Hire en a donné une autre dans les *Mémoires* de l'Académie de 1710, & enfin M. Cassini en a donné une très belle dans les *Mémoires* de 1719 : mais toutes ces méthodes, aussi-bien que celle que je propose, ne sont que par approximation, ou par des suites infinies, dont les calculs sont d'autant plus longs, que les termes de la suite sont composés, & qu'il faut trouver un plus grand nombre de termes. Par la méthode que je vais donner, l'opération nécessaire à chaque terme se réduit à peu près à une règle de proportion que l'on fait très simplement par les logarithmes, à cause des
deux

deux premiers termes de la règle qui sont toujours constants, & on approche si fort à chaque terme, qu'on trouve la vraie anomalie du Soleil ou de la Terre, de Vénus & de Jupiter, à moins d'une seconde près au troisieme terme; celle de Mars & de Saturne au cinquieme terme, & celle de Mercure au septieme.

On fait assez combien il seroit inutile de pousser l'exacritude des calculs astronomiques au-delà d'une seconde. Notre méthode a encore cet avantage, qu'on ne sauroit se tromper dans les calculs sans le reconnoître: semblable en cela, à la méthode des Cascades pour trouver les racines des équations numériques; dans laquelle une erreur de calcul n'empêche point d'arriver au but qu'on se propose: ils en deviennent seulement un peu plus longs.

Soit $APDB$ l'orbite de la Planete, A l'aphélie ou apogée, B le perihélie ou périégée, F le lieu du Soleil au foyer de l'Ellipse, P le lieu de la Planete sur son orbite. Si du centre C , on décrit le cercle AFB , & qu'on considere d'abord ce cercle comme l'orbite même de la Planete, il est évident qu'on pourra prendre les angles ou les secteurs ACG pour les anomalies moyennes de la Planete; cela posé, presque toute la difficulté se réduit à trouver le point K , qui soit tel qu'ayant tiré les lignes KC , KF , le triangle KCF soit égal au secteur GCK , car alors on aura le secteur AFK , égal au secteur ACG , ou à la moyenne anomalie; & si le cercle étoit l'orbite même de la Planete lorsqu'elle seroit par-

parvenue au point K , l'angle AFK feroit celui de sa vraie anomalie, & la difference entre les angles ACG , AFK , son équation du centre. Or, pour que le triangle KCF soit égal au secteur GCK , il est clair que la perpendiculaire FI doit être égale à l'arc GK , ce qu'on ne sauroit trouver que par approximation. Pour donc parvenir au point K , ou pour trouver l'arc AK , à moins d'une seconde près; de la moyenne anomalie ACG , je retranche le secteur GCM égal au triangle CFG , ce qui se fait en prenant l'arc GM égal à la perpendiculaire FI ; & je vois que le point M ne tombe pas au point cherché K , car le triangle CMF étant moindre que le triangle CGF , est moindre par conséquent que le secteur GCM . Je fais ensuite le secteur GCN égal au triangle CMF , & je remarque que le triangle CNF , étant plus grand que le triangle CMF , est plus grand aussi que le secteur GCN . Si l'on prend un autre secteur égal au triangle GCN , on approchera fort près du point K ; mais enfin on continuera de prendre des arcs GM , GN , égaux aux perpendiculaires FI , jusqu'à ce que leur difference d'avec l'arc GK soit moindre d'une seconde.

Pour prendre les arcs GM , GN , égaux aux perpendiculaires FI , on réduira toute la circonférence du cercle en secondes, on trouvera le nombre des secondes du diamètre AB , & de l'excentricité CF , & on fera cette proportion; comme le sinus total est au sinus de l'angle FCI , ou des angles ACG ,

Mém. 1733.

Z

ACM ,

ACM , &c. ainsi le nombre des secondes de CF seront à celles de FI .

Mais comme dans cette proportion le sinus total & les secondes de CF , sont constans pour tous les cas, je prends la difference de leurs logarithmes, pour la retrancher du sinus des angles ICF , ou ACG , ACM , &c.

L'angle ACK , ou FCK , étant connu, avec les côtés FC , CK , du triangle FKC , on trouvera l'angle CFK ; or, la somme des côtés FC , CK , est égale à FA , & leur difference égale à FB , qui sont des quantités constantes; c'est pourquoi je prends la difference de leurs logarithmes pour la retrancher dans tous les cas, de la tangente de la moitié de l'angle ACK .

Enfin, pour avoir l'angle AFP de la vraie anomalie par les propriétés de l'Ellipse, la surface du secteur du cercle AFK , est à la surface du secteur d'Ellipse AFP , comme HK est à HP , comme CE est à CD , comme la tangente de l'angle AFK , à la tangente de l'angle AFP ; mais CE , CD , étant des grandeurs constantes, je prends la difference de leurs logarithmes pour la retrancher dans tous les cas, de la tangente de l'angle AFK .

E X E M P L E.

Trouver la vraie anomalie de Mars, qui convient à 30 degrés d'anomalie moyenne?

On a, par les observations de plusieurs Astronomes, l'excentricité CF de cette Planete de 9260 parties, le rayon CA étant pris de 100000, d'où l'on trouve la valeur de FA de


de 109260, celle de FB de 90740, & par la propriété de l'Ellipse, celle de CD de 99571. Ayant réduit le rayon CA en secondes de la circonférence, on dira, si 100000 donnent les secondes de CA , 9260 donneront les secondes de CF , dont le logarithme étant retranché du sinus total, le reste 571900 sera un logarithme que je nomme (a), qui servira pour tous les cas, ou pour tous les degrés d'anomalie moyenne de Mars.

La difference entre le logarithme de FA 109260, & de FB 90740 est 008061, c'est un second logarithme qui servira pour tous les cas, & que je nomme (b).

Du logarithme de CE , ayant retranché le logarithme de CD , on aura 000187 pour un troisieme logarithme qui servira dans tous les cas, que je nomme (c).

Ces trois préparations étant faites, pour suivre notre exemple, du sinus de 30 degrés ou de la moyenne anomalie, il faut retrancher la valeur de (a) 571900 pour avoir le logarithme de 9549 secondes ou $2^{\circ} 39' 9''$ qu'il faut retrancher de 30 degrés, reste $27^{\circ} 20' 51''$ pour un arc, que je nomme *premier arc trouvé*, du sinus duquel il faut retrancher derechef le logarithme (a) pour avoir le logarithme de 8773" ou $2^{\circ} 26' 13''$ qu'on retranchera de même de 30 degrés, pour avoir un second arc trouvé de $27^{\circ} 33' 47''$; ainsi de suite on trouvera un troisieme arc trouvé de $27^{\circ} 32' 43''$, & un quatrieme de $27^{\circ} 32' 48''$: mais si on cherche un cinquieme arc trouvé, on verra qu'il ne sera pas different du quatrieme, ainsi l'angle ACK , ou l'arc AK , est

de $27^{\circ} 32' 48''$, dont la moitié est $13^{\circ} 46' 24''$. De la tangente de cette moitié, on retranchera le logarithme (b) pour avoir la tangente de $11^{\circ} 30' 34''$, qu'il faut ajouter à la moitié de l'angle ACK $13^{\circ} 46' 24''$ pour avoir l'angle AFK de $25^{\circ} 16' 58''$, dont il faut prendre la tangente, & en retrancher le logarithme (c) pour avoir la tangente de l'angle AFP , ou de la vraie anomalie qu'on cherche, de $25^{\circ} 11' 15''$. Enfin, si on veut avoir l'équation du centre, il faut retrancher la vraie anomalie $25^{\circ} 11' 15''$ de la moyenne 30 degrés, on aura $4^{\circ} 48' 45''$.



REMARQUES

SUR LES MONSTRES,

A l'occasion d'une Fille de douze ans, au corps de laquelle étoit attachée la moitié inférieure d'un autre corps; & à l'occasion d'un faon à deux têtes, dissequé par ordre du Roi.

AVEC DES OBSERVATIONS


SUR LES MARQUES DE NAISSANCE.

PREMIERE PARTIE.

Par M. WINSLOW. *

JE fus appelé, il y a quelques années, à l'Hôpital général pour voir une Fille malade qu'on disoit avoir deux corps, & pour

* 9 Mai 1733.





pour délibérer si l'on administreroit l'Extrême-Onction à une seule ou à deux. Cette fille, âgée de douze ans, étoit assez grande pour cet âge, & d'ailleurs bien formée, excepté qu'elle avoit à la région épigastrique, un peu vers le côté gauche, la moitié inférieure, c'est-à-dire, le Bas-ventre & les Extrémités inférieures d'un autre corps, qu'on prenoit aussi pour celui d'une fille.

Ce demi-corps étoit beaucoup plus petit à proportion que le corps entier, n'ayant qu'environ les deux tiers du volume de la pareille portion du grand. La situation étoit telle, que le ventre du petit corps regardoit le ventre du grand. On n'appercevoit dans le petit aucun vestige de Tête, ni de Bras, ni de Poitrine, excepté une rangée de Vertèbres, dont on sentoît assez distinctement la portion supérieure être attachée & comme soudée à la moitié inférieure du Sternum du grand corps, de manière que leurs apophyses épineuses étoient tournées en devant, & que leurs portions arrondies regardoient le Sternum de la grande fille. Le reste de cette rangée de Vertèbres ou Epine du dos s'avançoit peu à peu sur le devant, en s'éloignant de plus en plus du corps entier.

La partie inférieure du Dos & la partie supérieure de l'Épigastre du corps imparfait ou petit corps, paroissent confondues avec la partie inférieure de l'Épigastre du grand corps. Au reste les deux Bas-ventres étoient tout-à-fait séparés l'un de l'autre, & tournés l'un vers l'autre avec les Bassins & les extrémités inférieures.

On ne distinguoit pas les Vertebres Lombaires du demi-corps, au-lieu desquelles on sentoît, en y touchant, une espece de Ligament plat très fort, qui paroissoit attaché par une extrémité au bas des Vertebres du dos, & par l'autre à l'Os sacrum & aux parties voisines des Os des hanches, appelés communément *Os innominés*, de sorte que par le moyen de ce Ligament le demi-corps étoit comme suspendu sur le devant du corps entier. La pauvre fille étoit même obligée de le soutenir continuellement dans une espece d'écharpe pour se soulager du fardeau, & pour empêcher le ballotement, qui lui étoit fort incommode, sur-tout quand elle étoit debout, & faisoit quelques mouvemens, ou marchoit. Elle étoit encore obligée de tenir les fesses du petit corps toujours envelopées de linges, à cause de l'écoulement des matieres fécales.

Les Extrémités inférieures, c'est-à-dire, les Cuisses, les Jambes & les Pieds du petit corps étoient toujours en attitude de flexion, & ne donnoient aucunes marques de mouvement. D'ailleurs la conformation externe ou superficielle du Bas-ventre, des fesses & de toutes les autres portions des extrémités inférieures, étoit très naturelle. Toutes ces parties paroissoient même bien nourries, grasses, & dans un état ordinaire d'embonpoint. La Peau dont elles étoient couvertes, étoit comme une vraie continuation de la Peau du grand corps.

La connexion de ces deux sujets paroissoit d'abord à la premiere inspection comme s'il

y avoit eu dans le grand corps une grande ouverture au dessus du creux de l'Estomac, par laquelle le petit corps auroit fourré sa Tête, ses Bras, ses Epaules & sa Poitrine dans la cavité de la Poitrine du grand, de sorte que le Bas-ventre avec les Extrémités inférieures auroient resté dehors, & la peau de l'un auroit été entièrement unie & comme incorporée avec celle de l'autre par leur rencontre mutuelle.

C'est ce qui avoit donné lieu de soupçonner à quelques-uns, que la moitié ou portion supérieure du petit corps pourroit être réellement cachée au dedans du grand, & que par conséquent il pourroit y avoir deux sujets entiers, dont chacun en particulier seroit capable de recevoir le même Sacrement. Mais ne voyant qu'une étendue ou capacité très médiocre de la Poitrine & du Bas-ventre de la grande fille, & ayant considéré très attentivement la connexion particulière de l'Epine du Dos du petit sujet avec le Sternum du grand, j'opimai que le petit n'avoit ni Tête, ni Bras, ni même quelque apparence de Cœur, & qu'on ne pouvoit pas le regarder comme un sujet animé en particulier.

Le soupçon qu'on en avoit formé auparavant, auroit encore pu être poussé plus loin par l'observation suivante. Je remarquai pendant cet examen, que la fille portoit de tems en tems ses mains sur les fesses & sur les cuisses du petit corps, & qu'elle les grattoit. Je demandai pourquoi elle le faisoit, & si elle sentoit les impressions qui en arrivoient à ce petit corps. Elle me répondit qu'elle

les sentoît très bien, & que cela lui faisoit plaisir.

Cette observation me fit souvenir d'une pareille, que j'avois faite sur un Italien âgé d'environ dix-huit ans, à la Foire de St. Laurent, l'an 1698. Il avoit, immédiatement au-dessous du cartilage de la troisième côte, du côté gauche, une autre Tête beaucoup plus petite que la sienne. L'Inscription Venitienne de son portrait, que j'ai toujours gardé depuis, marquoit que les deux Têtes avoient été baptisées sous des noms différens, savoir la sienne, sous celui de Jaques, & l'autre, sous celui de Matthieu. La petite Tête étoit située comme si un enfant caché dans le bas-ventre l'en avoit poussée au-dehors pour regarder quelque chose. Elle étoit fort adhérente au grand corps par la moitié inférieure de la partie latérale du côté droit de la face; de sorte que l'oreille droite, & les parties circonvoisines de cette oreille, étoient cachées. Tout le reste de la Tête & de la face, avec les cheveux & la plus grande partie du cou, étoit entièrement dehors, & on y voyoit le front, les yeux, le nez, la bouche, les dents & le menton très distinctement. Je lui demandai s'il sentoît quand on touchoit à la petite Tête, & m'ayant répondu qu'oui, je cherchai une occasion favorable pour en être bien assuré. Je ne fus pas long-tems sans y réussir; car pendant que j'examinois toutes les parties de cette Tête, je me saisis du moment, qu'un certain objet fit détourner le visage du grand garçon, & je pinçai avec mes ongles la peau derrière l'o-
reil-

reille de la petite Tête. Le grand cria dans l'instant que je lui faisois mal, & je lui marquai que je l'avois fait exprès. Ainsi voilà deux expériences que j'ai faites moi-même de la communication du sentiment du Toucher entre deux corps joints ensemble contre nature.

Pour revenir à l'histoire de la fille, comme elle étoit très malade, je priai qu'en cas de mort on me fît avertir, & qu'on me permît d'en faire la dissection. Elle mourut quelques jours après, & en ayant été averti, je me transportai à l'Hôpital. Feu M. Duvernay le Professeur s'y trouva aussi, de même que M. Dupont Chirurgien-Major des maisons de cet Hôpital. Le sujet étoit déjà très altéré, & presque corrompu par la grande chaleur de la saison, ce qui nous empêcha de faire ce que nous aurions souhaité, & nous obligea à nous contenter des observations suivantes, d'autant plus qu'on étoit fort pressé pour l'enterrement, à cause de la puanteur.

L'estomac étoit unique & situé à l'ordinaire, mais d'un grand volume; il étoit flasque & très médiocrement rempli. L'intestin duodenum en partoît comme de coutume, suivi naturellement de l'intestin jejunum, & à peu près d'un tiers de l'intestin ileum, qui ensuite faisoit une bifurcation, & produisoit le reste de deux intestins ileums, l'un pour le grand sujet, & l'autre pour le petit. Chacun de ces deux ileums aboutissoit à de gros intestins ordinaires.

Le foye paroissoit d'abord simple, excep-

té que le lobe gauche, qui ordinairement est petit, étoit fort épais. La convexité ou face supérieure de toute la masse du foye étoit uniforme & sans apparence d'un foye double. La face inférieure portoit deux vésicules du fiel bien formées, l'une ordinaire & dans sa situation naturelle sous le lobe droit, l'autre extraordinaire & placée sous le lobe gauche. Ces deux vésicules alloient séparément au duodenum, à peu de distance l'une de l'autre.

Dans le petit sujet l'intestin colon, au lieu d'aboutir à celui qu'on appelle *Rectum*, paroïssoit se confondre avec la vessie, & en former une espece de cloaque avec les ureteres qui s'y terminoient aussi à l'ordinaire. Ce réceptacle commun de la matiere fécale & de l'urine n'avoit qu'une issue, dont l'extérieur étoit en maniere d'anüs confondu avec une petite portion de la partie naturelle externe du sexe féminin. Au reste, il n'y avoit dans ce petit sujet, ni au-dedans, ni au-dehors, aucun vestige d'organe de génération ou marque de sexe.

Dans ce même petit sujet toutes les parties inférieures étoient à l'extérieur très bien conformées. Les lombes, le siege, les hanches, les cuisses, les jambes, les pieds, avec toutes les articulations, paroïssent être dans leur état naturel, & même les fesses, comme aussi ce qu'on appelle communément le molet ou gras de jambe, marquoient très bien la forme & la consistance ordinaire de ces parties. Je voulus, nonobstant la grande puanteur subitement arrivée par la chaleur de la saison,

exami-

examiner particulièrement le dedans de ces mêmes parties, dont j'avois vu & expérimenté si évidemment la communication de sensibilité qu'elles avoient avec le corps du grand sujet pendant la vie. M. Duvernay me dit que je pourrois y rencontrer ce qu'il avoit vu autrefois dans un sujet à peu près semblable, savoir, qu'il n'y avoit point de muscles. Cela augmenta ma curiosité, & ayant moi-même disséqué ces parties d'un bout jusqu'à l'autre, je n'y trouvai aucun muscle, ni même la moindre fibre charnue; ce n'étoit que la seule graisse avec une distribution de vaisseaux sanguins & de nerfs, qui remplissoit l'intervalle de la peau & des os. Ces os étoient dans leur état naturel. J'ai trouvé quelque tems après dans l'Histoire Latine de l'Académie par feu M. Duhamel, parmi les Mémoires de l'année 1694, une observation très courte de M. Duvernay, sur un Fœtus à peu près semblable; par l'extérieur, aux sujets que je viens de décrire, mais il n'y est pas fait mention de la structure interne de ce fœtus. Ainsi je ne fais si c'est l'exemple dont M. Duvernay m'avoit voulu parler. M. de Jussieu le jeune, de cette Compagnie, a vu en son particulier la fille dont je viens de parler.

Ayant depuis en différens tems, & à tête reposée, fait plusieurs réflexions sur ces phénomènes, j'ai trouvé de très grandes difficultés dans le système de ceux qui nient les germes originairement monstrueux, & n'attribuent la formation des Monstres qu'au dérangement accidentel de la structure naturel-

le des germes originaires, soit par confusion de deux ou de plusieurs germes entiers, soit par destruction, changement, adhérence, &c. de quelque portion des germes naturels, selon les differens degres & les differentes manieres de compression par les parties voisines. Ces difficultés, que j'avois ensuite abandonnées pendant quelque tems, se sont encore renouvelées à l'occasion d'un Faon de Biche à deux têtes, dont je fis la dissection & la description par ordre du Roi, comme je dirai ci-après.

Ayant à cette occasion parcouru dans les Mémoires de l'Académie, toutes les observations qui s'y trouvent sur les Monstres, les mêmes difficultés se sont beaucoup augmentées. Elles m'ont enfin paru presque insurmontables après avoir comparé ces observations les unes avec les autres, n'en ayant d'abord examiné que les deux les plus détaillées, dont l'une est employée pour le système des Monstres originaux, dans les Mémoires de l'année 1706, par M. Duvernay; & l'autre pour le système des Monstres accidentels, dans les Mémoires de l'année 1724, par M. Lemery.

Voici l'histoire du Faon à deux têtes, dont il est fait mention ci-dessus, & que je reçus le 22 Mai 1729, de M. d'Onz-en-Bray, à qui M. le Cardinal de Fleury l'avoit envoyé de la part du Roi, pour en faire faire la dissection & la description. Ce Faon considéré comme étant debout sur les quatre pattes, avoit 14 pouces de hauteur, & autant de longueur. Le cou & les deux têtes étoient

d'une dimension proportionnée à cette mesure. L'une des deux têtes étoit posée sur le cou, presque dans l'attitude ordinaire, mais tant soit peu inclinée sur le côté droit. L'autre tête étoit unie par la partie latérale inférieure du côté gauche de l'occiput, avec la partie latérale inférieure du côté droit de l'occiput de la tête supérieure. La même tête latérale ou inférieure étoit posée de manière que la tête supérieure étant vue de profil, on voyoit la tête latérale directement de front; elle paroissoit un peu plus grosse que l'autre.

Il y avoit trois oreilles, une au côté droit de la tête supérieure, une au côté gauche de la tête latérale, & une commune aux deux têtes. Cette oreille commune & mitoyenne étoit un peu plus large que les autres. Par sa convexité, elle étoit fort égale & simple, mais au fond de sa concavité s'élevoit une ligne saillante qui partageoit ce fond comme en deux conques, & ensuite continuoit le long de la concavité de l'oreille, en diminuant de saillie peu à peu vers l'extrémité de l'oreille, où elle se perdoit entièrement. Le bord de la concavité de chacune des deux autres oreilles, ou oreilles propres, étoit garni d'un poil blanc vers l'extrémité de l'oreille, lequel poil blanc environnoit le poil noir, dont le milieu de la concavité étoit médiocrement couvert. Le bord blanc de l'oreille mitoyenne ou commune jettoit de sa pointe une raye blanche qui alloit gagner la ligne saillante mentionnée ci-dessus, & divisoit la portion voisine du milieu noir en deux.

Les deux têtes étoient jointes par dehors, jusques vers le milieu des joues voisines, de maniere qu'elles avoient chacune séparément leurs deux yeux à l'ordinaire, excepté que l'un des deux yeux de la tête latérale étoit un peu plus gros & un peu plus saillant que les autres yeux. Chaque tête avoit son nez, ses narines, son museau, sa bouche, ses mâchoires, son palais, sa langue & sa gorge. La mâchoire inférieure de l'une & de l'autre tête étoit également mobile, pour pouvoir servir à brouter, & les deux mâchoires étoient également garnies de dents à l'ordinaire.

Le cou qui portoit ces deux têtes, de la maniere qu'il est dit ci-devant, étoit plus courbé qu'à l'ordinaire, & tant soit peu incliné à droite. Tout le reste du corps n'avoit rien de singulier à l'extérieur. Les deux côtés du cou & du tronc ou corps étoient légèrement jaspés de taches blanches, comme le sont pour l'ordinaire ces animaux dans le premier âge.

Je me suis contenté d'examiner par la dissection, les deux têtes, & de m'attacher principalement dans cet examen à ce que je trouvois de singulier dans les parties communes à ces deux têtes, en les comparant avec celles qui y avoient rapport dans chaque tête en particulier. Je remets le détail de la dissection à la seconde partie de ce Mémoire, pour des raisons que je dirai en même tems.

Les difficultés que je proposerai ici à l'occasion des deux Systèmes, regardent non-seu-

le-

lement ce qu'on a coutume d'appeller *Monstre*, mais aussi tout ce qui se trouve d'extraordinaire dans la structure du Corps humain, & dans celle des Animaux, par addition, par défaut, par difformité, par transposition, par confusion, &c. de certaines parties, soit dans un seul sujet, soit dans deux ou plusieurs sujets unis ensemble contre nature.

J'exposerai ces difficultés par maniere de Réflexions sur des Exemples ou faits rapportés dans les Mémoires de l'Académie, & sur quelques autres bien averés. Je commencerai par les sujets simples, je continuerai par les composés.

Mon dessein étoit de ranger sous la premiere de ces deux classes, parmi les sujets simples, ceux qui n'ont que quelque petite partie surnuméraire, ou double, triple, &c. Mais comme on applique aussi à ces derniers sujets, le système des Monstres accidentels, & de la confusion des germes originairement séparés, j'ai trouvé plus à propos d'en faire une troisieme classe particuliere; & de les placer après ceux de la seconde classe, qui comprendra les sujets dont la composition extraordinaire est formée des parties plus considérables, de même que ceux qui sont doubles, triples, &c. soit totalement, soit par portions.

Exemples de la premiere Classe.

I.

1688. M. Méry fit dans l'Hôtel Royal des Invalides, l'ouverture du cadavre d'un Soldat

dat qui avoit 72 ans, & il y trouva généralement toutes les parties internes de la Poitrine & du bas-Ventre situées à contre-sens; celles qui dans l'ordre commun de la nature, occupent le côté droit, étant situées au côté gauche, & celles du côté gauche, l'étant au droit. Le Cœur étoit transversalement dans la Poitrine, sa base tournée du côté gauche occupoit justement le milieu, tout son corps & sa pointe s'avancant dans le côté droit. Ses deux Ventricules, ses Oreillettes & ses Vaisseaux avoient aussi une situation différente de l'ordinaire; car la plus grande des Oreillettes & la Veine cave étoient placées à la gauche du cœur. Ainsi la Veine cave descendant le long des Vertèbres, perçoit à gauche le Diaphragme, & occupoit aussi le même côté dans le Bas-ventre jusqu'à l'Os sacrum. La Veine Azygos sortant du tronc supérieur de la Veine cave, occupoit le côté droit des Vertèbres du Dos. La plus petite des Oreillettes & l'Aorte étoient placées à la droite du cœur; en sorte que l'Aorte produisoit sa courbure de ce côté-là contre l'ordinaire, & après avoir passé entre les deux portions du Muscle inférieur du Diaphragme, elle descendoit jusqu'à l'Os sacrum, tenant le côté droit des Vertèbres des Lombes, & ayant toujours la Veine-cave à sa gauche. L'Artere du Poumon, en sortant du grand Ventricule, placée au côté gauche, se glissoit obliquement à droit; au-lieu qu'elle se porte ordinairement à gauche. Le Poumon droit n'étoit divisé qu'en deux lobes, & le gauche en trois.

L'Oeso-

L'Oesophage entrant dans la Poitrine, passoit de gauche à droit au devant de l'Aorte, & continuant sa route, il perçoit le Diaphragme de ce côté-là; en sorte que l'orifice supérieur de l'Estomac se rencontrant dans le même endroit, son fond se trouvoit placé dans l'Hypochondre droit, & le Pylore dans le gauche où commençoit le Duodenum, qui se plongeant dans le Mesentere, en ressortoit au côté droit contre l'ordinaire; & là se trouvoit le commencement du Jejunum. La fin de l'Ileon, le Cæcum & le commencement du Colon étoient placés dans la région Iliaque gauche, d'où le Colon commençant à monter vers l'Hypochondre du même côté, passoit sous l'Estomac pour se rendre dans l'Hypochondre droit, puis descendoit par les régions lombaire & iliaque droites dans la cavité Hypogastrique.

Le Foye étoit placé au côté gauche de l'Estomac; son grand Lobe occupant entièrement l'Hypochondre de ce côté-là. Sa scissure se trouvoit vis-à-vis l'appendice xyphoïde du Sternum, & son petit Lobe déclinait vers l'Hypochondre droit. Les Vaisseaux Colidoques & la Veine-porte parcouroient leur chemin de gauche à droit. La Rate étoit placée dans l'Hypochondre droit, & le Pancreas se portoit transversalement de droit à gauche au Duodenum. Le Rein droit étoit plus bas que le Rein gauche; la Veine Spermatique droite sortoit de la Veine Emulgente ou Rénale droite, & la gauche du tronc de la Veine-cave. La Capsule atrabilaire ou Glande sur-Rénale gauche recevoit sa veine du tronc

tronc de la Veine-cave placée au côté gauche des Vertèbres des Lombes, & la veine de la Capsule droite sortoit de la Veine Emulgente ou Rénale droite.

M. Duhamel ancien Secrétaire de l'Académie, & Prédécesseur de M. de Fontenelle, en a fait le rapport dans son Histoire Latine de cette Académie, Liv. III. Chap. II. à l'année 1689; mais comme elle y est trop raccourci, j'ai suivi la Relation originale que M. Maloet a fait voir à la Compagnie, & qui, la même année 1688, a été signée de M. Duchesne Médecin ordinaire dudit Hôtel, de M. Morand le pere, qui en étoit le Chirurgien-Major, de M. Méry qui a donné le détail de la dissection à l'Académie, & de M. Duparc Chirurgien de S. Côme qui est encore en vie. On l'a depuis imprimée dans le Recueil des anciens Mémoires de l'Académie, Tome X. sous ce titre: *Observation faite dans l'Hôtel Royal des Invalides, sur le corps d'un Soldat mort à l'âge de 72 ans.*

On avoit déjà vu à Paris, en 1650, un pareil exemple dans le Meurtrier qui avoit tué un Gentilhomme, au-lieu de M. le Duc de Beaufort, & dont le corps après avoir été roué, fut disséqué chez M. Regnier Docteur en Médecine de la Faculté de Paris, par M. Bertrand Chirurgien très expert & Anatomiste. Le célèbre Riolan étoit présent à la dissection, & il en a publié l'histoire avec des remarques, dans un Traité particulier, intitulé *Disquisitio de transpositione partium Naturalium & Vitalium in corpore humano*; lequel Traité se trouve parmi ses *Opuscula Anatomica varia*

varia & nova, imprimés à Paris, en 1652, in-12.

La même histoire est détaillée plus au long dans les Observations médicales de Cattier Docteur en Médecine de Montpellier, sur le rapport que le même Chirurgien lui en avoit communiqué. Et Bonet, dans son *Sepulcretum*, Liv. IV. Sect. I. Obs. 7. §. 3. a presque entièrement copié la narration de Cattier. M. Falconet m'a averti, qu'il en est aussi fait mention dans les Mémoires de Joly, qui, à cette occasion, rapporte qu'on avoit trouvé la même chose dans un Chanoine de Nantes. Il m'a encore indiqué le Journal de Dom Pierre de St. Romuald, imprimé à Paris en 1661, où il est dit, qu'on trouva une pareille transposition dans le cadavre du St. Audran Commissaire du Régiment des Gardes à Paris, en 1657.

On peut rapporter ici l'Observation de Frederic Hoffinan, imprimée à Leipsick, en 1671, in-4°. sous le titre : *Cardianastrophe, seu Cordis inversio memorabilis, observata à Collegio Medico Civitatis Hallensis, in anatomia cadaveris feminei.*

Réflexion. En examinant, & en considérant comme il faut, avec toute l'exacritude anatomique, la structure ordinaire de ces parties, & leurs connexions particulieres, tant entre elles-mêmes, qu'avec les autres parties qui les environnent, je ne puis m'imaginer en aucune maniere, comment la conformation générale de toutes ces mêmes parties à contre-sens se peut expliquer par le système des Monstres accidentels.

Pour

Pour bien sentir dans toute leur étendue mes difficultés sur l'application du système des Monstres accidentels à cette observation, il faut exactement considérer tous les phénomènes des dispositions & des configurations extraordinaires qui s'y rencontrent. Et quand même on n'y supposeroit qu'une simple transposition ou inversion de parties ordinaires à contresens, elle seroit inexplicable par ce système. Car quel accident, quelle pression, quel mouvement irrégulier pourroit-on imaginer, qui fût capable de déplacer tous ces viscères, comme par un seul tour de pivot ou de broche, en les détachant de leur connexion primitive, & en leur donnant des attaches nouvelles, & cela sans déranger le diaphragme, & sans, pour le moins, tordre le Pharynx, l'extrémité du Colon, les portions supérieures & les portions inférieures de l'Aorte & de la Veine-cave?

Une telle tournure simple de toutes ces parties ne peut aucunement avoir lieu ici; car outre la contorsion funeste, dont je viens de parler, le devant ordinaire de ces parties auroit par-là été en arriere, & l'arriere en devant; au-lieu que ce devant & ce derriere y paroissent comme de coutume, mais avec cela tout ce qui en devoit être à droite, étoit à gauche, & tout ce qui devoit être à gauche, étoit à droite. Ainsi, toutes ces parties étoient chacune, non-seulement dans une situation extraordinaire, mais encore tout autrement construites qu'à l'ordinaire, & leur configuration, tant interne qu'externe ou superficielle, n'étoit semblable à celle d'autres sujets,

jets, que comme ce que l'on voit dans un miroir-ressembler à l'original, ou à peu près comme la main gauche ressembler à la main droite, c'est-à-dire, symétriquement; de sorte que si les parties du sujet, dont il s'agit, étoient mises sur une planche directement à côté de pareilles parties d'un autre sujet ordinaire & proportionné en grandeur, elles feroient réciproquement les unes avec les autres la symétrie.

Le Cœur avoit la base à gauche, & la pointe à droite, non pas par un simple détour accidentel, mais par une conformation spéciale à contre-sens, puisque le Ventricule mince, communément appelé *ventricule droit*, étoit placé à gauche, avec la grande Oreillette & la Veine-cave, qui tient à cette Oreillette; & que le Ventricule épais, communément appelé *ventricule gauche*, étoit situé à droite, avec l'Oreillette pulmonaire & l'Aorte. La division du Poumon gauche en trois lobes, pendant que le Poumon droit n'en avoit que deux, ne seroit pas de si grande conséquence; mais la direction de l'Artere pulmonaire de gauche à droite dépend d'une structure spéciale, conformément à celle de toutes les parties du Cœur, & à celle de l'Aorte & de la Veine-cave. Je demande par quel accident, par quelle pression, &c. cette construction particulière à contre-sens pourroit arriver à un germe originairement ordinaire?

A l'égard de l'Estomac, de l'Oesophage, des Intestins, des gros troncs d'Arteres & de Veines, la difficulté d'expliquer selon le système des accidens leur situation extraordinaire, ne paroît pas difficile à ceux qui
ne

ne font pas entierement au fait des particularités ordinaires de la structure & de la connexion de ces parties. Il suffira de leur bien faire comprendre la contorsion & le dérangement, qu'auroient nécessairement souffert par-là l'Oesophage vers le Pharynx, l'Estomac dans ses connexions avec le diaphragme, les Intestins par rapport au Mésentère, les portions supérieures & inférieures de même que les premières ramifications latérales de l'Aorte & de la Veine-cave. Un peu de réflexion sur un examen superficiel de ces parties, mais fait dans le sujet même, suffiroit pour sentir la difficulté dont il est question.

La situation du Foye à gauche rend encore beaucoup plus sensible cette difficulté. Car pour que ce viscere ayant été originairement construit à l'ordinaire, pût ensuite par quelque accident occuper le côté gauche, en cédant le côté droit à la Ratte, il faudroit pour le moins que le bord mince ou antérieur avec la vésicule du Fiel fût tourné en arrière, & que le bord épais ou postérieur fût tourné en devant avec la grande échancrure, à laquelle la Veine-cave & les troncs des Veines Hépatiques tiennent intimement; ce qui ne se trouvoit pas dans ce sujet. M. Méry étoit trop bon Observateur pour ne pas rapporter un phénomène qui lui auroit sauté aux yeux, & lui auroit paru bien plus monstrueux que la construction particulière de toutes les portions de ce viscere, conformément à la seule situation extraordinaire de leur masse. Comment par le système des germes acci-

accidentellement monstrueux expliquer cette particularité inévitable, & comment se défendre d'avoir ici recours au sentiment opposé?

II.

1699. M. Chemineau, Médecin de la Faculté de Paris, apporta à l'Académie un Cœur de Fœtus humain, d'une structure extraordinaire. Ce Cœur avoit trois Ventricules, qui communiquoient ensemble, comme celui de la Tortue. Les deux Ventricules ordinaires ne recevoient que les Veines, savoir, le Ventricle droit recevoit les Veines-caves, & le Ventricle gauche recevoit les Veines pulmonaires. Le troisieme Ventricle, qui étoit l'extraordinaire, fournissoit à part les gros Troncs artériels, savoir, celui des Arteres pulmonaires & celui de l'Aorte, lesquels n'avoient point de communication avec les deux autres Ventricules. Ainsi par cette construction particuliere les deux Ventricules ordinaires pouffoient uniquement dans le troisieme Ventricle le sang qu'ils avoient reçu des Veines, & ce troisieme Ventricle pouffoit seul en particulier dans les Arteres les deux fortes de sang reçu des autres Ventricules. Il n'y avoit point de canal de communication entre l'Artere pulmonaire & l'Aorte inférieure; lequel canal ne manque jamais dans l'état ordinaire des Fœtus.

Réflexion. Je demande à ceux qui sont réellement au fait de la structure, quel accident on pourroit imaginer, qui fût capable de produire ce troisieme Ventricle? Quelqu'un diroit

droit peut-être, que la Cloison ordinaire s'étoit fendue en deux lames qui ont laissé entre elles une espece de cavité. Mais les troncs artériels, par quelle mécanique accidentelle auroient-ils dans un germe ordinaire pu être entierement exclus des Ventricules ordinaires, & uniquement implantés dans le Ventricule extraordinaire? Je le demande toujours aux vrais connoisseurs de la structure, & je leur demande aussi, par quelle mécanique accidentelle seroient formés les trous extraordinaires, par lesquels ce troisieme Ventricule communiquoit avec les deux Ventricules ordinaires? Je le demande encore par rapport au défaut du canal artériel?

I I I.

1700. M. Mery trouva dans un Enfant monstrueux l'Epine du dos contournée de telle sorte, qu'en regardant la face, la poitrine & le ventre en devant, on trouvoit les parties externes du sexe, les Genoux & les Pieds dans une situation toute opposée, c'est-à-dire, en arrière. La Tête étoit sans voûte de crane, la Poitrine sans sternum, sans cartilages des côtes, & le Ventre sans muscles; de sorte que ces trois cavités restoient toutes ouvertes. Les deux Oreillettes du Cœur formoient une cavité commune, dans laquelle les Veines-caves & les Veines pulmonaires avoient leurs embouchures, & il n'y avoit point de trou ovale. La cavité commune de ces deux Oreillettes communiquoit par une grande ouverture avec la cavité du Ventricule droit.

droit. Ce Ventricule droit avoit communication par un petit passage avec le Ventricule gauche. De ce Ventricule gauche sortoient & l'Artere pulmonaire & l'Aorte.

Réflexion. On pourroit laisser ici au système des conformations accidentelles les premiers phénomènes de cette observation : mais voilà une structure extraordinaire du Cœur très différente de celles de l'Exemple précédent. Je réitere ici la même demande aux Anatomistes expérimentés : par quelle aventure accidentelle l'Artere pulmonaire a-t-elle pu quitter le Ventricule droit, pour venir du Ventricule gauche, & comment l'Oreillette gauche avec le sac des Veines pulmonaires auroit-elle pu abandonner le Ventricule gauche pour aller à contre-sens s'ouvrir dans le Ventricule droit ? On peut confronter avec ces deux Exemples l'Observation de Stenon, que j'ai rapportée dans mon Mémoire sur la circulation du sang dans le Fœtus.

I V.

1709. Observation de M. Littre sur un Fœtus monstrueux, dont le Cordon ombilical étoit de deux tiers plus court que de coutume, & n'avoit qu'une Artere, au-lieu de deux qu'on y remarque ordinairement. Cette Artere partoît de l'Artere iliaque droite, & sortoit du Ventre par la partie moyenne de la région hypogastrique, au-lieu de sortir par la partie moyenne de la région ombilicale. Etant sortie du Ventre, elle ne se joignoit à la Veine ombilicale qu'après avoir

Mém. 1733.

A a

fait

fait deux pouces de chemin, ensuite elle formoit avec cette veine le cordon ombilical.

La Veine ombilicale étant parvenue du Placenta jusqu'au bout du cordon qui du côté du ventre abandonnoit l'artere du même nom, se portoit à la partie supérieure de l'aîne gauche, & là elle entroit dans le ventre, puis elle montoit le long du côté gauche de cette cavité, attenant le Muscle Psoas, ensuite elle traversoit le Diaphragme à côté du corps de la dernière vertebre du dos; & après avoir parcouru la partie inférieure & la partie moyenne de la poitrine, en y formant plusieurs ovales, elle se terminoit au milieu du tronc supérieur de la Veine-cave. Dans cette route la veine ombilicale recevoit les deux veines iliaques, les lombaires, les deux émulgentes, la veine de la glande rénale gauche & la Veine Diaphragmatique du même côté.

La Veine ombilicale faisoit à l'égard des veines qu'elle recevoit du bas-ventre, la fonction du tronc inférieur de la Veine-cave, dans lequel elles aboutissent pour l'ordinaire.

L'Intestin Ileon aboutissoit dans une poche charnue de la grandeur & de la figure d'un petit œuf de poule. De cette poche partoît un petit tuyau qui se terminoit par un trou rond d'une ligne & demie de diametre, à la surface extérieure du Bas-ventre, un peu au-dessus du Pubis, où il faisoit fonction d'anüs. Il n'y avoit rien qui tint de la forme du Cæcum, du Colon, ni du Rectum.

Les Ureteres étoient beaucoup plus gros qu'à l'ordinaire, & alloient en serpentant d'un bout à l'autre, & avoient chacun une espee de

de mésentere qui les contenoit dans cette disposition. L'Uretere gauche se terminoit à une petite Vessie située à gauche dans le bassin de l'hypogastre, laquelle vessie s'ouvroit aussi en dehors par un petit trou rond au-dessus du pubis. L'Uretere droit s'ouvroit au-dessus de l'aîne du même côté par un petit trou ovale.

Le vaisseau déferent du côté droit aboutissoit dans l'uretere du même côté, & celui du côté gauche dans la petite vessie, &c. &c.

Réflexion. Le raccourcissement du Cordon ombilical pourroit être expliqué par le défaut de l'une des Arteres ombilicales, si celle qui s'y trouvoit & la Veine ombilicale qui l'accompagnoit, y avoient été plus contournées qu'à l'ordinaire. Mais par quel accident expliqueroit-on le passage extraordinaire de ces deux vaisseaux à travers le ventre, l'écartement extraordinaire de l'un & de l'autre, la route & l'embouchure extraordinaires de la Veine ombilicale, les différentes dilatations, les ramifications & les communications très extraordinaires de cette même Veine? Par quel accident expliqueroit-on l'aboutissement extraordinaire de l'Intestin ileum, & son ouverture au dehors sur le pubis? Sans parler du défaut du Cœcum, du Colon & du Rectum, par quel accident expliqueroit-on les courbures serpentantes des Ureteres & la formation de l'espece de Mésentere qui soutenoit ces mêmes courbures? Plus je considère les particularités de toutes ces choses ex-

traordinaires, & moins j'y conçois l'application du système des accidens.

V.

1716. Description d'un Fœtus difforme, par M. Petit. La Veine ombilicale, au-lieu de passer en-bas par la scissure du Foye pour se jeter dans le sinus de la Veine-porte, passoit en-haut par dessus la partie convexe de ce viscere, & alloit se jeter près de l'endroit où la Veine-cave perce le Diaphragme. Au-lieu de deux Arteres ombilicales, il n'y en avoit qu'une, qui étoit, pour ainsi dire, la continuation de l'Aorte inférieure. Il n'y avoit point de cavité de Bassin, point de Matrice, de Vessie, ni de Rectum, ni même de Colon, &c.

Réflexion. Il est très notoire que dans le Fœtus le Foye est une masse très considérable, & à proportion beaucoup plus grosse que dans l'Adulte. On sait que pour l'ordinaire la Veine ombilicale passe au sinus de la Veine-porte dans la face inférieure ou cave de cette grosse masse. Par quel accident expliqueroit-on le passage extraordinaire de la Veine ombilicale par dessus la face supérieure ou convexe de la même grosse masse, & par dessus tant d'épaisseur? Je le demande en Anatomiste.

V I.

La même année 1716. Description de deux Exomphales monstrueux, par M. Mery. La première est d'un Enfant qui avoit vécu 14 heures.

heures. Le Cordon ombilical se terminoit extérieurement au fond d'un sac membraneux de 9 à 10 pouces de diametre, blanc & opaque comme le cordon même, qui contenoit les visceres du Bas-ventre déplacés en dehors, & dont l'embouchure dans l'Ombilic n'avoit qu'un pouce trois lignes. Le Foye tout entier, la vésicule du Fiel, la Rate, l'Estomac & tous les Intestins étoient renfermés dans ce sac.

M. Mery tâchant d'apprendre si cet Exomphale monstrueux a pu être causé *par quelque accident, ou si c'étoit par un vice de conformation*, (ce sont ses propres termes) fait les remarques suivantes :

1. L'ouverture de l'Ombilic n'avoit que 15 lignes de diametre, le Foye seul en avoit du moins 7 pouces. Il n'y a donc nulle apparence qu'il s'est formé & accru hors de la capacité.

(C'est de cette exactitude de M. Mery, que j'ai tiré ci-dessous ma Réflexion.)

2- La Mere a dit qu'il ne lui étoit arrivé aucun accident pendant tout le cours de sa grossesse; mais qu'elle avoit vu seulement tirer les entrailles du ventre d'un Bœuf, ce qui lui avoit frappé vivement l'imagination.

3. Les Muscles du Bas-ventre, n'ayant aucun mouvement avant la naissance, n'ont jamais pu forcer ces parties à Tortir de leur capacité. Donc, l'Exomphale prodigieux ne pouvant être rapporté, ni à aucune cause externe, ni au mouvement du Bas-ventre, *ne peut être que l'effet d'un vice de conformation.*

Le second Exomphale étoit d'un enfant de

6 à 7 mois, né mort, sans aucune marque de sexe, ni au dehors, ni au dedans, & sans anus. Cet Exomphale étoit semblable au précédent. Entre les autres particularités qui s'y trouvoient, étoit celle-ci: deux Vessies extraordinaires s'ouvroient antérieurement, & séparément au-dessous de l'Exomphale, l'une à côté de l'autre, & les Ureteres se croisoient tellement, que l'Uretere droit s'ouvroit dans la Vessie gauche, & l'Uretere gauche s'ouvroit dans la Vessie droite.

Réflexion. Dans le premier cas M. Mery fait expressément difference entre *Monstre par accident*, & *Monstre par vice de conformation*. C'étoit après un vrai Examen anatomique de toutes les circonstances extraordinaires, qu'il n'a trouvé ici nulle apparence de cause par accident, & qu'il a conclu avec assurance, que ce n'a pu être que l'effet d'un vice de conformation.

On peut appliquer sans difficulté le même raisonnement au second cas, sur-tout par rapport à la formation des deux Vessies latérales, & encore plus par rapport au croisement des Ureteres à contre-sens. Par quel accident pourroit-on expliquer tant soit peu raisonnablement aux connoisseurs de la structure ordinaire ces bizarreries extraordinaires?

VII.

On fait que dans l'homme l'extrémité cartilagineuse de la premiere vraie-côte de chaque côté, est pour l'ordinaire intimement unie avec le sternum sans aucune articulation;
de

de sorte que les deux premières côtes forment avec la première pièce du sternum une pièce continue; au-lieu que les extrémités cartilagineuses des six côtes suivantes de chaque côté, n'y sont que contiguës, en étant réellement séparées chacune par une articulation très distincte, & n'y tiennent que par des ligamens; excepté dans quelques Vieillards, où on a trouvé ces articulations, de même que celles des vertèbres, détruites par une espèce d'ossification semblable à celle qu'on observe dans les Anchyloses.

On sait que pour l'ordinaire la première vraie-côte de chaque côté est à proportion plus large qu'aucune de toutes les autres suivantes. On sait aussi que la seconde vraie-côte de chaque côté est pour l'ordinaire articulée avec le sternum fort au-dessous du cartilage de la première côte, à l'endroit où les deux principales pièces, dont le sternum est composé, forment ensemble de chaque côté une échancrure commune, & que les cinq vraies-côtes suivantes de chaque côté sont articulées avec la seconde pièce du sternum, chacune par une échancrure particulière de cette même pièce.

J'ai le Squelette d'un grand corps d'homme, lequel étant vu par devant paroît d'abord n'avoir du côté gauche que six vraies-côtes, pendant que du côté droit on en voit assez distinctement le nombre ordinaire de sept. Ce même Squelette étant regardé par derrière, on y trouve à gauche une portion tronquée de la partie postérieure de la première vraie-côte, articulée à l'ordinaire avec la première

vertèbre du dos, & tout-à-fait soudée par le bout tronqué avec le corps de la seconde vraye-côte. Depuis la soudure, qui y paroît par des traces particulieres, la seconde côte devient plus large que de coutume, prend en quelque façon la forme ordinaire d'une premiere vraye-côte, & s'unit comme elle par un cartilage large avec le sternum, précisément à l'endroit où la premiere côte s'y unit ordinairement. Cette seconde côte est plus longue qu'une premiere ordinaire, & plus courte qu'une seconde ordinaire. On voit au bord supérieur de l'extrémité antérieure de cette même seconde côte irréguliere une très petite avance ou éminence osseuse, unie en partie avec la portion osseuse de la côte, & en partie avec la portion cartilagineuse.

La premiere vraye-côte du côté droit est en son entier, mais l'os en a moins de courbure, & le cartilage beaucoup moins de largeur qu'à l'ordinaire. La seconde vraye-côte du même côté, dont le cartilage est ordinairement étroit, se termine par un cartilage très large, & s'unit au sternum à la place ordinaire de la premiere vraye-côte, & cela conjointement avec la petite portion cartilagineuse de cette côte; mais de maniere que le cartilage de la premiere côte, pour la plus grande partie, paroît confondu avec le cartilage de la seconde, & n'atteint au sternum que par une petite partie.

La troisieme vraye-côte de chaque côté est articulée par son extrémité cartilagineuse avec le sternum, à l'endroit où l'est ordinairement la seconde vraye-côte, c'est-à-dire, dans l'échan-

chancrure articulaire formée par la rencontre & l'union des deux pièces principales du sternum. Par cette disposition extraordinaire les quatre vraies côtes suivantes sont par leurs cartilages auprès du sternum écartées les unes des autres bien plus que de coutume, & cela assez proportionnellement; de sorte que le sternum par-là n'a rien perdu de sa longueur ordinaire, quoique dans la seconde ou inférieure de ces deux pièces principales, il n'y ait ici que quatre échancrures de chaque côté, au lieu de cinq qu'on y trouve ordinairement pour les cinq vraies côtes inférieures de chaque côté.

Réflexion. Selon le système des accidens, la petite éminence ou avance mentionnée ci-dessus, seroit peut-être regardée comme une petite portion de l'extrémité antérieure de la première vraie côte, qui originairement auroit été entière, & dont le reste qui manque entre cette petite portion & la portion postérieure tronquée de la même côte, auroit été fortuitement ou accidentellement détruit.

La difficulté qui m'arrête ici, paroîtra de très peu de conséquence à ceux qui pensent que pour en donner la solution, un coup d'œil sur un Squelette suffiroit, sans avoir examiné avec une application particulière la conformation & la connexion de ces Os. Mais je demande aux connoisseurs, par quelle mécanique accidentelle on expliqueroit comment sur chaque côté du Sternum seroient formées quatre échancrures ou cavités articulaires & bien organisées, au lieu de cinq; quatre cavités proportionnellement arrangées, & cela

sans qu'on y puisse seulement entrevoir ou soupçonner en quel endroit auroit pu être originairement la cinquieme cavité qui manque, & sans que le Sternum ait diminué de longueur; enfin cavités cartilagineuses aussi parfaitement articulaires & aussi spécifiquement organisées à proportion que les plus grandes cavités articulaires du Corps humain, excepté dans quelques vieillards, comme j'ai déjà dit.

Je demande encore aux connoisseurs, par quelle mécanique accidentelle la troisieme vraie-côte de chaque côté auroit été transportée de sa cavité originaire & naturelle dans une cavité extraordinaire si éloignée au-dessus d'elle; & comment les ligamens de l'articulation de cette côte auroient été détachés de leurs endroits originaires, & attachés de nouveau à d'autres endroits fort differens. Par quelle mécanique accidentelle n'y a-t-il ici que trois traces de la division originaire de la seconde piece principale du Sternum? Comment la quatrieme trace de cette piece a-t-elle été abolie sans la diminution de la longueur ordinaire de la piece, & sans la moindre disproportion des intervalles des trois traces qui y restent?

La difficulté me paroît encore plus grande à l'égard de la transposition de l'extrémité antérieure de la seconde vraie-côte de chaque côté à l'endroit ordinaire des cartilages de l'une & de l'autre premiere vraie-côte, & sur-tout à l'égard du changement de la connexion articulaire de ces secondes côtes en une espece de connexion fort differente. La diffé-

ren-

rence particuliere de la conformation de la seconde vraye-côte du côté gauche d'avec sa conformation ordinaire, & les traces qui bornent la soudure de la portion tronquée de la premiere côte, n'embarrassent pas moins dans l'application du systême de l'altération accidentelle des germes originaires naturels. Je ne parle pas ici de l'inconvénient qu'auroient causé aux deux premieres Vertebres du dos l'union extraordinaire de ces côtes avec le Sternum, & la soudure inébranlable de la premiere côte gauche avec la seconde du même côté.

VIII.

J'a vu (ici à Paris) un Etranger qui n'avoit à chaque main que le seul doigt Index, dont la conformation étoit entierement naturelle. Il n'y avoit aucun vestige de tous les autres doigts, excepté une petite portion du ponce qu'on n'appercevoit qu'en y touchant. Les extrémités des Os du Métacarpe étoient immédiatement recouvertes de la peau, qui paroissoit simplement la continuation de celle qui couvroit le corps de la main & le doigt index. Au seul moyen de ces deux doigts, il écrivoit, dessinoit, & faisoit plusieurs sortes de peinture, même en miniature.

La premiere fois que je le vis, il me demanda les premieres lettres de mon nom, & lui ayant marqué un *J*, un *B* & un *W*, il en fit sur le champ en ma présence avec son crayon un chiffre ou entrelacement très symétrique, & cela sans prendre aucune mesure,

re, ni faire ce qu'on appelle calquer. Il écrivit en même tems au-dessous du chiffre ces mots: *Iecit duobus, quorum unum in utraque manu habet, digitis.* 1732. D. 7. Januarii. J. A. Pius.

Pour écrire & pour dessiner ou peindre, il renversoit les deux mains, & les adossoit du côté des deux doigts, qu'il croisoit en contre-sens pour tenir la plume ou le crayon entre les articulations de leurs extrémités. Il tailla aussi en ma présence une Plume à écrire, que je conserve encore.

Réflexion. Il ne paroîtroit pas difficile, selon le système des Monstres accidentels, d'expliquer ceci en général par quelque compression, qui dans le germe originairement entier auroit empêché le développement des autres doigts. Mais il ne me paroît pas bien facile d'expliquer en particulier, de quelle manière cette compression a pu être faite pour avoir laissé croître sans aucun dérangement le seul doigt index, qui, étant situé entre le pouce & les autres trois doigts, paroît avoir été également, pour ne pas dire plus, exposé au même accident que ces doigts.

De quelle manière & par quelle rencontre cette compression pourroit-elle arriver, pour que dans les deux mains le même extraordinaire se trouvât si précisément & si uniformément, & pour que le même doigt de chaque main en fût seul épargné, sans qu'aucun des autres quatre doigts à côté de lui eussent pu éviter leur destruction ?

*DE LA CARTE DE LA FRANCE,
ET DE LA PERPENDICULAIRE
A LA MERIDIENNE DE PARIS.*

Par M. CASSINI. *

ON est assez informé des avantages que l'on peut retirer de la connoissance exacte de l'étendue du Royaume, de ses limites, & de la juste position des divers lieux qui y sont contenus.

Sans cette connoissance, il seroit difficile de prendre des mesures certaines pour tant de projets utiles à l'Etat & au Commerce, tels que la construction des nouveaux Chemins, Ponts & Chaussées, nouveaux Canaux & Navigations de Rivière, qui peuvent tous faciliter le transport des denrées & marchandises d'une Province à l'autre, & procurer l'abondance dans le Royaume.

Ce fut dans ce dessein que le feu Roi Louis XIV, du tems de M. Colbert, qui ne négligeoit rien de ce qui pouvoit contribuer à la gloire & au bien de l'Etat, donna des ordres précis à M^{rs}. de l'Académie des Sciences de travailler à une Carte exacte de la France.

Voici comme on s'en explique dans les Voya^r.

* 14 Novemb. 1733.

A a 7

Voyages faits dans les années 1679 & les suivantes jusqu'en 1682, imprimés au Louvre en 1693. *Après que Sa Majesté eut été informée des Observations que M^{rs}. de l'Académie des Sciences avoient faites par son ordre en divers lieux hors du Royaume, Elle leur ordonna de s'appliquer à dresser une Carte de toute la France avec la plus grande exactitude qui seroit possible.*

En exécution de ces ordres, on envoya sur toutes les Côtes de la France, pendant les années 1679, 1680 & 1681, plusieurs Astronomes de cette Académie, qui établirent par les observations des Satellites de Jupiter, & par les hauteurs des Astres, la juste position des Côtes du Royaume, tant sur l'Océan que sur la Méditerranée, comme on le voit dans une Carte insérée dans les Voyages de M^{rs}. de l'Académie, qui fut imprimée avec les Observations en 1693, & que l'on vient de donner de nouveau au public.

On avoit déjà exécuté la célèbre Mesure de la Terre de M. Picard, par laquelle il avoit déterminé en toises la grandeur exacte des degrés d'un Méridien ou de latitude, que l'on supposoit alors tous égaux entre eux; c'étoit, pour ainsi dire, le préliminaire de tant d'ouvrages que l'on a entrepris dans la suite pour la perfection de la Géographie & de la Navigation.

On mesure sur Terre & sur Mer par les observations astronomiques les distances en degrés; mais comment réduire les routes que l'on a mesurées sur ce continent en degrés, & réciproquement les degrés en mesures

con-

connues, si l'on ne fait la juste étendue de ces degrés ?

Diverses Nations l'avoient tenté avant nous, mais aucune n'y avoit réussi, les unes les ayant trouvé beaucoup trop grands, & les autres beaucoup trop petits. Il étoit nécessaire de les fixer, & l'on peut dire, à la gloire de la France, que cette recherche lui étoit réservée, de même que tout ce qui a paru jusqu'ici de plus important pour la perfection de la Géographie & de la Navigation.

La précision avec laquelle cet ouvrage fut exécuté, auroit pu paroître suffisante pour fixer la grandeur des degrés de latitude; cependant comme il n'y avoit qu'une très petite portion de la Terre de mesurée par rapport à sa circonférence; que d'ailleurs il étoit nécessaire d'examiner si ces degrés étoient égaux entre eux, ou s'il y avoit quelque inégalité, & de quel sens, comme l'avoient prétendu les plus habiles Géomètres & Philosophes de notre tems, on jugea que l'on pourroit connoître encore avec plus d'exactitude la grandeur de la Terre & sa figure, si l'on mesuroit de la même manière, suivant un Méridien, une plus grande portion de la circonférence de la Terre.

Ce fut dans ce dessein que fut entreprise la description de la Ligne Méridienne de Paris qui fut commencée en 1684, continuée en 1702, & achevée entièrement en 1718, au commencement de ce Règne.

On avoit cependant fait plusieurs observations astronomiques en diverses Villes du Royaume pour fixer leur longitude & leur latitude.

titude. On avoit aussi dressé avec un grand soin une Carte des environs de Paris, dont les principales positions avoient été déterminées géométriquement par M^{rs}. de l'Académie; mais toutes ces recherches différentes ne suffisoient pas pour former une Carte de la France, sur l'exa^{ct}itude de laquelle on pût compter. C'est ce qui a déterminé le Ministère d'à présent, toujours attentif à ce qui peut procurer le bien de l'Etat & l'utilité du public, de former le projet d'une Carte de la France, qui me fut communiqué de la part de M. le Contrôleur-général par M. Malet, de l'Académie François^{ise}, pour en conférer avec lui.

Pour l'exécuter avec la plus grande précision qu'il seroit possible, on jugea qu'on y devoit procéder, de même qu'on l'avoit fait pour la Méridienne, en formant dans toute l'étendue du Royaume des triangles liés ensemble, par le moyen des objets vus successivement les uns des autres. Nul autre moyen n'y pouvoit satisfaire. On fait les erreurs auxquelles on est sujet lorsqu'on n'établit les positions des lieux que par estime; & les observations astronomiques les plus exactes ne donnent pas même une précision suffisante, lorsqu'il s'agit de déterminer par leur moyen la situation des lieux peu éloignés les uns des autres.

Il est vrai que cette entreprise paroissoit d'abord difficile à exécuter, car comment s'assurer qu'il se rencontrera toujours des objets assez bien exposés pour être apperçus par ceux que l'on vient de déterminer, & en

en même tems dans une situation convenable pour en découvrir de nouveaux, & aller en avant?

Plusieurs Provinces de la France sont remplies de forêts & parsemées de bois, & l'on sait que dans ce cas il est très difficile de discerner des objets qui soient dans les circonstances requises. Cependant il semble que rien ne doit paroître impossible à ceux qui sont chargés d'exécuter les ordres du Roi, lorsqu'ils savent que ce qu'ils entreprennent est agréable à Sa Majesté, comme Elle a bien voulu le témoigner en cette occasion. D'ailleurs, l'exemple de la Méridienne qui traverse plusieurs Provinces de la France, étoit un préjugé que s'il s'y rencontroit quelques difficultés, on trouveroit le moyen de les surmonter.

Comme l'étendue de la France, du Midi vers le Nord, avoit été déterminée géométriquement, on jugea qu'on devoit commencer par décrire de la même manière une Perpendiculaire à la Méridienne de Paris, qui traversât la France depuis l'Orient jusqu'à l'Occident.

Il ne faut pas confondre ici la Perpendiculaire à la Méridienne de Paris, avec le Parallèle de cette Ville. La Perpendiculaire à la Méridienne est un grand Cercle de la Sphère commensurable avec le Méridien, dont le centre est le même que celui de la Terre; elle diffère en cela du Parallèle qui est un petit Cercle, dont le centre est éloigné de celui de la Terre, & que l'on n'emploie point dans la Trigonométrie sphérique, avec
les

les autres grands Cercles de la Sphere.

Il paroissoit assez indifferent de commencer à prolonger cette Perpendiculaire vers le Levant du côté de l'Alsace, ou vers le Couchant qui se termine aux Côtes de la Normandie & de la Bretagne. Je préfèrai le dernier, parce que je ne pouvois arriver vers l'une des deux extrémités assez à tems pour y observer les Eclipses des Satellites de Jupiter, qui devoit être alors en conjonction avec le Soleil, & que l'on pouvoit y suppléer par celles qui y avoient été faites autrefois par M^{rs}. de l'Académie. Car il étoit de la dernière conséquence pour la Navigation, de savoir le rapport des degrés de longitude à ceux de latitude, & il n'y avoit point d'autre meilleur moyen de s'en assurer, que de comparer la difference en longitude qui résulte des observations astronomiques avec les mesures géométriques comprises dans le même intervalle. Nous nous reservons d'entrer dans un plus grand détail sur une matiere si importante, après avoir rendu compte au public des diverses opérations que nous avons faites pour prolonger la Perpendiculaire à la Méridienne de Paris.

Je partis pour ce voyage le premier Juin de cette année, avec M^{rs}. Maraldi, l'Abbé de la Grive, Chevalier, & mes Fils. Après avoir lié nos Triangles avec ceux de la Méridienne, nous fumes dès les commencemens obligés de nous écarter vers le Nord, à l'égard de la Perpendiculaire, à cause des bois qui environnent Versailles & Marly, entre lesquels passe cette ligne; & nous suivîmes
la

la Riviere de Seine, de part & d'autre, jusqu'aux environs de Meulan & de Mantes, où nous commençâmes à nous en rapprocher. Lorsque nous fumes à la distance de Paris de 20 mille toises, nous essayâmes d'y placer une marque fixe, suivant le projet qui avoit été formé d'élever des pyramides de 20 mille en 20 mille toises, dans les lieux qui ne seroient pas couverts de bois.

Nous déterminâmes pour cet effet les angles que le rayon visuel dirigé au point où devoit tomber la Perpendiculaire, devoit faire à l'égard de divers objets observés de deux endroits differens. On se partagea ensuite en différentes bandes; on fit d'abord placer un signal, suivant une des directions, & quand il fut fixé; on en plaça un second, suivant l'autre direction, ayant attention qu'il se trouvât en même tems dans la direction du premier signal, & du lieu où l'on avoit fait la premiere observation. Par ce moyen, le second signal s'est trouvé dans la direction commune, dont l'intersection a marqué le point précis de la Perpendiculaire, qui est à 20 mille toises de Paris.

Ce lieu se rencontre dans la Vallée de Montfort, près du Village d'Auteuil, un peu droite du chemin qui conduit de ce Village au Moulin nommé *de la Masse*; & nous mes construire une pyramide quarrée de pierre, dont la base est de 4 pieds, & la hauteur de huit.

Nous continuâmes ensuite de prolonger la Perpendiculaire jusqu'à la distance de 40 mille toises, & après avoir traversé les forêts de Dreux,

Dreux, d'Anet, & d'Ivry, nous nous trouvâmes près de Nonancourt, dans la plaine de St. André. C'est là où il nous réussit encore de placer une seconde pyramide par une méthode un peu différente de la première : car comme le point où tombe la Perpendiculaire peut se rencontrer dans un lieu bas ou éminent, la situation du terrain oblige de chercher les expédiens les plus convenables pour y réussir.

Ce lieu se trouve entre le Bourg d'Illiers & le Village de Grateuil, un peu sur la gauche du chemin qui conduit d'Illiers à ce Village. Nous donnâmes ordre d'y construire une pyramide de brique, à peu près de la même forme & de la même grandeur que la précédente.

De Nonancourt nous allâmes à Verneuil, dont nous déterminâmes la situation. Ce fut aux environs de cette Ville que nous nous trouvâmes environnés de bois qui bornoient l'horizon de tous les côtés. Vers le Nord étoient situées les forêts de Conches & de Breteuil, vers le Couchant les bois de Verneuil & de l'Aigle, & du côté du Midi la forêt de Senonches & de la Ferté-Vidame. On ne laissoit pas d'appercevoir au travers de ces bois quelques Clochers, où nous eûmes soin de nous transporter, & de nous élever le plus qu'il fut possible, pour examiner si l'on pourroit découvrir de là quelques autres objets convenables pour nous avancer vers l'Occident. Mais toutes nos recherches furent inutiles, & après y avoir employé plusieurs jours, nous nous trouvâmes obligés de
re-

retourner sur nos pas, pour chercher un pays moins couvert, & reprendre notre Perpendiculaire, après avoir fait le circuit de ces bois.

Nous avons déjà déterminé dans notre route, la position de la Cathédrale de Chartres, dont les Clochers sont très élevés, & se voient de tous les côtés; à une très grande distance; ainsi nous nous y transportâmes pour y lier la suite de nos Triangles, ce qui nous réussit parfaitement: car on apperçoit du haut de ces Clochers une infinité d'objets, entre lesquels on peut choisir ceux qui forment les plus beaux triangles. Nous poussâmes même de ce côté-là nos opérations jusqu'à Châteaudun, qui n'est éloigné que de dix petites lieues d'Orleans, un des points de la Méridienne de Paris, avec lequel on pourra le lier dans la suite, & comprendre par ce moyen une étendue considérable de terrain mesurée géométriquement.

De Chartres nous passâmes par le Perche, que nous traversâmes entièrement, après avoir déterminé toutes les Villes & principaux lieux de cette Province, & nous rejoignîmes notre Perpendiculaire vers Exmes & Argentan.

Ce fut aux environs de cette Ville, & de Exmes, qu'il se rencontra une nouvelle difficulté qui nous empêchoit de continuer nos opérations vers l'Occident.

Du côté du Couchant, & vers le Nord, étoit la forêt d'Argentan, au travers de laquelle on avoit découvert le Clocher d'Exmes, qui est sur un lieu éminent dans une fort belle situation. Il étoit nécessaire, pour continuer la suite de nos triangles, de décou-

couvrir de ce Clocher ceux de la Cathédrale de Seès, & réciproquement; mais il se rencontroit entre les deux une Montagne nommée *de Bonnevent*, couverte de bois, qui en empêchoit la vue, & il n'y avoit pas moyen de retourner en arriere, parce qu'il y avoit du Nord, vers le Midi, la forêt des *Ecouvés*, qui s'étend jusqu'au-delà d'Alençon.

Dans ces circonstances nous imaginâmes un expédient qui nous réussit parfaitement, & que je tâcherai d'expliquer ici en peu de mots, parce qu'il peut être très utile en pareilles occasions.

Après avoir été reconnoître la situation de la Montagne de Bonnevent, nous nous partageâmes en trois bandes. Les uns allèrent à Seès, & d'autres à Exmes, avec des instrumens. Pour moi, j'allai sur cette Montagne avec quelques-uns de nos Messieurs dans l'endroit que je jugeai à peu près dans la direction des Clochers de Seès & d'Exmes, & je fis monter quelques personnes sur le sommet des arbres les plus élevés qui étoient aux environs, d'où l'on découvroit de part & d'autre ces Clochers. Je fis d'abord élever au-dessus de l'un de ces arbres un signal qui consistoit en un drapeau blanc qui excédoit beaucoup le sommet, & j'avois prié ces Messieurs, qui étoient à Exmes & à Seès, de m'envoyer par un Courier la grandeur de l'Angle que ce signal faisoit avec Argentan, aussi-tôt qu'ils l'auroient apperçu. Cela fut exécuté ponctuellement; & comme la Montagne de Bonnevent étoit à peu près au milieu, entre Seès & Exmes, je reçus presque
en

En même tems les deux Couriers avec l'Angle qui avoit été observé de part & d'autre. ayant joint ces deux Angles avec celui qui avoit été observé d'Argentan entre Seès & Exmes, je trouvai que leur somme excédoit un peu 180 degrés, ce qui me fit conclure que ce signal n'étoit pas précisément dans la direction de ces Clochers. Je le fis donc anéantir & replacer au-dessus d'un autre arbre plus avant, & je reçus peu de tems après deux autres Couriers par lesquels on me marquoit la quantité des Angles qui avoient été observés par rapport à ce nouveau signal, & qui étoient au troisieme, approchoient encore plus près de 180 degrés. Par ce moyen je connus les Angles que les Clochers de Seès & Exmes auroient dû faire à l'égard d'Argentan, avec à peu près la même précision que les avoient été visibles les uns des autres; ce que j'ai eu occasion de vérifier par une autre méthode qu'il seroit trop long d'exposer ici, & qui me donna les mêmes Angles quelques secondes près.

Au sortir d'Argentan il ne se rencontra plus de pareilles difficultés, mais les objets nous manquèrent presque entierement, la plupart des Villes & des Paroisses de ces Pays-là étoient dans des lieux peu éminens, ou entierement couverts par des bois fort élevés qui y étoient en grande quantité.

Pour y suppléer, nous fîmes placer un grand nombre de signaux sur des bruyeres élevées, & qui étoient moins remplies de bois que le reste du Pays.

On fit faire ces signaux en différentes manières.

nieres, suivant la disposition du terrain où l'on se trouvoit; les uns avec des arbres, les autres avec des pyramides de pierre sèche, d'autres enfin par le moyen d'une butte de terre que l'on faisoit élever, non seulement pour être apperçue de loin, mais aussi pour y pouvoir observer, & se placer au-dessus des objets qui nous cachotent la vue des environs.

Dans la plupart de ces signaux on avoit le soin d'y élever des drapeaux blancs, parce qu'on les distinguoit avec évidence, lorsque la clarté du Soleil les éclairoit, pour quel effet on observoit le matin ceux qui étoient exposés vers l'Occident, & on attendoit le soir pour découvrir ceux qui étoient à l'Orient.

On en usa de même sur le toit de quelques Maisons, que l'on ne pouvoit pas découvrir à cause qu'elles étoient environnées d'arbres.

Enfin, on en dressa aussi sur le sommet des arbres les plus élevés, tels qu'à la Montagne des Houles pres de Vire & à celle de St. Clair de la Pommeraye, où il se rencontroit plusieurs arbres qu'on auroit confondus aisément avec celui au pied duquel on avoit fait des observations. C'est cette dernière Montagne que nous avons estimé être la plus élevée de toute la Normandie. On la découvroit de plus de 10 à 12 lieues à la ronde, & c'est un des points qui nous a servi à déterminer la position des Villes de Bayeux, de Caen, de la Tour de Dives, & de divers objets vers la Cote septentrionale de la Normandie.

Pour

Pour connoître en quelque manière son élévation au dessus de l'horizon de la Mer, nous y observâmes le 25 Septembre à midi la hauteur du Mercure dans le Barometre, que nous trouvâmes de 26 pouces 7 lign. $\frac{1}{2}$. Elle est dans sa moyenne hauteur au bord de la Mer de 28 pouces 0 ligne. La différence est de 16 lignes $\frac{1}{2}$, auxquelles il répond, suivant les expériences que l'on en a faites autrefois, environ 138 toises, qui est à peu près la hauteur que l'on peut attribuer à celle de cette Montagne sur le niveau de la Mer.

Pour revenir à nos opérations, on continua par le moyen des signaux placés de distance en distance, de former des Triangles jusques vers les bords de la Mer, où nous commençâmes à appercevoir divers objets bien exposés, tels que les Tours ou Clochers d'Avranches, du Mont St. Michel, de Coutances & de Granville.

C'est dans cette dernière Ville, qui est à peu près sous le même Parallele que Paris, qu'il falloit observer principalement la hauteur du Pole, afin d'examiner si la distance de la Perpendiculaire au Parallele de Paris étoit conforme à celle qui résultoit de nos opérations. C'est ce que nous eûmes le soin de faire par le moyen des observations des Astres, & sur-tout de l'Etoile Polaire, suivant laquelle la hauteur du Pole de Granville fut déterminée de $48^{\circ} 50' 9''$. La distance de cette Ville à la Perpendiculaire à la Méridienne de Paris, étoit, suivant nos opérations, de 3904 toises. Celle du Parallele de Paris à cette Perpendiculaire, calculée

Mém. 1733. Bb dans

dans l'hypothese de la Terre sphérique, devoit être de 3851 toises, dont retranchant 16 toises, à cause que Granville a été trouvé plus méridional que Paris d'une seconde de degré, reste 3835 toises pour la distance de Granville à la Perpendiculaire, plus petite que celle qui a été déterminée par les mesures géométriques de 69 toises, qui réduites, suivant la mesure des degrés de latitude, donnent quatre secondes. Ainsi, suivant les opérations géométriques, la hauteur du Pole de Granville devoit être de $48^{\text{d}} 50' 5''$, à quatre secondes près de celle que l'on avoit déterminée par les observations astronomiques, ce qui est une précision au-delà de tout ce qu'on peut espérer, & sert à confirmer la direction de la ligne que nous avons décrite.

Nous avons aussi comparé les observations astronomiques faites en 1681 par M^{rs}. Picard & de la Hire, au Mont St. Michel, avec la distance de cette Ville à la Perpendiculaire de Paris, que nous avons trouvée de 7704 toises. Suivant ces observations, la différence entre la hauteur du Pole du Mont St. Michel, & celle de Paris, étoit de $12' 20''$ ou $25''$. La supposant de $12' 20''$, & la réduisant en toises, on trouvera la différence entre le Parallele de ces deux Villes de 11739 toises vers le Midi, dont retranchant 3962 toises, distance entre la Perpendiculaire à la Méridienne, le Parallele de Paris, qui résulte de la différence des Méridiens entre Paris & le Mont St. Michel, déterminée par M. Picard de 4 degrés, reste 7777 toises pour la distance du Mont St. Michel à la Perpendiculaire, avec une différence seule-

seulement de 73 toises, ou de 5 secondes de degrés de celle que l'on avoit trouvée par les observations géométriques.

Après avoir vérifié, par les observations astronomiques, la direction de la Perpendiculaire, il étoit nécessaire de mesurer sur le terrain une base, & de la lier avec les derniers triangles, pour examiner si cette base calculée par une suite non interrompue de 44 triangles, depuis Paris jusqu'à la Mer, étoit conforme à la mesure actuelle.

Nous fîmes construire pour cet effet quatre Règles de bois, chacune de 24 piés de longueur, & de deux pouces d'épaisseur de tous les sens, serrées par les extrémités, qui se terminoient un peu en arc de cercle, afin que le contact fût plus immédiat, & nous les réduîmes à une juste mesure, par le moyen d'une Règle de fer, dont la longueur étoit actuellement de quatre piés, que nous avions apportée exprès de Paris, parce qu'on s'en étoit servi dans toutes les mesures actuelles.

Nous allâmes ensuite sur le bord de la Mer, aux environs de Granville, pour y chercher un terrain propre pour mesurer une base, que nous trouvâmes vers le Midi de cette Ville, entre le Cap de la Crête & celui du Bec St. Thomas.

Après nous être alignés, suivant la direction que nous jugeâmes la plus convenable, & y avoir placé des piquets de distance en distance, nous fîmes élever aux deux extrémités des signaux fixes; nous mesurâmes ensuite la distance entre ces signaux, en plaçant

d'abord un Cordeau de 100 toises suivant la direction requise, & posant successivement les quatre mesures au long de ce Cordeau, les unes après les autres. Par ce moyen, nous trouvâmes la longueur de cette base exactement de 3731 toises 3 pouces 7 lignes. Nous observâmes les angles que ces signaux faisoient avec Granville & divers autres objets, pour lier notre base avec la suite des triangles, & nous eûmes la satisfaction de voir que la base mesurée s'accordoit à celle qui avoit été calculée par deux suites de triangles différens, suivant la première, à une toise près, & suivant la seconde, à moins de deux piés; ce qui fait voir que les petites erreurs qui peuvent s'être glissées dans le grand nombre de triangles que l'on avoit employés, pour la description de la Perpendiculaire à la Méridienne de Paris, s'étoient compensées les unes les autres, & qu'ainsi l'étendue de cette ligne calculée depuis Paris jusqu'à Granville, qu'on a trouvée de 148463 toises, approche fort de sa juste mesure.

Cette base est dirigée à peu près du Midi vers le Nord, & traverse la Perpendiculaire. On apperçoit de ses extrémités beaucoup d'objets remarquables sur la Côte de Bretagne; ainsi elle sera d'une grande utilité pour la description exacte de cette Province, de même que de la Normandie.

Les Echevins de Granville se sont chargés de conserver les signaux que nous y avons placés; ils nous ont même priés de marquer sur cette base la longueur de la lieue marine de 20 au degré, qui est de 2853 toises, aux extré-

extrémités de laquelle ils ont fait élever des poteaux durables, pour en conserver la mémoire à la postérité.

Après avoir achevé nos opérations à Granville, il ne restoit plus qu'à déterminer la situation de St. Malo, où M. Picard avoit fait autrefois des observations des Satellites de Jupiter, pour en déterminer la longitude. On étoit proposé dans ce voyage cette recherche, pour savoir le rapport des degrés de longitude à ceux de latitude, en comparant la différence des Méridiens avec le nombre des toises mesurées géométriquement, & pouvoir par ce moyen déterminer la figure de la Terre.

On l'avoit cru jusqu'au siècle précédent de figure sphérique, & sur ce principe, connoissant la valeur des degrés de latitude, il étoit aisé de calculer quels devoient être ceux de longitude sous les divers Paralleles.

Ce sentiment a été révoqué en doute par les plus sçavans Géometres de notre tems. Les uns, comme M^{rs}. Huygens & Newton, ont jugé applati vers les Poles. D'autres, tels que M^{rs}. Burnet, Eifenschmid & de Clairan de cette Académie, l'ont cru allongée dans le même sens, telle qu'elle résulte des observations faites pour déterminer la Méridienne.

Il résulte cependant de ces deux sentimens, des différences bien considérables, puisque suivant les premiers, les degrés de longitude doivent être plus grands que dans l'hypothèse sphérique, & que supposant la Terre allongée vers les Poles, ils doivent être plus petits.

J'ai donné dans la suite des Mémoires de l'Académie de 1718 la méthode de calculer, suivant l'hypothèse elliptique, la valeur des degrés de longitude sous les différens Paralleles.

Suivant ces principes, supposant la Terre allongée vers les Poles, telle qu'elle résulte des observations de la Méridienne, la différence entre les degrés de longitude sur le Parallele de Paris, est plus petite de 380 toises que dans l'hypothèse sphérique.

Il s'agit donc, pour décider de quel sens la Terre est elliptique, de savoir si les mesures géométriques comparées aux astronomiques, donnent la grandeur du degré plus grande ou plus petite, que si on la supposoit sphérique; c'est ce que nous allons examiner.

En 1681, M. Picard observa à St. Malo une Immersion du premier Satellite dans l'ombre de Jupiter, dont la correspondance fut faite à Paris. Suivant cette observation la différence des Méridiens entre Paris & St. Malo, fut trouvée de 18' 10" d'heure, qui réduites en degrés font 4^d 32' 30".

Cependant M. Picard marque cette différence seulement de 4^d 30' 0" par des raisons qu'il n'a pas expliquées, peut-être parce qu'il n'a pas jugé que dans ces sortes d'observations on pût arriver à une précision de plus de 10 secondes d'heure. J'établirai donc cette différence de 4^d 30' 0", quoique la première détermination soit favorable à l'hypothèse de la Terre allongée vers les Poles. Suivant nos opérations géométriques, la distance du Méridien de Paris à celui de St. Ma-

a été trouvée sur le Parallele de cette Ville, de 165015 toises ; la divisant par $4^{\circ} 30'$, on aura la grandeur d'un degré de longitude sur le Parallele de St. Malo, de 36670 toises.

Calculant la grandeur de ce degré dans l'hypothese de la Terre sphérique, on le trouve de 37707 toises, plus grand de 1037 toises que celle que l'on vient de déterminer.

Ainsi, suivant ces observations, les degrés de longitude sont plus petits que dans l'hypothese sphérique, d'où il résulte que la Terre est allongée vers les Poles.

Il reste présentement à examiner si cette différence est réelle, ou si l'on peut l'attribuer au défaut d'observations, tant dans les opérations géométriques que dans les astronomiques.

À l'égard des mesures géométriques, la base que l'on a mesurée actuellement, & qui s'est trouvée conforme à celle qui résultoit de la suite des triangles, prouve assez qu'il n'y a pas eu d'erreurs sensibles, ou du moins qu'elles se sont compensées les unes les autres.

D'ailleurs, quand même on supposeroit une erreur de 150 toises sur toute la mesure, cela n'en produiroit qu'une d'une seconde d'heure dans la difference des Méridiens, & nous ne prétendons pas pouvoir jamais parvenir dans les observations astronomiques à une pareille précision.

À l'égard des Eclipses des Satellites de Jupiter, quoique d'habiles Astronomes, qui observent en même tems, s'accordent pour l'ordinaire à quelques secondes près, cependant

il y a des occasions, quoique rares, où ils peuvent être éloignés de 30 secondes.

Je suppose qu'il y ait eu cette différence, & qu'elle ait été contraire à ce qui doit résulter de la figure de la Terre allongée vers les Poles.

La retranchant de la différence des Méridiens qui a été observée entre Paris & St. Malo de $18^{\circ} 10''$, on aura $17^{\circ} 40''$, qui converties en degrés, font $4^{\text{d}} 25'$, ce qui, comparé à nos mesures, donne la grandeur du degré de 37363 toises, plus petite de 344 toises, que dans l'hypothèse sphérique: d'où il résulte que quand même on supposeroit une erreur dans les observations, plus grande qu'il ne s'en est peut-être jamais trouvé entre d'habiles Observateurs, cela n'empêcheroit pas de conclurre que la Terre doit être allongée vers les Poles.

Mais si on examine sans préjugé, les observations qui ont été faites à St. Malo, on fera bien éloigné d'y attribuer de pareilles erreurs. On en trouve une faite à peu près dans le même tems à Dunkerque, suivant laquelle cette Ville a été trouvée fort près du Méridien de Paris, ce qui a été confirmé en 1718, lorsqu'on a prolongé vers le Nord ce Méridien; qui se termine aux environs de cette Ville.

Il y en a eu d'autres faites par M. Picard à Montpellier & à Cette, qui ont été vérifiées par les observations de la Méridienne, prolongées vers le Midi.

Celle de St. Malo seroit elle la seule où il se seroit trouvé de si grandes erreurs?

Ainsi

Ainsi jusqu'à ce que les observations qui ont été faites dans cette Ville, ayent été vérifiées par d'autres faites avec exactitude, il semble qu'on ne peut prendre de meilleur parti que de les supposer exactes.

Suivant ces observations, la grandeur des degrés de longitude est plus petite de la 36^e partie que celle qui résulte de l'hypothèse sphérique; ce qui doit être d'une grande conséquence dans la Navigation, puisqu'un Vaisseau qui auroit fait le tour de la Terre, & dont la route auroit été estimée exactement, se trouveroit à son retour 10 degrés plus avancé qu'on ne l'auroit supposé, & ainsi à proportion dans les voyages de long cours, ce qui pourroit causer de fréquens naufrages, s'il n'y avoit pas d'autres moyens de se reconnoître: d'où l'on voit que cet ouvrage, dont l'utilité paroïssoit être renfermée dans l'intérieur de la France, doit avoir des avantages très considérables pour la Navigation, & peut en même tems éclaircir cette question si fameuse sur la Terre, qui a partagé jusqu'à présent les sentimens des plus habiles Géometres & Philosophes de notre tems.

C'est ce qu'on pourra décider encore avec plus d'exactitude lorsque l'on aura mesuré toute l'étendue de la France depuis l'Orient jusqu'à l'Occident, qui comprend plus de 12 degrés, & que l'on aura déterminé, par les observations des Eclipses des Satellites de Jupiter faites aux deux extrémités, la différence de longitude qui répond à la distance mesurée en toises.

On remarquera ici que l'on compte de St.

Malo à Paris 80 lieues par le plus court chemin; la distance entre ces deux Villes a été trouvée, par les opérations géométriques, de 164983 toises; ainsi ces lieues ne sont l'une portant l'autre que de 2063 toises.

On compte de même 68 lieues de Granville à Paris, dont la distance a été mesurée de 148515 toises, ce qui est à raison de 2187 toises par lieue, & est bien contraire au préjugé où l'on est sur les lieues de Normandie jusqu'aux confins de la Bretagne, dont on exagere si fort la longueur; ce qui vient apparemment des grands détours que l'on est obligé de faire pour chercher des routes praticables, joint à ce que les mauvais chemins paroissent toujours plus longs qu'ils ne le sont réellement.

Cette distance est beaucoup plus petite que celle qui est marquée dans les Cartes générales de France, & particulieres de la Normandie, qui passent pour les plus exactes. Ainsi la France se trouve encore rétrécie de ce côté-là, en-deçà des limites qu'on lui avoit assignées.

Après avoir terminé nos opérations à St. Malo, nous passâmes à notre retour à Granville & à Coutances, pour nous assurer de la position de divers objets remarquables sur la côte de Bretagne, tels que la Tour de Frehel qui est six lieues au-delà de St. Malo, à la distance de Paris de 175860 toises, éloignée de la Perpendiculaire à la Méridienne de Paris de 3274 toises vers le Midi, & c'est le terme le plus occidental de nos mesures.

Nous allâmes de là à Bayeux où nous fîmes diverses observations de hauteurs du Soleil,
d'E.

d'Etoiles fixes, & principalement de l'Etoile polaire, dans le Palais épiscopal qui joint à la Cathédrale, & où M. l'Evêque de Bayeux a fait tracer dans sa Bibliothèque une grande Méridienne, avec des lignes qui marquent les heures avant & après midi, de cinq en cinq minutes, par M. l'Abbé Outhier qui a travaillé avec nous à la description de la Perpendiculaire depuis Caen jusqu'à St. Malo.

Suivant ces observations, après avoir vérifié avec un grand soin notre Quart-de-cercle de 2 pieds & demi de rayon, nous avons déterminé la hauteur du Pole de cette Ville de $49^{\circ} 16' 12''$, plus grande que celle de Paris de $26' 2''$, qui réduites en toises font 24758 toises; y ajoutant 2338 toises, distance du Parallele de Paris à la Perpendiculaire, qui résulte de l'hypothèse de la Terre sphérique, on aura 27096 toises pour la distance de Bayeux à cette Perpendiculaire, éloignée de 256 toises ou 16 secondes de degré de celle que l'on avoit trouvée par les opérations géométriques de 27352 toises.

On a enfin observé sur la Tour de la Cathédrale de Bayeux, les angles entre divers objets aux environs, pour déterminer leur situation par rapport à ceux qui étoient déjà connus; & c'est en cette dernière Ville que se sont terminées nos opérations, par lesquelles nous avons déterminé géométriquement la position de près de 40 Villes, & d'un grand nombre de Bourgs, Villages, & autres objets remarquables, qui seront autant de points fixes pour la description que l'on doit faire dans la suite de tous les lieux de la

France, dans laquelle on entrera dans les détails nécessaires pour les divers projets que l'on voudra entreprendre dans la suite pour l'utilité du public.

DETERMINATION GEOMETRIQUE

DE LA PERPENDICULAIRE

A LA MERIDIENNE

TRACÉE PAR M. CASSINI;

*Avec plusieurs Méthodes d'en tirer la grandeur
& la figure de la Terre.*

Par M. CLAIRAUT. *

EN coupant la Terre par un plan perpendiculaire à sa surface, & en même tems à un Méridien dans un lieu donné, la section est ce que l'on appelle le premier vertical de ce lieu. Cette section, en supposant la Terre sphérique, est un grand cercle, & la supposant sphéroïde est une ovale dont le grand ou le petit axe est enfermé dans le Méridien selon que le Sphéroïde est allongé ou raccourci.

Quelque hypothèse que l'on prenne sur la figure de la Terre, si sa surface étoit parfaitement unie, pour tracer cette ligne, il suffiroit de planter continuellement des piquets, en sorte qu'ils fussent tous effacés les uns par les autres, pourvu que l'on eût mis les deux premiers dans le plan du premier vertical. Mais les inégalités du terrain ne permettant

pas

pas ces opérations, si, pour prolonger la perpendiculaire dont on a déjà un petit côté, on prend des points hors de cette ligne auxquels on rapporte, par des opérations trigonométriques, le prolongement de la perpendiculaire, ces opérations qu'on croiroit revenir au même que celle des piquets, & conserver la ligne dans le plan du vertical, la détournent cependant continuellement de ce plan; c'est ce que je prétends démontrer dans ce Mémoire, en faisant voir que ce n'est que dans l'hypothèse de la Terre sphérique, que la ligne ainsi tracée est toujours dans le même plan, & que dans toutes les autres c'est une courbe à double courbure, dont je donnerai la nature & les propriétés, avec une manière fort simple d'en déduire si la Terre est allongée ou raccourcie, & dans quelle raison, en supposant que la Terre soit de nature elliptique.

Pour cela, soit AB , un côté quelconque du vertical qu'on peut regarder comme infiniment petit par rapport à son diamètre, BC le prolongement de ce côté qui n'est pas sur la Terre, à cause de sa courbure; soit de plus imaginé que BD soit le second côté du vertical sur la Terre, & par conséquent BCD le plan du vertical qui sera perpendiculaire à la Terre, si elle est supposée sphérique, parce qu'il la coupe



perpendiculairement en tous ses points, mais si elle ne l'est pas, il fera un angle oblique avec elle. Soit encore BF une droite prise sur la Terre qui fasse un angle donné avec AB , & qui soit de longueur donnée.


Pour continuer le vertical, on imagine la perpendiculaire FD à sa direction BD qui fait le second côté du vertical, on regarde ABD comme une ligne droite, & on prend l'angle FBD pour le complément de l'angle ABF , & connoissant dans le triangle rectangle BFD , l'angle B , supposé complément de ABF & le côté BF , on a facilement BD .

Mais il est aisé de voir que l'angle DBF diffère de l'angle CBF d'un angle infiniment petit du premier ordre, car menant la petite droite CD perpendiculaire à BD , tirant FC , cette droite différera de FD d'un infiniment petit du premier ordre par rapport à elle, & BC ne différera de BD que d'un infiniment petit du second, en sorte que les angles CBF & DBF seront les sommets de deux triangles CBF , DBF , dont les deux côtés BF , BC , BF , BD , sont les mêmes, & les bases différent d'un infiniment petit du premier ordre; par conséquent ces angles diffèrent l'un de l'autre d'un infiniment petit du premier ordre, & ainsi le calcul du côté BD donne une erreur d'un infiniment petit du premier ordre, laquelle étant répétée à chaque fois qu'on mesure une partie du vertical, donnera à la fin une erreur finie. Donc la ligne que l'on trace ainsi n'est point un vertical.

Mais si la Terre étoit sphérique, le plan du vertical GBD seroit perpendiculaire à sa

su.

superficie, par conséquent CD seroit perpendiculaire en même tems à BD & à FD ; d'où les deux triangles BCF, BDF ,



ne differeroient l'un de l'autre que d'un infiniment petit du second ordre par rapport à eux, & ainsi l'angle DBF pourroit être pris sans erreur pour l'angle CBF , car n'en differant que d'un infiniment petit du second ordre, l'opération répétée une infinité de fois ne détournera que d'un infiniment petit du premier, qu'on peut négliger à une distance finie. Ainsi sur la Terre sphérique la ligne ainsi tracée est un vertical.

Quelle que soit donc la figure de la Terre, la ligne que l'on trace de cette façon est celle dont le second côté BD fait avec le prolongement BC du premier AB , ou avec le premier même, un plan perpendiculaire à la surface de la Terre, c'est-à-dire, celle dont les angles de contingence sont toujours des moindres, ou, ce qui revient au même, celle qui s'écarte le moins qu'il est possible, de conserver la même direction.

Elle a aussi cette propriété d'être la plus courté entre tous ses points; car il est clair qu'entre les points A & D , le plus petit chemin qu'on puisse trouver est celui qui donne l'angle ABD le plus grand; or pour trouver cet angle le plus grand, il faut que son plan


plan ABD , qui est le même que BCD , soit perpendiculaire à la Terre.

J'ai déjà donné à la Compagnie une Solution du Problème où il s'agit de trouver les Lignes les plus courtes sur toutes sortes de surfaces, ainsi je pourrois m'en servir ici pour trouver la Ligne de M. Cassini: mais à cause de la simplicité qui vient de ce que l'on suppose que la Terre soit un Sphéroïde, j'en donnerai la Solution suivante.

P R O B L E M E.

Un Sphéroïde quelconque étant donné, trouver sur sa surface les Courbes qui ont la propriété d'être le chemin le plus court entre deux de leurs points quelconques?

Soit $PA\mu$ une partie de la surface de ce Sphéroïde, P le pole, AP le Méridien d'où l'on est parti, AM la ligne tracée, ou la ligne la plus courte entre tous ses points, M , m , μ , trois points de cette courbe infiniment près l'un de l'autre.



Par sa propriété, il faudra que le chemin $Mm\mu$ soit le plus court entre les deux points M , μ . Je suppose que les deux points M & μ soient fixes, & que le point m varie seulement sur la tranche ou parallèle mr , il faut

aut que $Mm + m\mu$ soit un moindre.

Soit $PM = s$, $Rm = ds$, $\mu r = ds'$, l'ordonnée du Méridien au point $M = y$, au point $m = y'$, l'angle entre les Méridiens PM & Pm , ou différence de la longitude $= dx$, pour le rayon 1) entre Pm & $P\mu = dx'$; donc $MK = y dx$, & $m\mu = y' dx'$.

On aura donc $Mm + m\mu = \sqrt{(yy dx^2 + ds^2)} + \sqrt{(y'y dx'^2 + ds'^2)}$, dont il faut prendre la différence, & l'égaliser à zero.

Mais il faut observer que dx est la seule

variable, on aura ainsi $\frac{yy dx dx}{\sqrt{(yy dx^2 + ds^2)}}$

$= - \frac{y'y dx' dd x'}{\sqrt{(y'y dx'^2 + ds'^2)}}$, ou, à cause que

$dx + dx'$ fait une somme constante, & que

par conséquent $dd x = - dd x'$, $\frac{yy dx}{\sqrt{(yy dx^2 + ds^2)}}$

$= \frac{y'y dx'}{\sqrt{(y'y dx'^2 + ds'^2)}}$. Donc la quantité

$\frac{yy dx}{\sqrt{(yy dx^2 + ds^2)}}$ est constante dans la cour-

be, je la fais $= a$, & l'équation générale de

toutes les lignes les plus courtes sur les Sphé-

roïdes, devient de cette manière $\frac{y dx}{\sqrt{(yy dx^2 + ds^2)}}$

$= \frac{a}{y}$, ou $\frac{MR}{Mm} = \frac{a}{y}$, qui donne cette

propriété à la courbe que les sinus des angles

MP qu'elle fait avec les Méridiens sont

toujours en raison renversée des ordonnées

de ces Méridiens au point de rencontre M ,
car

car $\frac{MR}{Mm}$ est le sinus de l'angle $M_m P = AMP$.

Si le Sphéroïde est supposé une Sphere, la courbe AM devient un grand cercle, APM un triangle sphérique, & la propriété que l'on vient de remarquer n'est alors autre chose que celle que tout le monde connoit aux triangles sphériques, à savoir, que les sinus des angles sont en raison renversée des sinus des côtés opposés, car les ordonnées aux points A & M sont dans ce cas les sinus des côtés AP & AM .

Pour déterminer la constante a dans l'équation précédente à être telle que la courbe passe par le point A dont la latitude est donnée, & fasse un angle donné PAM avec le Méridien, il faut qu'en substituant dans la valeur $\frac{a}{y}$ du sinus de l'angle $M_m P$ pour y sa valeur au point A , cette quantité $\frac{a}{y}$ devienne le sinus de l'angle PAM .

Si l'on veut, par exemple, que cette ligne AM coupe le Méridien AP à angles droits comme la ligne de M. Cassini, il faut que faisant $y =$ à l'ordonnée du point A , $\frac{a}{y}$ devienne $= 1$, c'est-à-dire, qu'il faut que a soit l'ordonnée du point A .

On tire de la propriété de ces courbes une manière bien simple de connoître, lorsque l'on en a une tracée sur la Terre, laquelle des deux hypothèses de l'allongement ou du raccourcissement est la vraie; car soit

PAM

PAM un Méridien, P le pole, PQR l'axe, A le premier point de la ligne (qui est Paris dans celle de M. Cassini), M un point de ce Méridien qui a la même latitude qu'un point pris à volonté sur la

ligne tracée, $\frac{AQ}{MR}$ marque-

ra le sinus de l'angle que cette ligne fait avec le Méridien qu'elle rencontre au point qui a la latitude de M . Or ce rapport


fera plus grand dans la Sphere que dans un Sphéroïde allongé, & plus petit que dans un Sphéroïde accourci.

Pour le démontrer, soit $pAmb$ une Sphere inscrite au Sphéroïde allongé $PAMB$, ayant une tangente commune en A , & pour diamètre pb , il est clair que l'ordonnée mr du point m de ce cercle qui a la même latitude que le point M , sera plus petite que MR , par conséquent

$\frac{AQ}{RM} < \frac{AQ}{mr}$, & au contraire, si le

Sphéroïde PAM étoit applati.

Supposons donc présentement qu'on soit avancé à une certaine distance sur la ligne de M. Cassini, & qu'on y ait observé la latitude; en regardant la Terre comme sphérique, il sera aisé par la résolution d'un triangle sphérique d'avoir l'angle que la ligne tracée fait avec la Méridienne, & alors si la valeur



leur qu'on aura trouvée pour cet angle se trouve plus grande que celle que l'on trouve par l'observation (ce qui ne doit pas être difficile à observer) le Sphéroïde est oblong, & au contraire.

Pour faire quelque application du Problème précédent à un Exemple, je vais supposer la Terre un Ellipsoïde, soit allongé, soit raccourci, & je tirerai de la simplicité des calculs que cela donne, une Méthode fort facile d'avoir le rapport des axes de la Terre.

Soit donc $PAMB$ une Ellipse, PB un des axes, C le centre, A le premier point de la ligne tracée, M celui qui a la latitude où l'on s'est arrêté, appellant MR , y , comme dans le Problème précédent, & de plus CR , z ; l'axe PB ,

& l'autre axe $\frac{1}{m}$, l'équation de cette Ellipse sera $1 - zz = mmyy$, d'où tirant la valeur de z , & la substituant dans l'équation

$$\text{générale } \frac{y dx}{\sqrt{yy dx^2 + dy + dz^2}} \\ = \frac{a}{y} \text{ ou } dx = \frac{a \sqrt{(dy^2 + dz^2)}}{y \sqrt{(yy - aa)}} ,$$

on aura $dx = \frac{a dy \sqrt{(m^4 - m^2) yy - 1}}{y \sqrt{(yy - aa)} \sqrt{(1 - mmyy)}}$ de laquelle il faut chasser a & y , qui sont deux ordonnées du Méridien que l'on ne connoit pas.



pas. Pour cela, soit nommé t la tangente $\frac{TR}{MR}$ de l'angle TMR , complément de la latitude qui doit être donnée, TR soutangente de l'Ellipse étant par sa propriété $\frac{1-zz}{z}$,

& MR , $y = \frac{1}{m} \sqrt{(1-zz)}$, on aura

$t = \frac{TR}{MR} = \frac{m \sqrt{(1-zz)}}{z}$, d'où l'on tire l'équation $mm - mmzz = zztt$ qui donne

$z = \frac{m}{\sqrt{(tt+mm)}}$, & par conséquent

$y = \frac{1}{m \sqrt{(tt+mm)}}$.

En appelant p la tangente de l'angle tAQ , complément de la latitude de A , on aura de la même manière $a = \frac{p}{m \sqrt{(pp+mm)}}$.

La substitution des valeurs de a & de y dans l'équation $dx = \frac{ady \sqrt{(m^4 - mm)yy + 1}}{y \sqrt{(yy - aa) \sqrt{(1 - mm yy)}}$

donnera en réduisant $\frac{p m dt \sqrt{(1 + tt)}}{t \sqrt{(tt + mm) \sqrt{(1 - pp)}}$

$= dx$, qui exprime la relation entre la latitude & la longitude de tous les points de la ligne tracée.

On tire de cette équation une autre manière de connoître si la Terre est allongée ou raccourcie: car si m est > 1 , p , t , & dt restant les mêmes, le 1^{er} membre de l'équation devient plus grand lorsque $m=1$, & plus petit lorsque m est < 1 : or dx étant la différence de la longitude, on tire de-là ce Théorème, que la longitude d'un lieu quelconque placé sur la ligne de Mr. Cassini, est plus grande sur un Sphéroïde allongé que sur une Sphère.

Sphère, supposant que la latitude soit la même. Ainsi on n'a donc qu'à prendre un lieu sur cette ligne dont on connoisse la latitude, & en calculer la longitude, en supposant que la Terre soit sphérique, ce qui se peut aisément par la résolution d'un triangle sphérique; & si celle qu'on trouve par observation est plus grande, le Sphéroïde est allongé, & au contraire.

Voilà donc deux manières de connoître laquelle des deux hypothèses est la vraie: on peut de plus, par le calcul précédent, trouver le rapport des axes de la Terre, & même d'une façon fort simple. Pour cela supposons qu'on ait pris par observation la valeur du sinus de l'angle que fait la Perpendiculaire à la Méridienne de Paris avec un Méridien quelconque, je nomme cette valeur r . Comme d'un autre côté elle est $\frac{a}{y}$ ou $\frac{p\sqrt{(11+mm)}}{t\sqrt{(pp+mm)}}$ dans laquelle p & t sont des quantités données, on aura l'équation $\frac{p\sqrt{(11+mm)}}{t\sqrt{(pp+mm)}} = r$, d'où

l'on tire le rapport des axes $m = \frac{11\sqrt{(1-rr)}}{\sqrt{(rr11-pp)}}$.

Les deux moyens précédens de connoître la figure de la Terre, viennent de la comparaison de la latitude avec la longitude, & avec le sinus de l'inclinaison de la ligne avec le Méridien. On peut trouver d'autres manières de connoître la figure de la Terre, en se servant toujours de la ligne de Mr. Cassini; il ne faut pour cela que comparer les angles compris entre cette ligne & les différens Méridiens avec la longitude, ou bien com-
parer

parer la longitude avec les arcs de la ligne mesurés en toises.

Je commencerai par la première de ces méthodes qui est de chercher la relation entre le sinus de l'angle * AMP , & la longitude ou l'angle APM .

Soit appelé u ce sinus, qui est, comme nous l'avons vu ci-dessus $\frac{a}{y}$, la valeur de

x qui est $\frac{ady\sqrt{[(m^4-mm)yy+1]}}{y\sqrt{(yy-aa)}\sqrt{(1-mm yy)}}$ se chan-

gera en $-\frac{du\sqrt{[(m^4-mm)aa+uu]}}{\sqrt{(1-uu)}\sqrt{(uu-mm aa)}}$, de laquelle on chassera a qui est l'ordonnée AQ inconnue au point A , en mettant à sa place

la valeur $\frac{p}{m\sqrt{(pp+mm)}}$, & alors on aura

$x = -\frac{du}{\sqrt{(1-uu)}}\sqrt{(1+\frac{mmpp}{uu pp+uumm-pp})}$.

Dans la Sphere, m étant $=1$, cette valeur se réduira à $dx = -\frac{du}{\sqrt{(1-uu)}}(1+\frac{pp}{uu pp+uumm-pp})$.

Pour comparer ces deux valeurs, & en tirer quelque Théorème dont l'énoncé soit simple, comme il est arrivé pour les deux méthodes précédentes, je divise l'une & l'autre

de ces deux valeurs par $-\frac{du}{\sqrt{(1-uu)}}$, je les

élève au carré, & je retranche l'unité de chacune

d'elles, j'ai alors $\frac{mmpp}{uu pp+uumm-pp}$


&

* Voyez la seconde Figure.

& $\frac{pp}{uu pp + uu - pp}$: c'est la même chose de comparer ces deux quantités, ou bien de les renverser ainsi $\frac{uu pp + uu - pp}{pp}$ & $\frac{uu pp + uu mm - pp}{mm pp}$.

Si la première de ces quatre quantités est plus grande que la seconde, la troisième sera plus grande que la quatrième, & réciproquement. Je réduis ces quantités ainsi $uu - 1 + \frac{uu}{pp}$, & $\frac{uu - 1}{mm} + \frac{uu}{pp}$, dans lesquelles il est bien visible que la première est plus grande que la seconde lorsque $m > 1$, & plus petite lorsque $m < 1$. Donc la différence de la longitude est plus grande dans le Sphéroïde allongé que dans la Sphere, par rapport à la même inclinaison de la ligne avec le Méridien, & au contraire.

Si l'on fait attention présentement à ce que la valeur de dx en u est négative, on verra que lorsque u augmente, la longitude diminue. Pour aider l'imagination, soit pris la figure OA qui représente la courbe dont l'abscisse RS est u , & SO la longitude dans le Sphéroïde allongé qui devient zero au




point A où u devient égal à l'unité: soit pris de même la courbe OA dont les ordonnées SO soient les longitudes dans la Sphere qui deviennent aussi nulles lorsque $RS = 1$. Il sera aisé alors de voir que puisque la différen-

de SO . qui marque le décroissement de la longitude, est plus grande dans le Sphéroïde allongé que dans la Sphere, il s'ensuit que la longitude elle-même est aussi plus grande dans le Sphéroïde allongé que dans la Sphere, au contraire. Ce Théorème peut s'énoncer aussi de cette façon. Pour une même longitude l'inclinaison de la ligne est plus grande dans le Sphéroïde que dans la Sphere, qui donne encore une maniere fort facile de connoître la figure de la Terre.

Pour comparer la longitude avec les arcs de la ligne, on ne sauroit employer la même méthode que dans les solutions précédentes, c'est-à-dire, avoir une équation qui exprime la relation entre la longitude & les arcs: car il faudroit pour cela intégrer $\frac{y dy \sqrt{(m^2 - mm)yy + 1}}{\sqrt{(yy - aa)} \sqrt{(1 - mm yy)}}$, ou $\sqrt{(yy dx^2 - dy^2 + dz^2)} = \frac{y dy \sqrt{(m^2 - mm)yy + 1}}{\sqrt{(yy - aa)} \sqrt{(1 - mm yy)}}$ en tirer x , ou l'arc en y , & de-là une équation entre x & l'arc, ce qui est impraticable. On peut cependant trouver un Théorème bien simple sur cette relation des arcs & des longitudes: pour cela, je reprends la valeur générale de la quantité $\sqrt{(yy dx^2 - dy^2 - dz^2)} = \frac{yy dx}{a}$, & je la compare avec $\frac{r dx}{A}$ que je suppose être la quantité de la même espece dans la Sphere, c'est-à-dire, la différence de l'arc de la ligne dans la Sphere pour la même longitude x , & je parviens à démontrer que la première est plus petite que la seconde, lorsque le Sphéroïde est allongé, & au contraire.

Pour le voir, il faut savoir premierement à quelle Sphere on rapporte la quantité $\frac{rrdx}{A}$: ce ne doit pas être comme dans les Solutions précédentes, à celle dont le rayon est l'unité, car on ne fait ce que c'est que cette unité en toises. Dans les méthodes précédentes, le rayon de la Sphere n'étoit de nulle considération, parce qu'il ne s'agissoit que d'angles qui sont les mêmes dans des figures semblables; mais pour le cas présent, il faut faire attention au rayon de la Sphere; nous prendrons pour ce rayon celui de la développée du Sphéroïde au point A qui est aisé à connoître par pratique.

Soit donc à présent PAM le Méridien du Sphéroïde allongé, A le point où a commencé la ligne qui est prise dans celle de M. Cassini. Soit pAm la



Sphere dont le rayon AO , ou PO , est celui de la développée au point A , AF sera A , & AQ , & reprenant les quantités $\frac{yydx}{A}$ & $\frac{rrdx}{A}$ que j'écris ainsi $\frac{ydx}{aa}$ & $\frac{Adx}{AA}$, $\frac{ydx}{*}$ & $\frac{Adx}{U}$,

par le Théorème précédent $* > U$, & par

Fin

Inspection de la figure, a est $< A$. Donc la quantité $\frac{a dx}{u}$ est $< \frac{A dx}{U}$. Donc l'arc de la ligne dans le Sphéroïde allongé est plus petit que dans la Sphere à la même longitude, & contraire pour le Sphéroïde applati; ce qui est un quatrième moyen de connoître la figure de la Terre, qui a cet avantage sur les autres, que les quantités dont on a besoin, à savoir la longitude d'un lieu pris sur la ligne, & la longueur en toises de l'arc décrit sur la Terre, sont des quantités dont la mesure est moins sujette à erreur par les observations; car celles que l'on peut commettre, par les écarts de la ligne sont plus de conséquence pour les cas d'inclinaison, ou pour les latitudes, que pour les longitudes, ou pour les parties de la ligne à mesurer, principalement dans une petite distance comme celle de St. Malo à Paris.

အသံ၊ အရသာ၊ အနံ့၊ အတွေ့အကြုံများကို ဖော်ပြနိုင်စွမ်း

OBSERVATIONS DU THERMOMETRE
 faites par M. COSSIGNY, Correspondant
 de l'Académie, à l'Isle de Bourbon, à l'Isle
 de France, à Madagascar, &c. dans la route
 depuis l'Orient jusqu'à ces Isles, pendant l'an-
 née 1732, & partie de l'année 1733. Com-
 parées avec les Observations du Thermometre
 faites à Paris pendant le même tems.

Par M. DE REAUMUR.

ORSQUE j'ai cherché à construire des Thermomètres dont les degrés fussent comparables, des Thermomètres qui, exposés au même air, marquassent par le même

nombre de degrés l'état du chaud & du froid de cet air, une des choses qui me paroïssoit en devoir faire souhaiter le plus de tels, c'étoit de pouvoir comparer la chaleur des pays que nous nommons chauds, & le froid des pays que nous appellons froids, avec le froid & le chaud des climats que nous habitons, & que nous regardons comme tempérés. Il est assurément curieux de savoir à quelle chaleur s'exposent ceux que des voyages de long cours conduisent dans ces pays qui semblent devoir être brûlés par les rayons du soleil qui y tombent à plomb. Il y a pourtant longtems que l'on fait que la Zone Torride n'est pas inhabitable, comme l'avoient cru les Anciens, qu'elle est habitée; mais on n'a aucune idée de la chaleur qu'on a à y souffrir; on la croit sans doute considérablement plus grande que celle que nous sommes exposés à ressentir à Paris. Nous allons cependant rapporter des observations faites avec beaucoup d'exactitude dans divers pays situés entre les Tropiques & sous la Ligne même, qui apprendront que dans quatorze mois consécutifs, il n'y a eu dans ces pays aucun jour aussi chaud que ceux que nous avons à Paris dans certains Etés.

M. Cossigny Chevalier de St. Louis, & ci-devant Ingénieur en chef de Sa Majesté dans le Roussillon, voulut bien accepter la qualité d'Ingénieur-général de la Compagnie des Indes, dans un tems où le Royaume jouissoit d'une profonde paix, & s'engager à aller visiter les établissemens de cette Compagnie, pour les faire mettre dans un état convenable de défense. L'envie qu'il avoit
de

E T A B L E.

DEC 17	Longitude.	Latitude Nord.	Therm.
	D. M.	D. M.	Degrés.
	13. . . .	47. 36.	8. au dessus de la congé- lation ar- tificielle.
JAN 173	11. 27.	46. 42.	
	8. 53.	45. 30.	9.
	5. 33.	43. 11.	8. $\frac{1}{2}$
	3. 52.	E. 41. 14.	10.
	3. 1.	E. 38. 40.	10. $\frac{2}{3}$
	2. 21.	S. 36. 35.	11. $\frac{1}{4}$
	1. 57.	S. 34. 53.	12. $\frac{2}{3}$
	1. 9.	E. 33. 10.	14.
	0. 26.	E. 32. 34.	15. $\frac{1}{2}$
	1. 28.	E. 33. 0.	16.
	2. 45.	E. 32. 30.	15. $\frac{2}{3}$
	2. 57.	F. 32. 20.	17.
	3. 9.	E. 32. 15.	17. $\frac{1}{2}$
	2. 20.	E. 32. 19.	17. $\frac{1}{3}$
	1. 34.	S. 30. 45.	15. $\frac{1}{2}$
	1. 34.	E. 30. 10.	15. $\frac{2}{3}$
	2. 22.	E. 30. 0.	16.
	2. 29.	E. 30. 0.	18.
	2. 36.	E. 29. 50.	Idem.
	2. 22.	S. 29. 25.	Id.
	1. 43.	S. 28. 26.	Id.
	1. 16.	S. 28. 22.	16. $\frac{1}{3}$
	2. 20.	E. 27. 30.	17. $\frac{1}{2}$
	0. 17.	E. 26. 25.	18. $\frac{2}{3}$
	0. 2.	S. 24. 9.	Id.
	358. 54.	S. 22. 15.	17. $\frac{3}{4}$
	357. 48.	S. 20. 17.	17.
	357. 4.	S. 18. 22.	18.
	356. 33.	S. 16. 54.	18. $\frac{1}{2}$
	355. 21.	S. 15. 32.	19.
	353. 48.	S. 15. 23.	19. $\frac{1}{2}$



FEVRIER.

Latitude Nord.		Therm.
<i>D. M.</i>		<i>Degrés.</i>
	15. 32.	20. $\frac{1}{4}$
	15. 20.	20. $\frac{2}{3}$
		20.
		<i>Idem.</i>
		<i>Id.</i>
		20. $\frac{2}{3}$
		20.
	14. 23.	21. $\frac{2}{3}$
	12. 18.	22. $\frac{1}{4}$
I	10. 38.	23.
1	9. 33.	23. $\frac{1}{4}$
1.	8. 28.	23. $\frac{1}{2}$
1.	7. 29.	23. $\frac{1}{2}$
I	7. 0.	24.
1	6. 4.	23. $\frac{1}{2}$
1	5. 30.	24. $\frac{1}{3}$
1.	4. 46.	25. $\frac{1}{2}$
1.	4. 9.	26.
1	3. 35.	25. $\frac{1}{4}$
2	3. 44.	25.
2	3. 10.	25. $\frac{1}{2}$
2	2. 37.	25. $\frac{2}{3}$
2	2. 9.	<i>Id.</i>
2	1. 11.	<i>Id.</i>
2	0. 19.	<i>Id.</i>
Latitude Sud.		
	0. 29.	26.
	1. 11.	<i>Id.</i>
	2. 24.	25. $\frac{1}{2}$
	3. 35.	25. $\frac{3}{4}$

MARS.

	Longitude.		Latitude Sud.		Therm.
	D. M.		D. M.		Degrés.
MA	1. 27.	E.	4. 21.		25. $\frac{1}{2}$
	1. 1.	E.	5. 28.		25. $\frac{2}{3}$
	2. 43.	E.	6. 10.		25. $\frac{2}{3}$
	2. 27.	E.	6. 30.		26.
	2. 8.	E.	7. 19.		25. $\frac{1}{3}$
	2. 4.	E.	7. 56.		25.
	9. 19.	E.	9. 26.		25. $\frac{1}{5}$
	9. 36.	S.	10. 28.		Id.
	4. 0.	S.	12. 4.		Id.
	8. 19.	S.	13. 42.		25.
	7. 48.	S.	15. 32.		Id.
	7. 19.	S.	16. 50.		24. $\frac{2}{3}$
	7. 3.	S.	18. 21.		24. $\frac{1}{2}$
	7. 6.	E.	19. 33.		Id.
	7. 26.	S.	20. 52.		24. $\frac{1}{2}$
	7. 42.	S.	22. 14.		24. $\frac{1}{3}$
	8. 36.	E.	23. 0.		Id.
	9. 1.	S.	24. 6.		Id.
	9. 43.	S.	25. 28.		Id.
	1. 6.	S.	26. 50.		24. $\frac{1}{4}$
	2. 54.	E.	28. 8.		24.
	4. 21.	S.	28. 59.		23. $\frac{2}{3}$
	6. 24.	E.	29. 56.		23.
	7. 53.	E.	30. 41.		22. $\frac{3}{4}$
	8. 51.	E.	31. 7.		22. $\frac{2}{3}$
	10. 59.	E.	31. 17.		22. $\frac{1}{3}$
	1. 49.	E.	31. 31.		22.
	2. 45.	E.	31. 56.		21.
	4. 57.	S.	32. 10.		20. $\frac{1}{4}$
	6. 21.	E.	32. 55.		20.
	7. 45.	S.	33. 9.		20. $\frac{1}{2}$

	Latitude Sud.		Therm.
	<i>D.</i>	<i>M.</i>	<i>Degrés.</i>
AVRIL...	S.	33. 40.	20. $\frac{1}{4}$
	S.	33. 54.	19. $\frac{1}{4}$
	E.	34. 5.	19.
	E.	34. 40.	18. $\frac{1}{4}$
	S.	35. 45.	17. $\frac{1}{4}$
	E.	35. 53.	18. $\frac{1}{3}$
	S.	35. 30.	16. $\frac{1}{3}$
	S.	34. 28.	15. $\frac{1}{2}$
	S.	34. 40.	15. $\frac{1}{4}$
	E.	34. 47.	15.
	S.	35. 0.	16.
	S.	35. 15.	17.
	S.	35. 23.	17. $\frac{1}{3}$
	S.	35. 54.	18.
	S.	35. 35.	<i>Idem.</i>
	S.	35. 39.	<i>Id.</i>
	E.	35. 51.	17. $\frac{3}{4}$
	S.	36. 0.	14. $\frac{1}{4}$
	S.	35. 38.	14.
	S.	35. 50.	<i>Id.</i>
	E.	35. 58.	15. $\frac{2}{3}$
	E.	35. 56.	17.
	S.	36. 30.	16. $\frac{1}{2}$
	S.	37. 35.	17.
	S.	37. 0.	16. $\frac{1}{4}$
	S.	36. 57.	16. $\frac{2}{3}$
	S.	37. 2.	16.
	E.	36. 46.	15.
	S.	36. 59.	16. $\frac{2}{3}$
	S.	37. 31.	17.

Longitude.		Latitude Sud.		Therm.
D. M.		D. M.		Degrés.
56.	5.	E.	38. 10.	
58.	54.	E.	38. 15.	13. $\frac{5}{3}$
61.	11.	S.	37. 47.	12. $\frac{1}{2} \frac{1}{4}$
62.	35.	S.	37. 35.	14. $\frac{1}{4}$
65.	8.	S.	36. 53.	14.
67.	17.	E.	36. 35.	<i>Idem.</i>
68.	23.	S.	35. 39.	14. $\frac{3}{4}$
69.	39.	E.	34. 32.	15.
69.	47.	E.	35. . .	14. $\frac{1}{2}$
70.	16.	E.	35. 56.	15.
71.	19.	S.	36. 40.	16. $\frac{1}{2} \frac{3}{4}$
72.	20.	E.	37. 12.	16.
73.	46.	S.	37. 27.	17.
75.	44.	S.	37. 7.	17. $\frac{1}{2} \frac{2}{3}$
77.	25.	E.	36. 40.	17. $\frac{1}{3}$
79.	5.	E.	36. 3.	<i>Id.</i>
79.	45.	S.	34. 20.	15. $\frac{1}{2}$
80.	26.	S.	33. 15.	<i>Id.</i>
81.	46.	S.	32. 59.	16. $\frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{3}{4}$
83.	0.	E.	32. 33.	18. $\frac{1}{4} \frac{3}{4}$
82.	56.	S.	30. 50.	15.
82.	56.	S.	28. 26.	17. $\frac{1}{3} \frac{1}{2}$
82.	39.	S.	26. 20.	19.
81.	52.	E.	25. 9.	21. $\frac{1}{2}$
81.	22.	E.	24. 25.	<i>Id.</i>
81.	24.	S.	25. 15.	21.
81.	22.	S.	24. 3.	20. $\frac{2}{3}$
81.	37.	S.	22. 42.	<i>Id.</i>
81.	54.	S.	21. 58.	21. $\frac{1}{2}$
81.	17.	E.	21. 25.	22. $\frac{1}{2} \frac{2}{3}$
81.	11.	S.	20. 40.	22. $\frac{2}{3}$
80.	42.	S.	20. 27.	22. $\frac{1}{2}$
78.	56.	S.	20. 4.	21. $\frac{1}{3}$
77.	14.	S.	20. 11.	22.
76.	23.	E.	20. 34.	22.



S E C T I O N,

Qui contient les Observes à Isle de France, dep. 1732.

Jours.	Thermom.
	Degrés.
JUIN.	
1.	20. $\frac{1}{2}$
2.	20. $\frac{2}{3}$
3.	21. $\frac{1}{2}$
4.	21.
5.	22. $\frac{1}{2}$
6.	22.
7.	21.
8.	19.
9.	17. $\frac{1}{2}$
10.	18. $\frac{1}{2}$
11.	19. $\frac{1}{3}$
12.	19. $\frac{1}{2}$
13.	20.
14.	19. $\frac{1}{2}$
15.	20. $\frac{1}{4}$
16.	20. $\frac{1}{4}$
17.	20. $\frac{1}{2}$
18.	20. $\frac{2}{3}$
19.	20. $\frac{1}{4}$
20.	21. $\frac{2}{3}$
21.	22.
22.	21.
23.	19.
24.	20.
25.	20.
26.	20. $\frac{1}{2}$
27.	22.
28.	21. $\frac{2}{3}$
29.	20.
	21.
	20. $\frac{1}{4}$

AOUT.

A O C T E M B R E	Jours.	Thermom. Degrés.
	1.	21.
	2.	21. $\frac{1}{2}$
	3.	21. $\frac{1}{2}$
	4.	22.
	5.	22.
	6.	23.
	7.	21. $\frac{1}{2}$
	8.	22.
	9.	22.
	10.	22. $\frac{1}{2}$
	11.	22.
	12.	21.
	13.	22. $\frac{2}{3}$
	14.	21. $\frac{1}{2}$
	15.	22.
	16.	21.
	17.	21.
	18.	22.
	19.	21. $\frac{2}{3}$
	20.	21. $\frac{2}{3}$
	21.	21.
	22.	21. $\frac{2}{3}$
	23.	22.
	24.	22.
	25.	22.
	26.	-



Q U A B L E,

Qui contient SIGNY. à Isle de Bourbon, Decembre 1732.

	Jours.	Thermom.
		Degrés.
NOVEMBRE.	1.	26.
	2.	25. $\frac{1}{2}$
	3.	25. $\frac{1}{2}$
	4.	24.
	5.	25.
	6.	Idem.
	7.	Idem.
	8.	26.
	9.	25. $\frac{1}{2}$
	10.	Idem.
	11.	25.
	12.	25. $\frac{2}{3}$
	13.	24. $\frac{1}{2}$
	14.	22.
	15.	23. $\frac{1}{2}$
	16.	25.
	17.	24. $\frac{3}{4}$
	18.	26.
	19.	26. $\frac{1}{4}$
	20.	26.
	21.	25. $\frac{3}{4}$
	22.	25. $\frac{3}{4}$
	23.	25. $\frac{3}{4}$
	24.	24.
	25.	24.
	26.	24. $\frac{1}{2}$
	27.	25. $\frac{1}{2}$
	28.	26.
	29.	26.
	30.	26.

TABLE,

Qui comt finit au 13 Mars de la même année. 2 Janvier ont été faites à l'Isle Ma pour aller à la Baye d'Antongile. Pendant tous les jours où l'Anse cette Baye, soit pour en revenir, trois pour marquer l'aire de vent, resté dans cette Baye à 15 degrés, près 12 minutes de longitude, depuis. Les Observations y ont été faites terre de trois bons cables, & qui porte la force des rayons réfléchis par cette Isle, dont la Compagnie des Indes, dans ce voyage. Elle l'a nommé pays l'appellent Noschubé; & les Indes qu'elle en est couverte; les Forbanc n'est éloignée de la terre de Madag.

de.	Latitude.		Therm.
	D.	M.	Degrés.
JANV.			
1733.	.	.	25. 4
.	.	.	26.
.	.	.	0.
10.	20.	20.	23.
1.	19.	5.	24.
3.	18.	9.	25.
10.	17.	12.	24.
1.	15.	44.	24.
22.	14.	55.	24.
26.	15.	44.	25.
.	.	.	25.

SUIT^{2.}
DE
JANVI.

Latitude.

Therm.

D. M.

Degrés.

16. 10.

24.

16. 32.

24. $\frac{1}{3}$

.....

24.

16. 0.

27.

.....

25. $\frac{1}{2}$

.....

25. $\frac{1}{2}$

.....

Id.

.....

24. $\frac{2}{3}$

.....

24.

.....

24.

.....

24.

.....

25.

.....

25.

.....

25.

.....

25. $\frac{1}{3}$

.....

25. $\frac{3}{4}$

.....

25.

.....

24. $\frac{1}{2}$

.....

24.

.....

24.

.....

24.

FEVRI.

.....

24.

.....

23. $\frac{1}{2}$

.....

23. $\frac{1}{3}$

.....

22.

.....

23. $\frac{1}{2}$

.....

24.

.....

24. $\frac{1}{2}$

.....

25. $\frac{1}{2}$

.....

25. $\frac{3}{4}$

.....

27.

.....

26.

.....

24.

.....

23. $\frac{1}{2}$

.....


24.

SUITE



Longitude.	Latitude.	Therm.
<i>D. M.</i>	<i>D. M.</i>	<i>Degrés.</i>
• • • •	• • • • •	22.
• • • •	• • • • •	23.
• • • •	• • • • •	23. $\frac{1}{4}$
• • • •	• • • • •	24. $\frac{1}{2}$
• • • •	• • • • •	23. $\frac{3}{4}$
• • • •	• • • • •	23. $\frac{1}{2}$
• • • •	• • • • •	24. $\frac{1}{4}$
• • • •	• • • • •	24.
• • • •	• • • • •	24.
• • • •	• • • • •	24. $\frac{1}{4}$
• • • •	• • • • •	24. $\frac{1}{2}$
• • • •	• • • • •	25.
• • • •	• • • • •	25. $\frac{1}{4}$
• • • •	• • • • •	26.
• • • •	• • • • •	26.
• • • •	• • • • •	27.
• • • •	• • • • •	26. $\frac{1}{4}$
• • • •	• • • • •	26.
• • • •	15. 20.	26. $\frac{1}{2}$
• • • •	• • • • •	26. $\frac{3}{4}$
72. 2.	17. 6.	24. $\frac{1}{2}$
73. 8.	18. 24.	24. $\frac{1}{4}$
74. 24.	19. 27.	25. $\frac{1}{2}$
• • • •	• • • • •	24.
• • • •	• • • • •	24. $\frac{1}{4}$
• • • •	• • • • •	25.
• • • •	• • • • •	25.





Je travaillai dans ses voyages aux progrès des Sciences, fit qu'avant que de s'embarquer, il songea à se munir de tous les instrumens qui pouvoient lui servir à faire des Observations curieuses & utiles; il eut soin de se pourvoir de deux Thermometres de nouvelle construction. Aussi curieux que je l'étois moi-même de savoir si les chaleurs qu'il alloit effuyer surpasseroient de beaucoup celles de nos plus chauds jours d'Été, il me promit d'observer régulièrement chaque jour le plus haut degré où monteroit la liqueur du Thermometre. Il m'a tenu sa promesse avec une exactitude qui doit faire plaisir au public. Je donnerai ici les Tables de ses Observations telles qu'il me les a envoyées en differens tems.

La premiere Table est celle des Observations qu'il a faites pendant sa route du Port de l'Orient, d'où il partit le premier Janvier 1732, jusqu'à l'Isle de France, où il arriva le 5. Juin de la même année. Cette Table est composée de cinq colonnes. La premiere est celle des Jours. La seconde est celle des Vents. La troisieme est celle des Longitudes; on fait assez que la plupart n'ont pas pu être déterminées avec une grande exactitude, mais quelle qu'elle soit en, général elle suffit. La quatrieme colonne est celle des Latitudes; on a mis un *E* devant chacune de celles qu'on n'avoit que par estime, & un *S* devant chacune de celles qui ont été observées. Enfin la cinquieme colonne donne le nombre des degrés, au-dessus du terme de la congélation artificielle, où s'est trouvée chaque jour la liqueur du Thermometre.

M. Cossigny me marque de plus, que depuis le 13 Mars jusqu'au 26 du même mois, la liqueur du Thermometre s'est tenue entre 26, 27, & 28 degrés.

Nous allons à présent rapporter les observations que nous avons faites à Paris, rue St. Thomas du Louvre, à l'Hôtel d'Uzès, pendant une grande partie des années 1732 & 1733, sur un Thermometre construit sur les mêmes principes que ceux de M. Cossigny; ces Thermometres mis à côté les uns des autres, eussent marqué le chaud & le froid à peu près par un même nombre de degrés; le mien étoit exposé au Nord, & placé en dehors d'une fenêtre du rez-de-chaussée.

Il m'a paru qu'il seroit inutile de donner la Table complete des observations que nous avons faites chaque jour, qu'il suffiroit de donner le résultat du plus grand froid & du plus grand chaud de chaque mois. On se souviendra que nos Thermometres ont deux suites de degrés qui commencent à 0, c'est le terme où l'eau commence à geler. Les degrés au-dessus de ce terme sont les degrés ascendants, & expriment combien la liqueur s'est élevée au-dessus du terme de 0, ou de celui de la congélation artificielle, & les degrés descendans marquent combien la liqueur est descendue au-dessous de ce terme. Dans notre Table une ligne tirée au-dessous du chiffre qui marque le nombre des degrés, signifie que ces degrés sont ascendants; & une ligne tirée au-dessus du chiffre qui exprime le nombre des degrés, marque que ces degrés sont descendans; ainsi 8 sont huit de-

583

Plus grand degré DE FROID du matin.	Plus grand DE FROID de l'après-
	JAN
31. à 7 ^h à 3 ^d $\frac{1}{2}$	31. à 3 ^h
	F E
1. à 7 ^h à 3 ^d	9. à 3 ^h $\frac{1}{2}$
2. à 7 ^h à 1 $\frac{1}{2}$	23. à 3 ^h $\frac{1}{2}$
1. à 6 ^h à 0 ^d	1. à 4 ^h

24. à 4 ^h à 27 $\frac{1}{2}$	6 ^h à 18 ^d
e Septembre & d'Octobre.	
	E.
5. à 4 ^h à 16	7 ^h à 10 ^d
R. E.	
31. à 3 ^h à 5 $\frac{1}{2}$	6 ^h à 3 $\frac{1}{2}$

degré du midi.	Plus grand degré DE CHAUD du matin.	Plus grand degré DE CHAUD de l'après-midi.
VIER 1733.		
à 1 ^d	6. à 7 ^h à 7 ¹	9. à 3 ^h à 9 ¹
VRIER.		
à 1 ¹	11. à 7 ^h à 6 ¹	18. à 3 ^h à 9 ^d
MARS.		
à 4 ¹	14. à 6 ^h à 10 ¹	12. à 4 ^h à 12 ¹
AVRIL.		
à 3 ^d	20. à 6 ^h à 10 ¹ 24. }	13. à 4 ^h à 19 ¹
MAL.		

23. à 6 ^h à 8 ^d	5. à 1 ^h à 11 ¹	25. à
25. à 6 ^h à 6 ^d	20. à 3 ^h à 2 ¹	5. à
NOVEMBER	DECEMBER	16. à
J'ai été absent de Paris pendant les mois de		
23. à 6 ^h à 8 ^d	5. à 1 ^h à 11 ¹	25. à
25. à 6 ^h à 6 ^d	20. à 3 ^h à 2 ¹	5. à
NOVEMBER	DECEMBER	16. à
J'ai été absent de Paris pendant les mois de		
23. à 6 ^h à 8 ^d	5. à 1 ^h à 11 ¹	25. à
25. à 6 ^h à 6 ^d	20. à 3 ^h à 2 ¹	5. à
NOVEMBER	DECEMBER	16. à

degrés. au-dessus de la congélation , 8 sont huit degrés au-dessous de la congélation.

Nous devons avertir qu'on ne doit pas s'attendre à trouver un certain accord entre les observations faites sur notre Thermometre, rue St. Thomas du Louvre, & celles qui sont faites à l'Observatoire. M. Maraldi a laissé le Thermometre, dont M. de la Hire se servoit, dans l'endroit où il l'avoit placé, & M. Maraldi a mis le nôtre auprès de l'autre ; ils sont tous deux dans le bas & l'intérieur d'une haute Tour ; quoique cette Tour ne soit pas couverte, les changemens de l'état de l'air n'y sont ni si considérables, ni si subits qu'en dehors, où est le Thermometre dont nous observons la marche.

Des Tables telles que celles qui précèdent, pour être exactement construites, demanderoient un Observateur qui se fût entièrement dévoué au Thermometre, qui renoncât pour lui presque à toute affaire & à tout plaisir : non-seulement il faudroit habiter pendant des années entières le même endroit, il faudroit chaque jour se trouver régulièrement chez soi à 3 ou 4 heures après midi, pour observer le degré où est la liqueur ; il faudroit que les observations du matin fussent faites toujours vers le lever du Soleil. Mais quoique les observations des Tables précédentes n'aient pas été faites régulièrement aux heures les plus convenables, elles fournissent pourtant des résultats curieux.

Les années 1732 & 1733 n'ont pas été regardées en France, comme des années où la chaleur ait été excessive ; nous en avons eu

où la chaleur à Paris a été plus grande & a duré plus longtems. Nous trouvons pourtant dans notre Table que le 24 Août 1732, la liqueur du Thermometre s'est élevée à Paris à 27 degrés $\frac{1}{2}$, & le 7 Juillet 1733 à 28 degrés. Près de quatorze mois d'observations faites entre les Tropiques, ne nous en fournissent aucune où la liqueur du Thermometre ait été par-delà 28 degrés, c'est même un terme où elle a monté rarement. Quand M. Cossigny a passé la Ligne, la chaleur n'a fait monter au plus la liqueur de son Thermometre qu'à 26 degrés, & nous avons eu à Paris des Etés où la liqueur s'est élevée à près de 30 degrés, & peut-être par-delà.

Je n'ai pourtant garde de vouloir conclure de la comparaison de ces différentes observations, que les chaleurs que nous sommes exposés à souffrir à Paris dans certains jours d'Été, sont plus grandes que celles qu'éprouvent tous les pays situés entre les Tropiques & sous la Ligne. Il y a grande apparence qu'en pleine terre, dans des endroits des grands Continens, éloignés de la mer, la chaleur est plus considérable que dans des endroits de la mer semblablement situés, & même qu'elle ne l'est dans les Isles d'une médiocre grandeur. Mais toujours voyons-nous qu'on peut passer la Ligne, habiter des pays situés entre les Tropiques, sans courir risque d'être exposés à des chaleurs insupportables.

Le vrai est pourtant que nous avons des ressources contre la chaleur dans nos pays, qu'on n'a pas dans ceux qui sont plus proches de

de la Ligne, & qu'on n'a pas dans un Vaisseau; nos maisons nous les donnent. Comme la chaleur excessive ne dure ici, quelquefois, qu'un jour ou deux, & toujours pendant peu de jours, l'intérieur des murs des maisons n'a pas le tems de prendre le degré de chaud de l'air extérieur. Un Thermometre tenu dans des appartemens où on n'a pas permis une trop libre entrée aux rayons du Soleil & à l'air extérieur, n'aura sa liqueur élevée qu'à 18 ou à 19 degrés, pendant que la liqueur d'un semblable Thermometre mis en dehors de l'appartement, quoiqu'exposé au Nord, se trouvera à 28 ou à 29 degrés. Aussi y a-t-il des appartemens qui dans les grandes chaleurs de l'Été nous paroissent des especes de glacières. Nous éprouvons même bien sensiblement que le chaud d'une rue differe beaucoup de celui d'une autre rue, lorsque nous passons d'une rue large où les rayons du Soleil ont donné, dans une rue étroite, formée par de hautes maisons qui n'ont pas permis au Soleil d'y entrer; il nous paroît alors que nous passons de la Zone Torride dans une Zone tempérée. C'est cette expérience qui a déterminé à ne faire que des rues très étroites dans les plus grandes Villes des pays chauds, telles que le Caire. Ces Villes ne seroient pas habitables, si leurs rues étoient larges; les rues & les maisons s'échaufferoient trop. Il arrive cependant dans les pays chauds où la chaleur est de longue durée, qu'elle pénètre peu à peu les murs des maisons, & qu'elle fait prendre aux pierres qui les composent, un degré de chaud.

approchant de celui de l'air extérieur. Il faut encore moins de tems pour échauffer les pieces de bois dont l'assemblage compose un Vaisseau.

Mais cette durée plus longue du chaud met les habitans de la Zone Torride plus en état de le soutenir; les fibres de leurs corps prennent insensiblement le degré de tension qui y convient, & ce n'est pas tant le grand degré de chaud & le grand degré de froid qui nous sont insupportables, que les passages trop prompts par une grande suite de degrés de froid ou de chaud. Le degré de froid qui nous paroît léger en Hiver, & même être produit par un air doux & tempéré, est pour nous un froid considérable dans une saison plus avancée. Dans notre climat nous sommes trop exposés à ces vicissitudes de chaud & de froid. Si on jette les yeux sur la Table des plus grands degrés de froid & de chaud qu'on a eu à Paris pendant les années 1732 & 1733, tant le soir que le matin, on verra qu'en 1732 le 24 Fevrier, à 6^h $\frac{1}{2}$ la liqueur étoit à 8 degrés $\frac{1}{2}$ au-dessus de la congélation, & qu'à pareille heure le 23 Août la liqueur n'étoit qu'à 8. Il faisoit donc plus froid le matin le 8 Août 1732, que le 24 Fevrier au matin de la même année. On verra qu'en 1733, le 25 Décembre, la liqueur du Thermometre étoit à 7^h du matin à 9 degrés $\frac{1}{2}$ au-dessus de la congélation, pendant qu'elle n'étoit qu'à 8 degrés $\frac{1}{2}$ le 13 Juin de la même année à pareille heure. Si on parcourt ces Tables, on verra beaucoup d'autres résultats

fin.

inguliers. Il y a tel jour en Été où la liqueur du Thermometre parcourt 12 à 13 degrés. M. Cossigny, qui avoit sur-tout en vue de donner idée du chaud des climats où il s'est trouvé, n'a pas fait d'observations suivies sur l'état du Thermometre chaque matin; je l'ai prié de faire par la suite ces observations, & je puis promettre qu'il les fera. Mais dans ses Lettres, il me marque que du soir au matin le Thermometre descend quelquefois de 4 degrés; la liqueur fait là peu de chemin, en comparaison de celui qu'elle fait dans nos jours d'Été.

Les jours qui sont marqués pour les plus froids par le Thermometre, ne sont pas toujours ceux qui nous le paroissent. Tout le monde a éprouvé que les froids humides sont plus sensibles que les froids secs; lorsqu'on consulte le Thermometre, on voit que tel froid humide dont nous nous trouvons pénétrés, est souvent beaucoup moindre que le froid sec que nous supportons patiemment quelques jours auparavant. Nous ressentons d'autant plus de froid, que l'atmosphère qui environne notre corps est plus éloignée du degré de chaleur de notre peau. C'est à notre peau & à ce qui s'en échappe à échauffer continuellement cette atmosphère. Dans des tems secs, cette atmosphère est de l'air; dans des tems humides, cette atmosphère est de l'air chargé de vapeurs, ou ce qui est la même chose, chargé d'eau. Alors nous avons donc de l'air & de l'eau à échauffer. Or les corps les plus denses demandent plus de chaleur pour être échauffés; si l'eau est 800 fois plus

dense que l'air, il faut consommer 800 fois plus de chaleur pour échauffer un certain volume d'eau que pour échauffer le même volume d'air; d'où on voit combien il nous en coûte davantage pour échauffer un air humide que pour échauffer un air sec.

Il y a aussi des jours en Été où le Soleil est caché par des nuages, dont la chaleur nous paroît accablante, & que nous avons plus de peine à soutenir que celle des jours plus chauds & plus brillans. Si ces chauds nous paroissent plus chauds qu'ils ne le sont, ce n'est pas précisément par la même cause qui nous fait porter quelquefois de faux jugemens du froid de l'air que nous respirons; car nous sommes incommodés par la chaleur de l'air extérieur dans des tems où l'atmosphère de notre corps est plus chaude que ne l'est l'air que nous respirons. J'ai éprouvé quel étoit le degré de chaleur non-seulement de l'atmosphère de mon corps, mais même quel étoit celui de ma peau aux environs de l'estomac, dans des jours d'Hiver. J'ai mis auprès du feu un Thermometre qui n'avoit que 16 pouces de haut, & dont la marche étoit la même que celle des grands. Je l'y ai laissé jusqu'à ce que la liqueur fût montée à plus de 40 degrés; alors je l'ai fait passer au-dessous de la robe de chambre, de la veste, de la camisole & de la chemise même, & j'ai appliqué la boule & le tube immédiatement contre ma peau. Je me suis bien renveloppé de mes vêtemens, & j'ai par conséquent bien recouvert le Thermometre; je l'ai quelquefois laissé en place plus d'une demi-heure; quand

l'en ai retiré, sa liqueur a été ordinairement élevée à 31 ou à 31 degrés & demi. La chaleur de la peau, & celle de l'atmosphère de tout homme ne sera pas la même; celle du même homme varie sans doute, mais ces variations ne peuvent pas aller loin, & la chaleur de l'air nous accable, quoiqu'elle soit bien au-dessous de 31 degrés. Mais selon que les corpuscules qui s'échappent de notre corps par l'insensible transpiration, restent plus ou moins longtems auprès de notre peau, notre propre atmosphère doit s'échauffer plus ou moins. Ces vapeurs de notre peau s'élèvent plus lentement dans un air chargé lui-même de vapeurs. Il peut se faire aussi que l'air chargé de vapeurs arrête une partie de notre transpiration, & que les corpuscules qui sont poussés contre notre peau, & qui n'en sortent alors que poussés avec plus de force, excitent sur notre peau un degré de chaleur qu'elle n'auroit pas, si ces corpuscules pouvoient être chassés en plus grande quantité par de moindres efforts.

Au reste, M. Cossigny ne s'est pas borné aux seules observations du Thermometre, il n'a négligé aucune de celles que l'Académie doit attendre d'un Correspondant également éclairé & attentif. J'aurai ailleurs occasion de rapporter plusieurs de celles qu'il m'a communiquées, mais je ne puis actuellement passer sous silence un fait qui a quelque rapport avec la constitution de l'air, & par lequel il terminoit une Lettre écrite à l'Isle de Bourbon vers la fin de Décembre 1732: il me marquoit que toute l'Isle étoit alors attaquée de rhumes,

mes, semblables à ceux qui avoient épargné si peu de gens à Paris en 1729 & 1730. Nous n'avons pas encore oublié les rhumes qui, depuis la fin de 1732, & pendant les premiers mois de 1733, ont parcouru successivement toutes les parties de l'Europe, & qui y ont été une maladie épidémique; qui pourtant a été accompagnée de differens symptômes en differens pays, & à laquelle on a donné deux noms à Paris, ceux de *Folette* & d'*Allure*. Cette maladie regnoit déjà à l'Isle de Bourbon, c'est-à-dire, au-delà de la Ligne, quand elle a commencé en ce pays. On a appris que les Equipages des vaisseaux qui revenoient des voyages de long cours en ont été attaqués en pleine mer. Toutes ces Observations réunies prouvent assez que cette maladie a eu pour cause une constitution particulière à tout l'air qui nous environne, & qu'on ne doit point la chercher cette cause dans des brouillards qu'on a cru remarquer plus grands qu'à l'ordinaire dans quelques-uns des pays où elle a regné.

DU MOUVEMENT APPARENT
DE L'ÉTOILE POLAIRE
VERS LE POLE DU MONDE,

*Et des Étoiles qui ont été ou peuvent être plus
proche de ce Pole ;*

*Avec des Réflexions sur la description qu'Eur-
doxus a faite des Étoiles fixes, rapportée par
Hipparque Bithymien.*

Par M. MARALDI.*

NOUS avons déterminé par plusieurs ob-
servations du mois de Décembre de l'an-
née 1732, la distance de l'Étoile polaire au
pole de $2^{\circ} 7' 9''$, & particulièrement par les
observations du 19 de ce mois, car ayant ob-
servé le matin la plus petite hauteur méri-
dienne de cette Étoile par un Quart-de-cer-
cle de 2 pieds $\frac{1}{2}$ de rayon, elle fut trouvée
de $46^{\circ} 43' 20''$, & on trouva le soir sa plus
grande hauteur méridienne par le même
Quart-de-cercle de $50^{\circ} 57' 30''$. Ce Quart-de-
cercle baïssoit de $40''$ qu'il faut ajouter aux
hauteurs observées, & qu'on corrigera en-
suite par la réfraction, & on aura la plus
grande hauteur véritable de l'Étoile polaire,
de

* 6 Mai 1733.

de $50^{\circ} 57' 21''$, & la plus petite hauteur de $46^{\circ} 43' 3''$, dont la moitié de la différence, qui est de $2^{\circ} 7' 9''$, est la distance de l'Etoile polaire au pôle, qui étant ajoutée à $46^{\circ} 43' 3''$, donne la hauteur du pôle de l'Observatoire de Paris de $48^{\circ} 50' 12''$, à deux secondes près de celle qu'on suppose ordinairement de $48^{\circ} 50' 10''$.

Feu M. Cassini & le P. Riccioli observèrent à Bologne en 1656 la distance de cette Etoile au pôle de $2^{\circ} 32' 30''$. Le détail de ces observations est rapporté par le P. Riccioli, au 7^{me}. livre, chap. XV. de son Hydrographie.

La distance de l'Etoile polaire au pôle est donc diminuée en 76 ans, intervalle entre nos observations & celles de M. Cassini & du P. Riccioli, de $25' 20''$, ce qui est à raison de $20''$ par an.

Tycho-Brahé avoit trouvé la même diminution annuelle par des observations immédiates, qui sont rapportées dans son premier livre des Progymnasmes, page 362.

Cette variation de la distance entre l'Etoile polaire & le pôle du monde est si évidente, & si conforme aux observations du mouvement des autres Etoiles fixes, qu'il ne reste aucun lieu de douter, qu'elle n'ait été telle que nous venons de la déterminer. Elle paroît avoir été de même depuis 155 ans, ce qui est confirmé par la comparaison des observations de Tycho & les nôtres, entre lesquelles il y a un pareil intervalle de tems. Car si on compare la distance de l'Etoile polaire au pôle, observée par Tycho l'année

1577 qui étoit de $2^{\circ} 58' 50''$, à la distance observée en 1732, de $2^{\circ} 7' 9''$, la différence qui est de $51' 41''$ étant divisée par 155, donne précisément $20''$ pour le mouvement annuel de l'Etoile polaire vers le pôle du monde pendant ce tems. Ce mouvement ne sera pas toujours de la même quantité, il diminuera à mesure que l'Etoile polaire approchera du commencement du Cancer, où ce mouvement sera imperceptible pendant plusieurs années.

Suivant les hypothèses du mouvement des Etoiles fixes, la distance de l'Etoile polaire au pôle diminuera encore pendant 362 années, après lesquelles elle sera le plus proche du pôle qu'elle puisse être. Si elle n'étoit pas plus éloignée du pôle de l'Ecliptique que l'est le pôle du monde, elle auroit été se placer au pôle même du monde, ainsi que quelques Astronomes anciens l'ont cru devoir arriver; mais comme elle est éloignée du pôle de l'Ecliptique de $26^{\circ} \frac{1}{2}$, plus que ne l'est le pôle du monde, elle ne peut s'approcher plus près de ce pôle que de $25^{\circ} \frac{1}{2}$, pourvu que la distance entre ces deux pôles & la latitude de cette Etoile ne change point.

Si Scaliger avoit été exercé dans ces sortes d'observations, il n'auroit pas nié si hardiment ce mouvement de l'Etoile polaire, & des autres Etoiles fixes vers le pôle du monde, ni insulté à tous les Astronomes qui le soutiennent, comme il dit *, par une fureur opinâtre, pour ne vouloir pas desapprendre dans

* *Diatriba*, pag. 31.

dans leur vieillesse, ce qu'ils ont appris étant jeunes, en souscrivant, par une ignorance sotte & puérile, à Ptolémée, à Hipparque, & aux autres Astronomes; mais il auroit été obligé d'avouer ce mouvement, parce que les observations de diverses années faites avec une grande exactitude, & comparées ensemble, le montrent évidemment. Il est tombé dans cette erreur, parce qu'il étoit persuadé que cette Etoile qui est à l'extrémité de la queue de la petite Ourse, qui est présentement la polaire, comme la plus proche du pôle du monde, avoit toujours été la plus boréale de cette constellation. Il croyoit être bien fondé sur ce qu'Eudoxus qui vivoit trois siècles avant J. C. & quelques Commentateurs d'Aratus appellent une certaine Etoile le *pôle du monde*. Mais aucun des Auteurs que j'ai lus ne dit que cette Etoile fût à l'extrémité de la queue de la petite Ourse. Eudoxus ne dit seulement pas en quelle constellation étoit cette Etoile. Hyginus rapporte seulement que c'est une de la queue de la petite Ourse, sans la déterminer plus précisément. Le P. Petau, qui a repris très sagement l'erreur de Scaliger, a fait voir que la dernière Etoile de la queue de la petite Ourse qui est présentement la polaire, étoit au tems d'Eudoxus, la plus éloignée du pôle, & que la plus proche étoit une de l'épaule, qu'il appelle *superior præcedentium in laterculo*, & que je crois être celle qui est marquée β par Bayer, qui est de la seconde grandeur.

Mais

Mais j'ai remarqué qu'en ce même tems la pénultième de la queue du Dragon, marquée * par Bayer ; & qui est de la quatrième grandeur, en étoit encore plus proche que les Etoiles de la constellation de la petite Ourse, & qu'ainsi on peut avoir pris diverses Etoiles pour la polaire, & en d'autres constellations. Il est vrai qu'il y a longtems qu'on l'a prise dans la constellation de la petite Ourse. M. Cassini a remarqué dans sa Dissertation de l'origine & du progrès de l'Astronomie, que les Phéniciens se servoient des Etoiles de cette constellation, pour se conduire dans les longs voyages sur mer, & que Thalès Astronome du 7^{me}. siècle avant J. C. ayant passé de Phénicie en Grece, apprit aux Grecs à connoître la constellation de la petite Ourse, & à s'en servir dans la Navigation ; mais il est probable qu'on s'est aussi servi des Etoiles des autres constellations, pour marquer le pôle boréal du monde, & je ne doute pas qu'on ne s'en serve encore dans la suite, car il y a un grand nombre d'Etoiles propres pour cet effet. Voici les plus remarquables dans l'ordre qu'elles approchent du pôle :

DAN

596 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

DANS LA CONSTELLATION
de Céphée.*In summitate vestis prope po-
larem.**γ in femore dextro.**π apud Cetylā dextram.**ζ sub cingulo ad sinistram
latus.**ξ ad humeri dextri summita-
tem.**ν in cervice.*DANS LA CONSTELLATION
du Cygne.*α dux in pede dextro.**θ in vola ala dextra.**δ in cubito apud alam dex-
tram.*DANS LA CONSTELLATION
d'Hercule.*ι in ima dextra sura parte.**κ juxta genā sinistram.**υ in sura precedens.*DANS LA CONSTELLATION
du Dragon.*θ ultimum cauda tortum pra-
cedens.**ι versus occasum ad ultimum
cauda.**α antepenultimam cauda se-
quens.**κ penultima cauda.*DANS LA CONSTELLATION
de la petite Ourse.*ζ in sequenti latere Austrā-
lior Kochab.**ξ in latere precedente qua-
dranguli.**ι in eductione cauda.*

L'antépénultième de la queue du Dragon marquée α par Bayer, & qui est de la 3^{me} grandeur, est celle de toutes ces Etoiles qui peut le plus s'approcher du pôle du monde.

La longitude de cette Etoile est de 5^h 3^m 39', & elle a une latitude de 66° 21'; & comme suivant les élémens de la Sphere, les Etoiles septentrionales sont à leur moindre distance du pôle, lorsque leur longitude est précisément de 3 signes, c'est-à-dire, lorsqu'elles sont au commencement de Cancer où se rapporte notre pôle; cette Etoile aura paru

paru être au pôle du monde à 10 minutes près il y a 4060 ans, c'est-à-dire, 2358 ans avant J. C.; & si de ce tems il y avoit eu des Observateurs capables de déterminer sa situation, ç'auroit été de leur tradition qu'Eudoxus auroit pu apprendre qu'il y avoit une Etoile qui servoit de pôle du monde.

Car nous croyons que la description qu'Eudoxus a faite des Etoiles fixes, a été tirée des observations anciennes faites en divers tems, & en divers lieux, & qu'il a rapporté sans faire aucune distinction de tems & de lieux, ce qui ne sembloit pas nécessaire, quand on ne se doutoit pas encore que les Etoiles fixes eussent aucun mouvement vers les pôles du monde.

Si cette Etoile a toujours été de la grandeur qu'elle paroît aujourd'hui, elle aura passé pour la polaire encore mille ans après sa moindre distance au pôle; car elle n'aura été éloignée de ce pôle que de $5^{\circ} 42'$, & il n'y avoit avant ce tems aucune autre Etoile de cette grandeur plus proche du pôle; mais il est incertain si elle a toujours été de la même grandeur, car on ne la trouve point dans le catalogue de Ptolémée; & comme il y a des Etoiles qui augmentent & diminuent sensiblement d'un tems à l'autre, celle-ci pourroit être une de celles qui sont sujettes à cette variation de grandeur apparente, & être la même que celle qui est marquée dans le même catalogue de la quatrième grandeur, dont la latitude est de $65^{\circ} 30'$ moindre de $50'$ que celle de notre Etoile, ce qu'on pourroit attribuer cependant aux défauts des ob-

servations de Ptolémée, qui n'étoit pas four-
 ni d'instrumens aussi exacts que les modernes.
 La longitude de cette Etoile conviendrait
 assez bien avec la longitude de la nôtre, car
 Ptolémée la met au commencement de l'em-
 pire d'Antonin à $11^{\circ} 10'$ du signe du Lion,
 au-lieu qu'elle est présentement à $3^{\circ} 39'$ de
 la Vierge. La différence est de $22^{\circ} 29'$ que
 les Etoiles fixes font en 1580 ans, qui est
 à peu près l'intervalle entre nos observations
 & celles de Ptolémée. Cette conjecture nous
 paroît d'autant plus vrai-semblable, qu'il
 n'y a point en cet endroit du ciel d'autre
 Etoile qui ne soit éloignée de celle-ci de 3
 degrés. On ne la sauroit prendre par consé-
 quent pour une autre, sans lui attribuer un
 mouvement fort différent de celui qui s'ob-
 serve dans les autres Etoiles fixes, joint qu'il
 n'y a pas dans le catalogue de Ptolémée d'au-
 tre Etoile dont la latitude approche plus de
 celle que cette Etoile a présentement: il y a
 donc toute apparence que l'Etoile du Dra-
 gon est la même que celle qui est dans le
 catalogue de Ptolémée, dont la longitude
 étoit de $4^{\circ} 11^{\circ} 10'$, & la latitude de $65^{\circ} 30'$.

Mais quoi qu'il en soit, elle n'étoit pas au
 tems d'Eudoxus à sa moindre distance du
 pole, & il n'y a aucune Etoile remarquable
 de la constellation de la petite Ourse, qui
 n'en fût éloignée de 7 degrés. Nous ne
 voyons pas d'où cet Auteur a tiré qu'il y avoit
 une Etoile au pole du monde, & nous ne
 pouvons pas attribuer cette méprise à la gros-
 siereté de ses observations; car s'il avoit di-
 rigé seulement un instrument quelconque à
 l'E-

l'Etoile polaire, & qu'il eût laissé cet instrument immobile pendant quelque tems, il se seroit apperçu du mouvement de cette Etoile. Il y a plusieurs raisons qui nous persuadent que les descriptions qu'Eudoxus a faites des Etoiles fixes, & rapportées par Hipparque Bithynien, ne sont pas tirées de ses observations immédiates, mais qu'elles ont été copiées d'autres descriptions beaucoup plus anciennes, faites quand les Etoiles se rapportoient aux cercles de la Sphere, d'une maniere fort différente de celles qu'elles avoient au tems d'Eudoxus, qui ne sachant pas que les Etoiles fixes changent de position à l'égard de ces cercles par la suite des tems, supposoit qu'elles fussent de son tems aux mêmes places où elles avoient été observées anciennement.

* Eudoxus n'a pas vécu long-tems, & il étoit pauvre, & par conséquent il n'a pas eu le tems ni la commodité de faire toutes les observations nécessaires pour faire une description exacte des Etoiles fixes. En effet, en examinant la situation des constellations décrites par Eudoxus, & les comparant à l'état où elles se trouvent présentement, il en résulte un mouvement bien différent de celui qu'on conclut des observations de Ptolémée: d'ailleurs, les observations des anciens Astronomes avant Ptolémée étoient très imparfaites. Ils comparoient, il est vrai, les Etoiles fixes à l'Equinoxial, aux Tropiques, aux Colures, & aux Cercles arctique & antar-

tarctique, qui rasoient l'horizon du lieu de l'Observateur; mais on ne marquoit que grossièrement les constellations par où ces cercles passaient.

Hipparque Bithynien, en examinant les constellations coupées par ces cercles, suivant Eudoxus, & les comparant à l'état où elles se trouvoient de son tems, fait voir qu'ordinairement les situations d'Eudoxus sont fort éloignées de celles qui s'observoient alors, ce qu'il attribua à erreur d'Eudoxus. On n'avoit pas encore la connoissance de la variation qui arrive dans la suite des tems aux Etoiles fixes. Hipparque Rhodien a été le premier qui s'en est apperçu, & apparemment cette connoissance n'étoit pas encore passée à Hipparque Bithynien, car s'il avoit eu cette connoissance, il auroit trouvé que les Etoiles peuvent avoir eu anciennement la situation qu'Eudoxus leur attribuoit, & il auroit pu conclurre que les descriptions d'Eudoxus avoient été tirées des observations des anciens Astronomes. Il ne nous est pas permis de penser autrement. La grande antiquité seule que nous sommes obligés d'attribuer aux observations sur lesquelles Eudoxus a fait la description des constellations, nous pourroit faire changer de sentiment, si nous n'étions pas sûrs qu'on a observé le ciel de tout tems; car il paroît par la situation que les constellations ont présentement, comparée à celle qui est rapportée par Eudoxus, que ces observations ont dû être faites 12 siècles environ avant J. C.; ce qu'il nous est facile de prouver, du moins des ob-

observations des constellations, qui, suivant Eudoxus, étoient coupées par les colures; car cette position est l'époque la plus régulière qu'on puisse assigner au mouvement des Etoiles fixes, qui, suivant les observations, se fait par des cercles parallèles à l'écliptique auxquels ces colures sont perpendiculaires. C'est pourquoi les Etoiles qui se rencontrent sur ces colures ont toutes la même longitude, ce qui n'arrive pas aux autres cercles auxquels Eudoxus & les Astronomes qui l'ont précédé, ont comparé les Etoiles fixes.

Eudoxus & Aratus rapportant par ordre les constellations par lesquelles passoit le colure des Solstices, remarquent qu'il passoit par le milieu de la grande Ourse, par le milieu du Cancer, par le cou de l'Hydre, & qu'il coupoit le navire entre la poupe & le mât; que de l'autre côté il passoit par la queue du poisson Austral, par le milieu du Capricorne & de la Fleche, par le cou du Cygne & par son aile droite, par la main gauche de Céphée, par le repli du Serpent, & le long de la queue de la petite Ourse. Nous avons examiné cette trace sur le globe, un même cercle de latitude passe par toutes ces constellations, excepté par la queue de la petite Ourse qui en est beaucoup éloignée, ce qui nous fait croire qu'il y a une erreur dans le rapport d'Eudoxus, comme l'avoit remarqué Hipparque Bithynien; nous avons trouvé que ce cercle coupe l'Ecliptique vers le 10^{me}. degré du Lion & du Verseau, au lieu que, suivant Eudoxus, il passoit par les points des Solstices, qui sont le commence-

ment des signes du Cancer & du Capricorne; ainsi la situation de ces constellations est éloignée présentement de celle où elle a été observée anciennement, d'environ 40 degrés, que les Etoiles fixes ne parcourent qu'en 29 siècles; donc cette situation des Etoiles fixes, rapportée par Eudoxus, a dû être observée environ 12 siècles avant l'époque de J. C. c'est-à-dire 9 siècles avant cet Auteur: ce qui fait connoître la grande antiquité de l'invention de ces mêmes Figures, que nous décrivons encore présentement dans le globe céleste.



NOUVELLE MANIERE

D'OBSERVER EN MER LA DECLINAISON DE L'AIGUILLE AIMANTÉE.

Par M. DE LA CONDAMINE.*

ON fait assez combien il est important de connoître en Mer la déclinaison de l'Aiguille aimantée, que les Marins nomment *la Variation*. Si elle est tout-à-fait inconnue, la Boussole, ce flambeau de la Navigation moderne, ne servira qu'à nous tromper plus sûrement; si elle n'est connue qu'imparfaitement, on ne tirera pas de la Boussole tout le secours qu'on en doit attendre. C'est le défaut

* 14 Novemb. 1733.

défaut de cette connoissance exacte qui, au jugement de la Société Royale de Londres, a causé le naufrage d'une Escadre Angloise qui se perdit sur les Côtes méridionales d'Angleterre; ce n'est probablement pas le seul accident qui ait eu la même cause, aussi l'on a toujours regardé cet objet comme une des parties les plus essentielles de la navigation. C'est, sans doute, ce qui a déterminé l'Académie à proposer pour sujet du Prix de 1731, *la meilleure maniere d'observer en Mer la Déclinaison de l'Aiguille aimantée.* Ce Prix a donné occasion à plusieurs Ouvrages pleins de réflexions, de recherches, d'inventions même aussi utiles qu'ingénieuses, & je n'ai garde de prétendre que ce que j'ose proposer aujourd'hui diminue en rien le mérite de ce qui a paru d'excellent sur cette matiere. L'avantage que j'ai eu de faire en 1731 le voyage des Côtes de Barbarie & du Levant, sur les Vaisseaux du Roi, m'ayant mis à portée de reconnoître, par moi-même, les défauts de l'Instrument dont on se sert communément pour observer la déclinaison de l'Aiguille, & les inconvéniens de la pratique ordinaire, j'ai cherché les moyens d'y remédier; c'est même moins un nouvel instrument que je propose, qu'un changement qui me paroît propre à perfectionner l'ancien, en le rendant plus exact, & d'un usage plus sûr & plus commode, par un moyen assez simple auquel je ne sache pas qu'on ait encore pensé.

Le Compas de Variation, c'est ainsi que les Marins nomment l'Instrument dont ils se

servent pour observer en Mer la déclinaison de l'Aiguille, est une Boussole qui a la circonférence de sa rose divisée en degrés; aux deux côtés opposés de sa boîte* AL , DI , il y a deux pinnules; un fil AD , tendu horizontalement d'une pinnule à l'autre, passe au-dessus du centre B de la rose FGP , qu'il partage en deux également. Plus ordinairement au-lieu de pinnules, ce sont deux petites fenêtres vitrées pour empêcher le vent d'agiter la rose, & sur lesquelles retombent verticalement les deux extrémités AC , DE , du fil horizontal, qui tiennent lieu de pinnules.

Pour connoître avec cet Instrument la variation, au lever ou au coucher du Soleil, l'Observateur est attentif au moment où le disque de cet astre à l'horizon est partagé également par les deux fils verticaux AC , DE , vus l'un par l'autre; & dans le même instant un autre regarde à quel degré de la circonférence de la Boussole répond le fil horizontal, ou quel angle ce même fil fait avec la ligne Est & Ouest de la Boussole: par ce moyen on a l'amplitude de l'astre, c'est-à-dire, qu'on sait à combien de degrés de l'Est ou de l'Ouest de la Boussole, il paroît se lever ou se coucher. Cette amplitude que donne l'observation peut être nommée apparente ou magnétique, pour la distinguer de la vraie amplitude que donnent les Tables astronomiques. S'il n'y avoit point de variation, il est clair que l'amplitude vraie

ou

* Fig. 1. & 2.

ou calculée feroit la même que l'amplitude observée ou magnétique. La différence de ces deux amplitudes donne la quantité de la variation.

Je n'entrerais point ici dans le détail des divers défauts qu'on reproche au Compas de Variation ordinaire, on peut voir ce qu'en ont dit M. de Radouay * dans ses Remarques sur la Navigation, & les Mémoires imprimés de M^{rs}. Bouguer & Meynier, sur le sujet du Prix de l'Académie de 1731. Je me contenterai d'observer qu'outre les défauts auxquels on peut remédier par le choix des matieres qui composent cet instrument, & par les précautions indiquées par ces Auteurs pour le rendre aussi parfait qu'il est possible dans son état present, il y reste toujours deux très grands inconvéniens qui sont inévitables, étant une suite nécessaire de sa construction actuelle. Le premier est, qu'il faut nécessairement deux Observateurs, l'un pour viser à l'astre par les pinnules ou les fils verticaux, & l'autre pour remarquer à quel degré de la circonférence de la Boussole répond le fil horizontal dans le moment où l'astre est vu par les fils verticaux. Le mouvement du Vaisseau rend cette dernière observation surtout très délicate, par la difficulté qu'il y a que les deux Observateurs s'accordent bien parfaitement; car il ne suffit pas que chaque observation instantanée soit juste en elle-même, si elles ne sont pas exactement contemporaines. L'autre inconvénient est que le

Com

* *Remarques sur la Navigation*, 1727.

Compas de Variation en l'état présent n'est presque d'aucun usage que pour le lever ou pour le coucher du Soleil, & il n'arrive que trop souvent, même dans les plus beaux jours, qu'on le perd de vue dans les nuages & les vapeurs quand il approche de l'horizon, quoiqu'il ait paru pendant le jour dans tout son éclat; en sorte qu'il se passe quelquefois dans la plus belle saison de l'année plusieurs jours de suite, pendant lesquels un Vaisseau peut faire plusieurs centaines de lieues, & se trouver en des parages où la variation est fort différente, sans qu'on puisse voir distinctement le lever ou le coucher du Soleil. Quant à la difficulté d'observer exactement avec le Compas ordinaire lorsque l'astre est élevé sur l'horizon, on peut voir dans le Mémoire déjà cité * de M. Bouguer, combien cette méthode est défectueuse; & ce détail seroit ici superflu.

J'ai eu pour but de prévenir ces deux inconvéniens, dans la nouvelle construction que je propose. Quant au premier, qui est celui des deux Observateurs, en voyant opérer suivant la pratique ordinaire, je m'étois souvent étonné qu'on ne se fût pas servi de l'ombre d'un Stile vertical placé au centre de la Boussole, pour connoître sur sa circonférence le degré de l'horizon où le Soleil se leve & où il se couche. Cette idée me paroissoit fort simple, & la première qui auroit dû se présenter; en y regardant de plus

* *Méthode d'observer en Mer la déclinaison de la Boussole, par M. Bouguer, p. 11. & 12.*

plus près, j'ai reconnu que plusieurs obstacles s'y oppofoient, & avec un peu plus de réflexion, je crois avoir trouvé les moyens de les lever.

La premiere difficulté étoit, que l'ombre d'un ftile vertical fur un plan horizontal, s'allongeant à mefure que le Soleil baiffe, s'évanouit & difparoît enfin quand cet afre eft à l'horizon, qui eft le moment précifément où elle devient néceffaire pour l'observation. Il eft vrai que cette ombre qui difparoît alors fur un plan horizontal, conferveroit toute fa netteté fur un plan vertical & parallele au ftile, tel que les parois verticales de la boîte extérieure de la Bouffole; mais les mouvemens de la boîte étant indépendans de ceux de l'Aiguille, l'ombre du ftile dans les divers mouvemens du Vailfeau, changeroit de place fur le côté de la boîte. On ne peut donc tirer du plan vertical aucune utilité, à moins que de lui faire fuivre tous les mouvemens de la rofe, en le rendant adhérent à fa circonférence. De nouveaux obstacles s'y oppofoient; la crainte de trop charger la rofe; la difficulté de lui conferver fon équilibre, qui n'eft maintenu que par l'excès de la hauteur de la chape fur le plan de la rofe, à quoi le plan vertical porté par la rofe mettroit un nouvel obstacle; & ce qui rend encore cet inconvéniement plus grand, la néceffité de baiffer la chape, pour que l'ombre du ftile puiiffe marquer le plus près du pied qu'il eft poffible; enfin l'ombre que jetteroît ce plan vertical, qui empêcheroit de voir l'ombre du ftile; ce font les principales difficultés que j'ai eu

à combattre, & auxquelles j'ai tenté de remédier par différentes voyes.

Voici la construction de l'Instrument à laquelle je me suis arrêté, quoique je ne doute pas qu'il ne soit susceptible d'une plus grande perfection.

* Je prends un Compas de Variation ordinaire, je diminue la hauteur de sa chape PG , autant qu'il est possible, en conservant l'équilibre de la rose sur son pivot, mais en sorte que la chape n'excède le plan de la rose que d'une ligne, s'il se peut, ou au plus une ligne & demie. Au sommet de cette chape je fais entrer ou souder un fil de cuivre délié CI , de la hauteur du demi-diamètre de la Boussole; ce fil destiné à servir de stile, doit être perpendiculaire au plan de la rose. Je colle au bord de ce plan depuis le Nord N de l'Aiguille jusqu'au Sud S , sur la moitié $NE S$ de la circonférence, un rebord de papier Nn , Ss , disposé verticalement, en sorte qu'il déborde la surface supérieure du plan de la rose de deux à trois lignes de hauteur. J'en colle un autre $NRST$ sur l'autre demi-circonférence $NO S$, aussi verticalement au niveau du plan de la rose par le dessus, mais qui excèdera sa surface inférieure d'une pareille quantité de deux à trois lignes. Ces deux rebords seront divisés en degrés correspondans à ceux de la circonférence de la rose. En cet état, je la place sur son pivot & dans sa boîte † $ABCD$, j'ôte le verre-plan $NQMR$, (*Fig. 1.*) du Compas ordinaire, aussi.

* *Fig. 3.* † *Fig. 4.*

aussi-bien que les fils tant l'horizontal AD , que les verticaux AC , DE . A la place de ce verre-plan, je couvre ma Bouffole d'un demi-globe AGH (Fig. 4.) de verre ou de crystal, sous lequel le stile perpendiculaire ne soit point gêné. Telle est la construction de l'Instrument proposé.

L'ombre du stile vertical qui s'efface sur un plan horizontal à mesure que le Soleil baisse, paroît très distinctement, même aux momens du lever & du coucher, sur le rebord vertical parallele au stile & disposé exprès pour la recevoir. D'ailleurs ce rebord adhèrent à la rose en suit tous les mouvemens, ou plutôt demeure immobile avec elle quand une fois elle est dirigée. Si le rebord eût occupé la circonférence entiere de la surface supérieure de la rose, outre que l'équilibre eût été difficile à conserver par les raisons alléguées, un côté du rebord eût fait ombre à l'autre, & empêché de voir celle du stile au moment de l'observation. Il est vrai qu'on pouvoit y remédier par le moyen de deux Bouffoles, dont chacune eût eu sa demi-circonférence garnie d'un rebord vertical, l'une du côté de l'Orient pour observer le soir, l'autre du côté de l'Occident pour observer le matin; ç'a été ma première idée : mais outre que c'eût été faire deux Bouffoles au-lieu d'une, leur rose eût été plus chargée d'un côté que de l'autre, & il eût fallu employer quelque industrie pour servir de contre-poids au côté le plus léger. On a prévenu à la fois l'un & l'autre inconvénient, en partageant le rebord vertical en deux demi-circonférences, l'une

supérieure au plan de la rose, où l'ombre du Soleil tombera le soir; l'autre inférieure qui recevra au Soleil levant l'ombre du pivot placé dans le prolongement du stile; ce qui n'exige qu'un seul instrument, & sert en même tems à maintenir l'équilibre, une demi-circonférence servant de contre-poids à l'autre, comme on le voit par expérience dans la Boussole que j'ai fait construire sur ce principe. L'expérience prouve pareillement que ce rebord ne charge point trop la rose, & ne rend pas l'Aiguille paresseuse. D'ailleurs, on peut rendre la rose plus légère & moins sujette à se déformer par l'humidité, en la faisant d'une feuille de talc entre deux papiers, au lieu de carton; les Anglois font dans cet usage. On peut encore, si l'on veut, diminuer le poids de la rose, en l'évoidant dans son milieu, par le retranchement d'un côté concentrique *B D H E* (*Fig. 4.*), & ne lui laissant qu'une couronne *B N, E D, F S, H O*, plus ou moins grande, qui en sera d'autant plus aisée à être gouvernée par l'Aiguille *N S*; & ceci aura encore une autre utilité, en ce que sans baisser l'œil au-dessous du niveau du plan de la rose, pour voir l'ombre sur le rebord inférieur, on pourra l'avoir au-dessus par l'ouverture du cercle évuidé. On peut même, pour plus de commodité, disposer pour cet effet au-dessous de la rose, une glace de miroir parallèlement au plan de la rose; cette glace sera percée en son centre pour laisser passer le stile, ainsi que je l'ai fait exécuter dans mon modele; & elle servira non-seulement à réfléchir l'image du rebord inférieur de

de la rose, pour y voir l'ombre plus commodément, mais encore à vérifier l'instrument, en ce que, par le moyen de la glace, on pourra juger si le stile est bien perpendiculaire, ce qu'on connoitra quand son image dans la glace paroîtra dans l'alignement du stile prolongé, faute de quoi, & pour peu que le stile ne soit pas bien perpendiculaire à la glace, l'image du stile paroitra faire avec lui un angle très sensible à la vue.

Il est évident qu'un instrument ainsi construit ne demande qu'un Observateur. On y voit d'un coup d'œil à quel degré de l'horizon le Soleil se leve ou se couche, par l'ombre du stile sur le rebord vertical, comme on voit l'heure à un cadran. Le Vaisseau pendant ce tems peut virer & présenter successivement ses diverses parties au Soleil, l'Aiguille de la Bouffole, si elle est bien libre sur son pivot, conservera pendant ce tems la même direction, & le rebord vertical ne faisant qu'un tout avec la rose, l'ombre marquera toujours le même degré sur le rebord. C'est le premier avantage de la nouvelle construction.

Le second consiste en ce que l'on peut observer la variation à toutes les heures, à moins que le Soleil ne soit au Zénith (moment unique, & pour lequel toutes les méthodes se trouvent en défaut); le reste du tems l'observation se peut faire avec la même commodité que si le Soleil étoit à l'horizon, & avec bien plus de justesse qu'avec les Compas ordinaires, puisque les sources inévitables d'une erreur de 5 & 6 degrés, causées par la proximité nécessaire du fil horizontal & de
la

la chape, que M. Bouguer a démontrées *, ne se trouvent plus dans la nouvelle construction, où le stile une fois bien fixé au centre de la rose, indiquera par le degré que l'ombre marquera sur la circonférence de la rose, l'azimuth actuel du Soleil. J'entends l'azimuth apparent ou magnétique, dont la différence à l'azimuth vrai donnera la quantité de la variation.

Il est vrai que la méthode ordinaire pour trouver l'azimuth vrai, suppose la hauteur de l'astre & la latitude du lieu connues, & que le calcul en est long & difficile; mais ce point est absolument étranger à mon objet, & cet inconvénient est commun à toutes les manières d'observer la variation. D'ailleurs, M. Bouguer dans son Mémoire donne les moyens d'abrégier, & en quelques cas de se passer du calcul de l'azimuth vrai.

Il est vrai aussi qu'il y a une autre méthode pour observer la variation avec le Compas ordinaire, le Soleil étant élevé sur l'horizon, sans se servir de l'ombre du fil horizontal, par le moyen d'un stile à plomb sur le bord de la boîte: cette méthode est exempte de l'erreur dont on vient de parler; mais outre quelques inconvéniens particuliers, elle retombe dans celui d'exiger deux Observateurs, dont le nouveau Compas est affranchi. Ainsi il conserve même dans ce cas son avantage.

A mesure que le Soleil monte sur l'horizon, l'ombre du stile se raccourcit, & pourroit à la fin tomber au dedans de l'espace cir-

cu-

* *Ibid.* p. 11. & 12.

culaire BD , FH , retranché au milieu de la rose : c'est pourquoi il faut prendre la précaution de tenir le rayon PE du cercle évuidé, plus court que l'ombre du stile à la plus grande hauteur du Soleil dans le partage où l'on navige. On se procurera, par ce moyen, la facilité de pouvoir observer la variation même à midi ; mais tout le reste étant égal, il est clair que plus l'ombre du stile approche de la circonférence de la rose, plus l'observation sera exacte. Ainsi midi sera toujours le moment le moins favorable quand le Soleil aura plus de 45 degrés de hauteur.

On objectera peut-être, que dans la nouvelle construction, l'observation ne se faisant que par le moyen de l'ombre du stile, l'usage de l'instrument est borné au Soleil seulement, au-lieu qu'avec l'ancien on peut connoître la variation par le moyen des autres astres. A cela je répons, premièrement, que cette objection ne regarde pas du moins la Lune, puisqu'on peut à sa lueur distinguer l'ombre du stile, sur-tout sur un papier blanc, tel que le rebord vertical. Quant aux autres Planètes, & aux Etoiles fixes, c'est ou à l'horizon, ou quand ces astres ont quelque hauteur, qu'on suppose que l'observation se peut faire avec le Compas ordinaire. Au premier cas, il est si rare qu'on ne perde pas de vue une Etoile ou une Planète dans les vapeurs de l'horizon, que ce point n'est presque d'aucune conséquence. En second lieu, si l'on suppose l'astre élevé sur l'horizon, l'observation, toute défectueuse qu'elle est, ne se peut faire avec l'instrument ordinaire, que
par

par le concours & le concert de deux Observateurs ; ajoutez-y pour le cas présent, qu'il faut qu'un des deux borne l'horizon, ce qui est très peu sûr la nuit, & presque toujours impraticable.

Je ne parle point des Tables de Déclinaison de toutes les Planètes, & pour tous les jours de l'année, qui deviendroient nécessaires pour trouver la variation par l'observation des Planètes ; ce qui supposeroit une connoissance de la Théorie de tous leurs mouvemens, plus exacte que nous ne l'avons, du moins à l'égard de la Lune. Toutes ces difficultés rassemblées font, & cette raison est décisive, qu'il est très rare, pour ne point dire qu'il n'est point du tout d'usage, d'observer la variation autrement que par le Soleil. Du moins ce n'est qu'à son défaut, & très rarement, qu'on a recours aux Etoiles. Et comme il suffit désormais, pour faire usage utilement de l'instrument, que le Soleil se montre seulement une fois dans la journée, la facilité que donne la nouvelle construction d'observer à toutes les heures du jour, est plus que suffisante pour dédommager du défaut d'observation des autres Astres, quand on y perdoit réellement quelque chose.

Je finis par une réflexion propre à donner au nouveau Compas encore plus de simplicité dans sa construction. On a vu par ce qui précède, que le rebord vertical n'a été ajouté sur la circonférence du plan de la Boussole, que pour recevoir sur ce bord l'ombre du stile, au moment où le Soleil est à l'horizon, tems auquel cette ombre devient im-

per-

perceptible sur un plan horizontal. Et comme ce moment est celui de l'observation de la variation, telle qu'elle est communément pratiquée par les Marins, nous n'avons pas voulu priver notre instrument de l'usage le plus ordinaire des autres Compas de Variations; mais si l'on fait attention que lorsque le Soleil paroît être à l'horizon, il est réellement au-dessous, & qu'il est plus à propos, pour corriger l'erreur de la réfraction, ainsi que M. Bouguer l'a démontré dans l'Ouvrage déjà cité, de prendre pour faire l'observation, le moment où le Soleil est dans l'horizon rationnel, ou environ un demi-degré au-dessus de l'horizon sensible, que d'apporter quelques modifications aux Tables d'amplitudes, on n'aura plus besoin du rebord vertical, puisque lorsque le rebord inférieur du disque du Soleil paroît élevé au-dessus de l'horizon d'environ un demi-diamètre, ce qui est à peu près le tems où le centre est dans l'horizon rationnel, cette hauteur est suffisante pour que l'ombre du stile vertical soit sensible sur le plan horizontal. Ainsi, quoique l'expérience ait prouvé que le rebord vertical fait très bien son effet, & n'apporte aucun inconvénient à l'usage du nouveau Compas, si l'on trouve quelque difficulté par rapport à sa construction dans l'addition de ce rebord, on peut le supprimer entièrement, sans que l'instrument perde beaucoup de son utilité. Il faudra seulement alors faire l'observation à l'horizon, suivant la méthode prescrite par M. Bouguer, qui, d'ailleurs, a été jugée la plus avantageuse.

En ce cas, le changement à faire au Compas

pas de Variation ordinaire, pour lui procurer tous les avantages de celui que nous proposons, est si peu considérable, qu'il y a lieu d'espérer que l'instrument proposé n'aura pas le malheur de paroître nouveau, & que la prévention ordinaire contre les nouveautés n'empêchera pas d'en faire l'expérience.

Je n'ai point parlé de la suspension de l'instrument, n'ayant rien changé à celle qui est en usage, à quelques attentions près, pour le rendre plus libre sur ses pivots. Au-lieu d'une boîte quarrée & de bois, j'ai fait la boîte intérieure de cuivre, & ronde; elle en occupe moins de place, & n'est pas sujette à se déformer: le fond de l'écuelle de cuivre est percé en *T*, d'un trou rond qui se ferme par une plaque ronde *TV*, qui débordé le trou; cette plaque est chargée de plomb en dedans, & traversée, ainsi que la masse de plomb, par une vis *X* qui a du jeu dans le trou *T*; on n'arrête cette vis que lorsque la rose est bien horizontale & parallèle aux bords de la boîte, & le stile bien vertical. On peut s'en assurer à Terre par le moyen d'un niveau, & d'un fil à plomb; & à la Mer, en tenant la Bouffole à la main, & faisant raser l'horizon par son bord supérieur, ce que M. Bouguer a jugé la meilleure méthode: en même tems pour s'assurer que le stile est bien vertical, on verra s'il convient avec la vive-arête de la petite baguette quarrée *LB*, placée à l'angle *B* de la boîte extérieure & mobile dans une coulisse tout exprès pour cet usage: *Q* est le fond de la boîte extérieure qui se tire à coulisse, afin d'avoir la liberté de changer
la





la vis *X*, si le centre de la machine se trouvoit dérangé.



QUATRIEME MEMOIRE

SUR L'ELECTRICITÉ.

Par M. DU FAY.

De l'Attraction & Répulsion des Corps Electriques.

NOUS avons toujours considéré jusqu'à présent la vertu électrique en général, & sous ce mot on a entendu non seulement la vertu qu'ont les corps électriques d'attirer, mais aussi celle de repousser les corps qu'ils ont attirés. Cette répulsion n'est pas toujours constante, & elle est sujette à des variétés qui m'ont engagé à l'examiner avec soin; & je crois avoir découvert quelques principes très simples qu'on n'avoit point encore soupçonnés, & qui rendent raison de toutes ces variétés, en sorte que je ne connois jusqu'à présent aucune expérience qui ne s'y accorde très naturellement.

J'avois observé que les corps légers n'étoient ordinairement repoussés par le tube, que lorsque l'on en approchoit quelque corps d'un volume un peu considérable; & cela me faisoit penser que ces derniers corps étoient rendus électriques par l'approche du tube, & qu'alors ils attiroient à leur tour le duvet, ou la feuille d'or, & qu'ainsi il étoit toujours at-

attiré, soit par le tube, soit par les corps voisins, mais qu'il n'y avoit jamais de répulsion réelle.

Une expérience que M. de Reaumur m'indiqua, s'opposoit à cette explication; elle consiste à poser au bord d'une carte un petit monceau de poudre à mettre sur l'écriture; on approche de ce monceau un bâton de cire d'Espagne rendu électrique, & on voit très clairement qu'il chasse au-delà de la carte des particules de poudre, sans qu'on puisse soupçonner qu'elles soient attirées par aucun corps voisin.

Une autre expérience aussi simple, & encore plus sensible, acheva de me prouver que ma conjecture étoit fautive. Si l'on met des feuilles d'or sur une glace, & que l'on approche le tube par dessous, les feuilles sont chassées en haut sans retomber sur la glace, & on ne peut certainement expliquer ce mouvement par l'attraction d'aucun corps voisin. La même chose arrive à travers la gaze de couleur, & les autres corps qui laissent passer les écoulemens électriques; en sorte qu'on ne peut pas douter qu'il n'y ait une répulsion réelle dans l'action des corps électriques.

Enfin ayant réfléchi sur ce que les corps les moins électriques par eux-mêmes étoient plus vivement attirés que les autres, j'ai imaginé que le corps électrique attiroit peut-être tous ceux qui ne le sont point, & repoussoit tous ceux qui le sont devenus par son approche, & par la communication de sa vertu.

Otto de Guericke rapporte une expérience

cc

ce que j'ai citée dans mon premier Mémoire, mais à laquelle je n'avois jamais pu réussir ; elle consiste à promener dans une chambre une plume par le moyen d'une boule de souphre rendue électrique, sans que la plume approche de la boule : le peu de succès que j'avois eu, venoit de ce que l'expérience n'est pas assez détaillée, ou de ce que je ne l'avois pas bien comprise. Hauksbee parle aussi de cette expérience qu'il a faite avec un tube de verre ; c'est de cette manière que j'ai réussi, & on va voir qu'elle est assez singulière pour mériter qu'on y fasse attention.

On frotte bien le tube pour le rendre électrique, & le tenant dans une situation horizontale, on laisse tomber au dessus une parcelle de feuille d'or ; cette feuille présente ordinairement la tranche, si le tube est bien électrique, parce que de cette manière elle fend l'air avec plus de facilité ; & si-tôt qu'elle a touché le tube, elle est repoussée en-haut perpendiculairement à la distance de huit ou dix pouces ; elle demeure presque immobile en cet endroit, & si on en approche le tube en l'élevant, elle s'élève aussi, en sorte qu'elle s'en tient toujours dans le même éloignement, & qu'il est impossible de l'y faire toucher : on peut la conduire où l'on veut de la sorte, parce qu'elle évitera toujours le tube.

Si l'on fait durer l'expérience pendant cinq ou six minutes, la feuille s'approchera insensiblement du tube, & enfin elle tombera dessus ; mais si-tôt qu'elle l'aura touché, elle s'en éloignera avec une nouvelle force, &

con-

continuera le même jeu tant que le tube conserva son électricité. Il est à observer que par la distance à laquelle la feuille se tient éloignée du tube, on peut juger de l'étendue du tourbillon électrique, & que conduisant la feuille au dessus de toutes les parties du tube, soit en le tournant sur son axe, soit en le mettant dans une situation verticale, on peut se former l'image des limites du tourbillon, ou plutôt celle de la couche du tourbillon qui a assez de force pour résister au poids de la feuille ; car, si l'on en prend de très petits fragmens, on voit qu'ils se soutiennent à une beaucoup plus grande distance que les autres.

J'ai même remarqué un fait très curieux, qui prouve que la feuille se tient toujours dans certaines couches du tourbillon, & qui montre en même tems la facilité avec laquelle la forme du tourbillon change, lorsqu'il y a des corps non électriques dans le voisinage du tube. Le voici : tandis que la feuille d'or est chassée par le tube, & qu'elle voltige en l'air, si on tient le tube dans une situation verticale, & qu'on le frotte pour augmenter son électricité, la feuille d'or suspendue au-dessus s'élève & s'abaisse en suivant le mouvement de la main qui se fait alors de haut en bas, & chaque fois qu'en élevant la main, on l'approche de l'extrémité supérieure du tube, la feuille s'en approche, & au contraire, elle s'en éloigne si-tôt que la main redescend.

Si l'on tient assez longtems la main vers le bout supérieur du tube pour donner à la feuille

le

le d'or le tems de tomber dessus, elle s'y attache ; mais lorsqu'on redescend la main, elle s'élance tout-à-coup en l'air, & s'éloigne du tube comme auparavant.

L'explication de tous ces faits est bien simple, en supposant le principe que je viens d'avancer ; car, dans la première expérience, lorsqu'on laisse tomber la feuille sur le tube, il attire vivement cette feuille qui n'est nullement électrique ; mais dès qu'elle a touché le tube, ou qu'elle l'a seulement approché, elle est rendue électrique elle-même, & par conséquent elle en est repoussée, & s'entient toujours éloignée, jusqu'à ce que le petit tourbillon électrique qu'elle avoit contracté soit dissipé, ou du moins considérablement diminué ; n'étant plus repoussée alors, elle retombe sur le tube où elle reprend un nouveau tourbillon, & par conséquent de nouvelles forces pour l'éviter, ce qui continuera tant que le tube conservera sa vertu. Si le tube n'a qu'une vertu médiocre, & qu'on se serve d'un duvet, ou d'un morceau de coton, il arrive quelquefois qu'il ne les repousse pas, parce qu'ils s'y attachent par leurs petits filamens, & que le tourbillon qu'il leur communique n'a point assez de force pour les faire détacher du tube ; mais la raison en est sensible, & l'expérience ne manquera jamais de réussir, comme nous l'avons décrite, si le tube est bien électrique.

A l'égard de la seconde expérience, l'explication en est aussi naturelle ; la feuille rendue électrique est repoussée par le tube, tant qu'il est entouré lui-même d'un tourbillon

Mém. 1733.

E c

élec-

électrique; mais, lorsque la main touche au bout supérieur du tube, ce tourbillon se communique au bras, & au corps, & est détourné du tube, par conséquent la feuille n'étant plus repoussée; retombe par son propre poids sur le tube: si ensuite on abaisse la main en la ramenant vers le bout inférieur du tube, on lui rend son électricité, & le tourbillon se trouve rétabli dans son étendue ordinaire; il doit donc repousser la feuille en haut comme il faisoit auparavant, & ces mouvemens alternatifs doivent continuer tant que l'on frottera le tube en élevant, & en abaissant la main.

J'ajouterai encore une observation curieuse, & qui donne un nouveau jour à cette hypothèse. Si, tandis que la feuille d'or se tient suspendue au-dessus du tube, après en avoir été repoussée, on approche de cette feuille le doigt, ou tout autre corps de quelque volume, elle va s'y appliquer sur le champ, & de là retombe sur le tube où elle acquiert un nouveau tourbillon électrique, & elle est repoussée sur le champ à la distance où elle étoit auparavant. Si on en rapproche une seconde fois le même corps, ou tout autre, elle va de nouveau s'y appliquer, & recommence les mêmes mouvemens de ce corps au tube, & du tube en l'air, autant de tems que dure l'électricité du tube.

Il est aisé de voir combien cette expérience s'accorde avec l'hypothèse; car la feuille d'or étant devenue électrique par l'approche du tube, elle va se joindre aux corps qui sont dans son voisinage, ainsi qu'il arrive à
tous

tous les corps électriques qui ont plus de légèreté que ceux auxquels ils tendent à s'appliquer. Si-tôt que la feuille a touché ce corps, elle lui transmet toute son électricité, & par conséquent, s'en trouvant dénuée, elle tombe sur le tube par lequel elle est attirée, de même qu'elle l'étoit avant que de l'avoir touché; elle y acquiert un nouveau tourbillon électrique qu'elle perd ensuite, si elle touche le corps une seconde fois, ce qui doit continuer tant qu'il subsistera dans le tube assez de vertu pour lui en communiquer une quantité capable de surmonter sa pesanteur, après quoi elle demeurera adhérente au tube qui n'aura plus assez de force pour la chasser. On voit avec quelle facilité ces conséquences suivent du principe que nous avons supposé, & quelle clarté il jette sur toutes ces expériences.

Si l'on se rappelle maintenant les faits que j'ai rapportés à la fin de mon troisième Mémoire, on verra qu'ils trouvent ici leur explication. Lorsque je suis suspendu sur les cordes de soie, & que je tiens à ma main le carton où sont posées les feuilles d'or, il est tout simple que mon autre main, ou mon visage que je présenterai au-dessus, ne les attire point, puisqu'elles sont devenues électriques elles-mêmes par la communication de ma main au carton que je tiens, & sur lequel elles sont posées; ainsi toutes les autres parties de mon corps, qui sont également électriques, tendroient plutôt à les repousser, si elles n'étoient pas soutenues, qu'à les attirer: mais si une autre personne, qui se fera

tenue éloignée de moi, & dont par conséquent la main n'est point électrique, vient à la poser au-dessus de ces feuilles, elles y voleront sur le champ, & y déposeront leur électricité, après quoi elles retomberont sur le carton où elles en reprendront une nouvelle, & ainsi elles continueront de se mouvoir comme elles feroient au-dessus du tube même.

Lorsqu'ayant le bras étendu, je tiens à la main le carton où sont les feuilles, & qu'on approche de moi le tube rendu électrique, il ne se communique pas toujours assez de vertu au carton pour qu'il puisse repousser les feuilles en l'air; mais, si je veux que cela arrive, je n'ai qu'à faire entrer le carton un peu plus avant dans le tourbillon électrique qui m'environne, en l'approchant de mon visage, ou de mon corps; il y acquiert une vertu plus considérable, &, si-tôt que je le fais sortir du tourbillon en étendant le bras, elles fuyent le carton, & s'élancent en l'air d'elles-mêmes; on les conduit de la sorte où l'on veut, & elles sont précisément dans le cas de la feuille soutenue par le tube.

Il ne reste plus rien d'étonnant dans ces mouvemens qui paroissent si singuliers de ces feuilles ou duvets, sur lesquels on passe le tube; il les attire tous d'abord, quelques-uns s'y attachent de sorte par leurs filamens qu'ils ne peuvent plus être repoussés, quoiqu'ils soient dans le cas de l'être par l'électricité qu'ils ont contractée; ceux à qui cet accident n'arrive point sont chassés par le tube, & venant à s'approcher de la table, ou
des

des corps voisins, ils vont s'y appliquer, & y déposent leur électricité; ils sont ensuite nécessairement attirés une seconde fois, puisqu'ils ne sont plus électriques; de-là ces mouvemens, bizarres en apparence, d'attraction & de répulsion qui paroissent si difficiles à expliquer, & qui néanmoins le peuvent être, comme on le voit, par un principe bien simple, & qui n'implique aucune contradiction.

Si au-lieu de feuilles d'or, ou de duvet, on se servoit de petits flocons de soye de couleur; comme elle est fort électrique par elle-même, il arriveroit des variétés qui dépendroient de ce qu'elle seroit plus ou moins sèche, ou de ce qu'elle auroit été plus ou moins maniée dans les doigts: mais l'explication de ces variétés tient à d'autres principes, dont nous parlerons dans un moment; qu'il suffise, quant à présent, de dire que rien ne réussit mieux dans les expériences que nous venons de rapporter, qu'une feuille d'or très petite, une parcelle de coton, ou un petit morceau de duvet.

Pour confirmer de plus en plus mon hypothèse, je remarquerai qu'elle donne aussi l'explication du monde la plus simple, de la fameuse expérience de M. Hauksbee, que j'ai rapportée dans mon premier Mémoire: elle consiste à faire tourner rapidement sur son axe un globe de verre, que l'on rend électrique en posant la main dessus pendant qu'il tourne; alors des fils qu'on a placés au-dedans de ce globe, s'étendent en soleil du centre à la circonférence: dans cet état, & lorsque

le globe est arrêté, si l'on approche extérieurement les doigts du globe, les fils du dedans s'en éloignent, & fuyent très sensiblement le doigt, de quelque côté que l'on le porte. On voit maintenant que cela vient de ce que le doigt est rendu électrique par le voisinage du globe, & que par conséquent il doit repousser ces fils qui le sont aussi: la même chose se doit dire encore de ceux qui, dans la même expérience, sont placés extérieurement autour du globe. Enfin, les uns & les autres font encore un effet que je ne sai si d'autres ont remarqué avant moi, mais qui s'accorde parfaitement avec le même principe; c'est que les bouts de chacun de ces fils se divisent d'eux-mêmes en petits filets, qui s'écartent les uns des autres en forme de balai, ce qui dure autant que leur électricité subsiste, après quoi ils retournent dans leur état ordinaire. Il est clair qu'étant devenus électriques par la proximité des parois du globe, ils doivent se repousser les uns les autres, & tendre à s'écarter le plus qu'il leur est possible. Cette explication est si naturelle, qu'il seroit inutile d'entrer dans un plus grand détail.

On peut me demander pourquoi ces fils ne sont pas repoussés par les parois du globe même, puisque je les suppose devenus électriques, & que par mon principe ils le doivent être comme la feuille d'or l'est par le tube? Mais je réponds, que la vertu électrique étant répandue dans toute la surface du globe, elle n'en a point assez en aucun de ces points pour repousser les fils; mais lorsqu'on
en

en approche le doigt, ou quelque autre corps non électrique, le tourbillon se réunit autour du corps, & pour-lors atteint jusqu'aux fils du dedans qu'il chasse, & qu'il force à s'éloigner, de même que la feuille d'or dans la première expérience que nous avons rapportée; & même nous avons vu dans la seconde, qu'elle tend vers le tube, au-lieu d'en être repoussée, lorsque par l'approche de la main on a détourné une partie du tourbillon électrique du tube. Il demeure donc pour constant, que les corps devenus électriques par communication, sont chassés par ceux qui les ont rendus électriques; mais le sont-ils de même par les autres corps électriques de tous les genres? & les corps électriques ne différent-ils entre eux que par les divers degrés d'électricité? Cet examen m'a conduit à une autre vérité que je n'aurois jamais soupçonnée, & dont je crois que personne n'a encore eu la moindre idée.

J'ai commencé par soutenir en l'air avec le même tube, deux feuilles d'or, & elles se sont toujours éloignées l'une de l'autre, quelques efforts que j'aye faits pour les rapprocher; & cela devoit arriver de la sorte, puisqu'elles étoient toutes deux électriques: mais si-tôt que l'une des deux avoit touché la main ou quelque autre corps, elles se joignoient sur le champ l'une à l'autre, parce que celle-ci ayant perdu son électricité, l'autre l'attiroit & tendoit vers elle: tout cela s'accordoit parfaitement avec mon hypothèse. Mais ce qui me déconcerta prodigieusement, fut l'expérience suivante.

Ec 4

Ayant

Ayant élevé en l'air une feuille d'or par le moyen du tube, j'en approchai un morceau de gomme copal frottée, & rendue électrique : la feuille fut s'y appliquer sur le champ, & y demeura. J'avoue que je m'attendois à un effet tout contraire, parce que, selon mon raisonnement, la copal qui étoit électrique devoit repousser la feuille qui l'étoit aussi. Je répétai l'expérience un grand nombre de fois, croyant que je ne présentois pas à la feuille l'endroit qui avoit été frotté, qu'ainsi elle ne s'y portoit que comme elle auroit fait à mon doigt, ou à tout autre corps : mais ayant pris sur cela mes mesures, de façon à ne me laisser aucun doute, je fus bien convaincu, que la copal attiroit la feuille d'or, quoiqu'elle fût repoussée par le tube : la même chose arrivoit en approchant de la feuille d'or un morceau d'ambre, ou de cire d'Espagne, frotté.

Après plusieurs autres tentatives qui ne me satisfaisoient aucunement, j'approchai de la feuille d'or chassée par le tube, une boule de crystal de roche frottée & rendue électrique; elle repoussa cette feuille de même que le tube. Un autre tube que je fis présenter à la même feuille la chassa de même. Enfin je ne pus pas douter que le verre & le crystal de roche ne fissent précisément le contraire de la gomme copal, de l'ambre & de la cire d'Espagne, en sorte que la feuille repoussée par les uns, à cause de l'électricité qu'elle avoit contractée, étoit attirée par les autres. Cela me fit penser qu'il y avoit peut-être deux genres d'électricité differens, & je fus bien

bien confirmé dans cette idée par les expériences suivantes.

Je pris un gros morceau de gomme copal, & l'ayant rendu électrique, je laissai tomber dessus une très petite feuille d'or; elle en fut d'abord attirée, puis elle fut chassée en-haut comme il arrive avec le tube, mais avec cette différence, qu'elle ne s'en éloignoit que d'environ quatre pouces, le tourbillon n'étant pas à beaucoup près aussi étendu que celui du tube; ce qui peut venir de la différence du volume de l'un & de l'autre: mais ce n'est pas ici le lieu d'examiner cette question. Je dois encore ajouter, que l'expérience n'est pas aussi aisée à faire qu'avec le tube, parce qu'ayant moins de vertu, la feuille en est difficilement repoussée, & qu'elle y demeure très souvent appliquée, en sorte qu'il faut souffler fortement dessus pour la détacher; elle en est repoussée alors, & l'expérience se fait comme avec le tube. On juge bien qu'il ne la faut pas détacher de la gomme avec les doigts, parce qu'on lui ôte l'électricité qu'elle a acquise, & qu'elle se trouve alors dans le cas de tout autre morceau de feuille qu'on y présenteroit: le meilleur est donc de souffler dessus pour la détacher, ou de prendre une portion de feuille extrêmement petite, & alors elle sera repoussée par la gomme copal comme par le tube. Ce détail étoit nécessaire pour ne pas rebuter ceux qui voudroient faire ces expériences, & qui y rencontreroient toutes ces petites difficultés.

Lors donc que la feuille d'or est repoussée & soutenue en l'air par un morceau de gomme

me copal, si on approche de cette feuille un autre morceau de la même gomme aussi frotté, elle le chassera aussi sans qu'il soit possible de l'y faire toucher; la même chose arrivera avec un morceau d'ambre, & avec la cire d'Espagne: & au contraire, une boule de crystal, ou un tube de verre l'attireront très vivement, ce qui est précisément l'inverse de ce que nous venons de voir, qui arrive lorsque la feuille est chassée par le tube. Il résulte donc de ces deux expériences, que la feuille rendue électrique & chassée par le verre, est attirée par les matieres résineuses; & que celle qui est repoussée par les matieres résineuses, est attirée par le verre & le crystal.

J'ai voulu voir si ces deux différentes natures d'électricité ne souffriroient point de changement en les transmettant à des corps qui ne sont point naturellement électriques. J'ai dit dans mon second Mémoire, que tous les corps, sans exception, étant posés sur un guéridon, ou pied de verre un peu élevé, devenoient électriques par l'approche du tube, & conservoient assez longtems leur électricité. J'ai donc attaché sur un petit guéridon de verre une boule d'yvoire, avec de la cire d'Espagne, & je l'ai rendue électrique en passant le tube autour & par dessus; ayant ensuite fait repousser une feuille d'or par le tube, j'ai présenté à la feuille cette boule qui l'a repoussée presque aussi vivement qu'auroit fait un autre tube, ou la boule de crystal; cette boule d'yvoire, au contraire, attirera une feuille repoussée par la gomme copal, en
for-

forte qu'elle fit précisément les mêmes effets qu'auroit fait un verre électrique.

Quelque tems après, & lorsque la vertu de la boule fut entièrement dissipée, je la rendis électrique par l'approche d'un morceau de copal: elle fit alors les mêmes effets que la copal, & précisément le contraire de ce qu'elle venoit de faire, c'est-à-dire, qu'elle attira la feuille repoussée par le tube, & qu'elle repoussa celle qui l'étoit par la gomme copal, l'ambre & la cire d'Espagne, car ces trois matieres font absolument le même effet; j'ai répété les mêmes expériences avec chacune d'elles l'une après l'autre, & j'ai fait la même chose avec différentes especes de verre, & avec le crystal de roche.

Voilà donc constamment deux électricités d'une nature toute différente, savoir, celle des corps transparens & solides, comme le verre, le crystal, &c. & celle des corps bitumineux ou résineux, comme l'ambre, la gomme copal, la cire d'Espagne, &c. Les uns & les autres repoussent les corps qui ont contracté une électricité de même nature que la leur, & ils attirent, au contraire, ceux dont l'électricité est d'une nature différente de la leur. On vient de voir même que les corps qui ne sont pas actuellement électriques, peuvent acquérir chacune de ces électricités, & qu'alors leurs effets sont pareils à ceux des corps qui la leur ont communiquée.

Pour peu que l'on fasse réflexion aux faits que nous venons de rapporter, on en conclura que le verre doit repousser le verre,

& attirer l'ambre, & réciproquement: mais si cela étoit vrai, auroit-on été si longtems fans s'en appercevoir? Cela est vrai cependant, & jusqu'à présent personne ne s'est avisé de le soupçonner: j'ai même eu bien de la peine à m'en assurer, non-seulement après y avoir pensé, mais même en étant presque certain par les conséquences qui me paroissent suivre nécessairement de ce que nous venons de voir. Sans m'arrêter aux difficultés que j'ai rencontrées, voici de quelle manière je m'en suis assuré; & l'expérience est si facile, que chacun peut la faire avec très peu de peine.

J'ai pris une règle de bois fort mince, longue d'un pied & demi, & large d'un pouce; j'y ai fait dans le milieu un trou d'environ six lignes de diametre, & j'ai ajusté d'un côté de la règle & au-dessus de ce trou, une espece de chape, comme celle d'une aiguille aimantée; cette chape n'étoit autre chose que le bout fermé d'un tube de verre, en forme d'un très petit dé à coudre, & même c'est ce qu'il y a de meilleur, parce que le frottement en est plus doux. Cette règle ainsi préparée, ou cette espece d'aiguille, étoit posée sur un pivot de fer très aigu, & par conséquent la moindre force étoit suffisante pour la mettre en mouvement. C'est-là tout ce que j'ai trouvé de plus commode pour les expériences que je vais décrire; & quelque simple que soit cette machine, je me ferois épargné bien des peines, si je l'avois imaginée d'abord.

Ayant mis un poids suffisant sur un des bouts

bouts de cette règle, je posai sur l'autre un morceau de copal, en sorte qu'il fût en équilibre avec ce poids, ce qui est fort aisé avec cette règle, puisqu'il n'y a qu'à avancer ou reculer le poids. J'avois frotté un côté de ce morceau de copal pour le rendre électrique; j'en approchai alors un autre morceau de copal que j'avois aussi rendu électrique; il le repoussa sur le champ : l'ambre & la cire d'Espagne firent la même chose; le tube, au contraire, & la boule de crystal l'attirerent vivement.

Comme le morceau de copal qui étoit posé sur la règle, n'avoit été frotté que d'un côté, si j'approchois d'une partie de ce morceau de copal qui n'avoit point été frottée, l'ambre ou les autres corps semblables, ils l'attiroient, au-lieu de le repousser, de même qu'ils auroient fait tout autre corps, de quelque nature que ce fût. Ainsi c'est toujours à la partie rendue électrique qu'il faut présenter l'ambre ou le verre. Il faut encore observer de se servir d'un corps électrique de peu de volume, pour présenter à celui qui est suspendu sur la règle; car lorsque j'ai voulu me servir du tube, l'attraction qu'il exerçoit sur le bout de la règle étoit plus considérable que sa force pour repousser le corps qui étoit dessus, & qui étoit de nature à être repoussé, ce qui empêchoit l'expérience de réussir; mais en prenant bien toutes ces petites précautions auxquelles on ne pense pas d'abord, & que le besoin seul fait imaginer, il arrivera toujours constamment que le verre électrique repoussera le verre électrique, & tous les

corps d'une pareille nature d'électricité, soit qu'ils soient tels par eux-mêmes, ou qu'ils le soient devenus par l'approche du verre; le verre au contraire attirera tous les corps dont l'électricité est de la nature de celle de l'ambre. L'ambre & les autres corps semblables feront les mêmes effets, ils repousseront les corps de même électricité qu'eux, & attireront ceux qui sont doués de l'autre électricité.

Voilà donc deux électricités bien démontrées, & je ne puis me dispenser de leur donner des noms differens pour éviter la confusion des termes, ou l'embarras de définir à chaque instant celle dont je voudrai parler; j'appellerai donc l'une l'*électricité vitrée*, & l'autre l'*électricité résineuse*: non que je pense qu'il n'y a que les corps de la nature du verre qui soient doués de l'une, & les matieres résineuses de l'autre, car j'ai déjà de fortes preuves du contraire; mais c'est parce que le verre & la copal sont les deux matieres qui m'ont donné lieu de découvrir ces deux différentes électricités.

S'il n'y a dans la Nature que ces deux especes d'électricités, ce qui me paroît assez vrai-semblable, car l'une attirant ce que l'autre repousse, je n'imagine pas trop quel effet pourroit faire une troisieme; si, dis-je, il n'y a que ces deux-là, il doit résulter que tous les corps qui sont dans la Nature, à l'exception des métaux, seront dans l'une ou l'autre de ces deux classes, puisque nous avons vu dans mon second Mémoire, qu'ils étoient tous susceptibles d'électricité par eux-mêmes:

ainsi.

ainsi les uns seront dans celle de l'électricité vitrée, & les autres dans celle de l'électricité résineuse. Rien ne sera plus facile que d'en faire l'épreuve, & peut-être cette nouvelle distinction dans les corps donnera-t-elle quelques lumières pour mieux connoître leur nature.

Pour juger donc quelle est l'espèce d'électricité d'un corps quelconque, il n'y a qu'à le rendre électrique, & lui présenter l'un après l'autre un morceau de verre & un morceau d'ambre; il sera certainement attiré par l'un, & repoussé par l'autre: si c'est un corps pesant, on le posera pour cet effet sur l'aiguille ou règle de bois dont nous venons de parler: sinon, on le tiendra suspendu à la main, ou de toute autre manière qu'on jugera plus commode.

J'ai voulu voir, par exemple, de quelle nature étoit l'électricité de la soye. J'ai pris un ruban de soye, je l'ai chauffé légèrement, & le tenant d'une main, je l'ai passé deux ou trois fois avec vitesse dans les doigts de l'autre main; ayant pendant ce tems-là fait frotter un tube, je l'ai présenté au ruban qu'il a attiré très vivement; l'ambre, au contraire, la cire d'Espagne, & la copal l'ont repoussé. J'ai observé de chauffer le ruban, premièrement, parce que cela le dispose mieux à devenir électrique; & secondement, parce qu'il n'importe alors de quelle couleur il soit, au-lieu que sans cette précaution, cela peut causer des variétés, comme on le peut voir dans mon troisième Mémoire. L'électricité de
la

la foye est donc de la nature de celle que nous avons appelée *résineuse*.

J'ai fait la même expérience avec une petite bande de toile, je l'ai chauffée & passée dans les doigts, elle est devenue électrique; ce qu'il est aisé de reconnoître, parce qu'elle va s'attacher aux doigts, & à tous les corps qu'on lui présente: l'ambre l'a repoussée alors, & le verre l'a attirée; c'est donc encore la même électricité que celle de la foye, ou l'électricité *résineuse*. La même chose est arrivée avec une bande de papier chauffée & passée de même dans les doigts, le tube l'a attirée, & l'ambre l'a repoussée.

J'ai approché l'un de l'autre le ruban de foye, & la bande de toile, après les avoir chauffés, & rendus électriques en les passant dans les doigts; ils se sont repoussés l'un l'autre; & au contraire, ils alloient s'appliquer vivement à tous les autres corps qu'ils rencontroient qui n'étoient point électriques, ou qui ne l'étoient que de l'électricité vitrée. Tous ces faits se déduisent nécessairement des principes que nous avons posés, & aucun d'eux ne souffre la moindre difficulté dans l'explication.

Voyons maintenant quelques exemples des corps qui ont l'espece d'électricité que nous avons appelée *vitrée*. J'ai pris deux ou trois aiguillées de laine, & après les avoir chauffées, je les ai passées à plusieurs reprises dans la main garnie d'un morceau d'étoffe de laine; elles sont devenues électriques, ce qui se reconnoit à ce qu'elles s'approchent de la main. J'y ai ensuite présenté un morceau de

de verre frotté, qui les a repoussées; & au contraire, elles ont été attirées par l'ambre & la gomme copal. Une grande plume que j'ai chauffée & frottée de même, a fait le même effet en la tenant suspendue par une de ses barbes les plus déliées.

J'ai chauffé légèrement un manchon de petit-gris, & ayant passé brusquement la main dessus, à plusieurs reprises, les poils sont devenus électriques; ils ont été attirés par l'ambre, & repoussés par le verre. Mais rien ne fait un effet plus sensible que le poil du dos d'un chat vivant. On sait qu'il devient fort électrique en passant la main dessus; si on en approche alors un morceau d'ambre frotté, il en est vivement attiré, & on le voit s'élever vers l'ambre en très grande quantité; si, au contraire, on en approche le tube, il est repoussé & couché sur le corps de l'animal.

On seroit tenté de croire par ce petit nombre d'exemples, que toutes les matieres animales ont l'électricité vitrée, & les matieres végétales la résineuse: mais je ne crois pas cette loi si générale, & nous venons de voir que la soye, qui ne peut être rangée que dans la classe des matieres animales, est celle de toutes qui est la plus susceptible de l'électricité résineuse. Je me contenterai pour le présent d'avoir établi cette distinction qui ne me paroît pas pouvoir être contestée, & d'avoir rapporté des exemples de l'une & de l'autre électricité: je vais maintenant faire quelques observations qui sont nécessaires pour réussir parfaitement dans ces expériences,

&c.

& pour ne laisser aucun sujet de doute sur un principe qui me paroît aussi solidement prouvé, que le peut être une vérité sur laquelle les Mathématiques n'ont point de prise.

Pour connoître bien exactement l'espece d'électricité d'un corps, il ne suffit pas d'exciter en lui une vertu médiocre, car alors il se trouveroit à peu près dans le même cas que si on le présentoit au corps électrique sans l'avoir auparavant rendu électrique lui-même, c'est-à-dire, qu'il seroit attiré presque indifferemment par les uns & par les autres; il est vrai pourtant que s'il a l'électricité vitrée, il sera plus vivement attiré par les électriques résineux, mais cette différence est peu sensible. De-là vient qu'il se trouvera peut-être des corps en qui la vertu électrique sera si foible, qu'il sera très difficile de déterminer de quelle espece est leur électricité; il faut en ce cas-là avoir recours aux moyens les plus propres à exciter leur électricité le plus vivement qu'il est possible: si, par exemple, on passe dans les doigts un ruban de laine, ou un écheveau de laine, on ne lui donnera qu'une électricité médiocre; mais si on ne prend que trois ou quatre brins de la même laine, & qu'on la passe brusquement dans du papier, de la toile ou de la laine, on lui en donnera une beaucoup plus considérable, & on verra pour-lors qu'elle est fortement attirée par l'ambre, & repoussée par le verre. Ce que je dis ici de la laine, se doit entendre de toutes les autres matieres, & l'on doit toujours avoir pour principe, qu'il faut que le corps dont on veut

con-

connoître l'électricité, en ait assez pour s'approcher de lui-même des corps qui n'en ont point, si l'on veut porter un jugement certain sur l'espece de son électricité.

On pourroit croire que le même corps frotté avec des corps differens pourroit acquérir une différente électricité; mais j'ai éprouvé qu'elle est toujours la même, & qu'elle ne differe que par son plus ou moins de force. J'ai frotté de la soye avec la main qui n'a d'elle-même aucune électricité, & ensuite avec d'autre soye qui est de tous les corps de cette espece celui qui en a le plus; celle que j'avois frottée de la sorte, a eu dans l'un & l'autre cas l'électricité résineuse: la laine & la plume aussi frottées de ces deux différentes manieres, ont eu l'électricité vitrée, & tant les uns que les autres n'ont differé que par le plus ou le moins d'électricité qu'ils ont contracté. Il y a encore un moyen bien simple pour connoître le genre d'électricité d'un corps dans lequel cette vertu est très foible: c'est de se servir d'une aiguille de métal, longue de six pouces ou environ, & suspendue comme une aiguille aimantée; cette aiguille doit avoir à l'un de ses bouts une boule de métal creuse, & quelque autre corps à l'autre pour qu'elle soit en équilibre. On rendra ensuite cette boule électrique par l'approche d'un morceau d'ambre, & suivant que les corps qu'on lui présentera l'attireront ou la repousseront, on jugera de la nature de leur électricité. J'ai demandé que la boule fût creuse, afin qu'elle eût plus de volume pour contracter une plus forte:

forte électricité, & que n'ayant pas beaucoup de pesanteur, elle fût mise en mouvement plus facilement par les corps les moins électriques. Cette maniere de chercher à connoître la nature de l'électricité d'un corps se présente très naturellement, après ce que nous venons de dire; cependant lorsque je l'ai voulu éprouver, j'y ai trouvé de très grandes difficultés, qui d'abord me paroissent former des obstacles à mon système, mais qui dans la suite n'ont fait que le confirmer, & me prouver que lorsque je ne réussissois pas, cela ne venoit que de ce que je ne m'étois pas attaché assez scrupuleusement à toutes les conséquences, & pour ainsi dire, à toutes les branches de l'hypothese des deux électricités. J'épargnerai cependant au Lecteur un détail ennuyeux & rebutant d'expériences manquées ou imparfaites, & je dirai seulement que pour réussir, il faut se servir d'une aiguille de verre posée sur un pivot de verre très long; que cette aiguille porte à l'un de ses bouts une boule de métal creuse, & à l'autre un contre-poids de verre; qu'il faut bien secher toutes ces pieces, & qu'alors il faut communiquer l'électricité à la boule de métal avec le tube, ou quelque autre matiere analogue: la boule sera alors attirée par les corps dont l'électricité est résineuse, & repoussée par ceux qui ont l'électricité vitrée.

Si, au contraire, on veut donner à la boule l'électricité résineuse, il faut que l'aiguille, le poids & le contre-poids soient de cire d'Espagne, ou de quelque autre matiere semblable,

ble, & alors on réussira parfaitement. On juge bien que toutes ces attentions ne se présentent pas d'abord à l'esprit, & qu'on n'y vient qu'après bien des expériences manquées, car elles sont toutes si nécessaires, que l'omission de quelques-unes en diminue considérablement, ou même en empêche absolument le succès; on voit que ces délicatesses, loin d'attaquer le principe que nous avons établi, ne font que le confirmer de plus en plus, & le mettre dans un nouveau jour. Je n'entre pas dans un plus grand détail, & ce que j'en ai dit doit suffire, pour que chacun trouve aisément le moyen de surmonter les petites difficultés qui se rencontreront dans la pratique de ces expériences. Venons maintenant aux changemens qui arrivent dans les tourbillons électriques par le mélange & la combinaison de ces électricités de différente espèce, & l'on verra que tout s'y passe de la manière que l'on doit conjecturer, en supposant les principes que nous avons établis.

Lorsque, par le moyen du tube de verre, on a repoussé & élevé en l'air une feuille d'or, si on approche de ce tube une boule de crystal rendue électrique, un second tube, ou toute autre matière qui a une électricité pareille, celle du tube se trouve fortifiée d'autant, & son tourbillon devient plus étendu, en sorte que la feuille s'élève & en demeure plus éloignée qu'elle ne l'étoit; si, au contraire, on approche du tube un bâton de cire d'Espagne, un morceau d'ambre ou de copal, l'électricité du tube s'y va appliquer en partie, par conséquent l'étendue de son

son tourbillon diminue , & la feuille s'approche de lui ; elle s'en éloigne ensuite lorsqu'on éloigne du tube le bâton de cire d'Espagne. Il arrive alors la même chose que nous avons vu arriver lorsqu'on promène la main d'un bout à l'autre du tube , tandis que la feuille est suspendue en l'air au-dessus ; il y a néanmoins une différence , c'est que le bâton de cire d'Espagne , ou tout autre corps dont l'électricité est résineuse , n'est pas aussi propre à détourner le tourbillon du tube que l'est un morceau de bois , la main , ou quelque autre corps qui n'a point d'électricité naturelle , ou du moins qui n'est pas actuellement électrique.

Cette expérience est conforme à tout ce que nous avons observé dans les Mémoires précédens , qui est que les corps les moins électriques par eux-mêmes , sont ceux qui sont le plus vivement attirés , & les plus propres à contracter une électricité étrangère.

Il arrive précisément la même chose que nous venons de voir , aux corps dont l'électricité est résineuse : si l'on fait repousser une feuille par un morceau de copal , & qu'alors on en approche un morceau de cire d'Espagne , de copal , ou d'ambre , la vertu du premier est augmentée , & son tourbillon devient plus étendu ; si , au contraire , on en approche le tube , le tourbillon diminue , & la feuille se rapproche. Ces faits sont si naturels , & l'explication s'en déduit d'une manière si simple , des principes que nous avons posés , qu'il seroit inutile de s'y arrêter plus longtems.

Il résulte donc de ce Mémoire deux vérités nouvelles sur cette matière, & deux principes dont on n'avoit pas eu jusqu'à présent le moindre soupçon; le premier, que les corps électriques commencent par attirer tous les corps, & qu'ils ne les repoussent que lorsqu'ils les ont rendus électriques par la communication d'une partie de leur tourbillon; & le second, qu'il y a deux électricités réellement distinctes, & très différentes l'une de l'autre. Que ne devons-nous point attendre d'un champ aussi vaste qui s'ouvre dans la Physique? & combien ne nous peut-il point fournir d'expériences singulieres, qui nous découvriront peut-être de nouvelles propriétés de la matière? Si nous parvenons un jour à la connoissance des causes de l'électricité, ce ne peut être certainement qu'en l'examinant ainsi par parties, & la décomposant, pour ainsi dire; car ç'eût été tenter une chose impossible, que d'en rechercher la cause avant que d'avoir découvert la quantité de phénomènes dont nous avons rendu compte dans les Mémoires précédens, & qu'il a été nécessaire de distinguer les uns des autres, attendu leurs contradictions apparentes; & après un examen exact, nous avons vu qu'ils dérieroient tous d'un petit nombre de principes simples & invariables, qui commencent à donner quelque éclaircissement sur une matière qui, du premier coup d'œil, paroïssoit très confuse & très embrouillée.



JOURNAL D'OBSERVATIONS
DES AURORES BOREALES,

*Qui ont été vues à Paris, ou aux environs; dans
 le cours des années 1732 & 1733.*

*Avec plusieurs Observations de la Lumière
 Zodiacale, dans les mêmes années.*

Par M. DE MAIRAN.*

LE Livre que j'ai donné au public sur l'Aurore Boréale, bien loin de me dispenser d'observer à l'avenir ce Phénomène, devient pour moi un engagement d'y être attentif; puisque je n'ai point prétendu avoir épuisé cette matière, & qu'en plusieurs rencontres j'aurois eu besoin d'un beaucoup plus grand nombre d'observations, que celles que j'avois pu recueillir, & que j'ai employées dans mon ouvrage, quoiqu'elles soient au nombre de plus de deux cens. Ces observations se terminent à l'année 1731 inclusivement: *c'est donc de ce terme, ou du commencement de 1732, que partira le Journal de celles que je vais indiquer présentement, jusqu'à la fin de 1733. Je ne compte point y avoir renfermé toutes les Aurores Boréales qui ont paru dans cet intervalle de tems; quelques-unes m'au-
 ront

* 23 Decemb. 1733.

ront échappé sans doute, en tout ou en partie, faute d'avoir été à portée de les appercevoir, & parce qu'en effet je n'ai pas pris à tâche de ne rien omettre sur ce sujet, mais seulement d'y veiller autant que quelques circonstances, & la disposition de mon logement au vieux Louvre, peuvent me le permettre. Ce que j'ai vu, ou que j'aurai vu dans la suite, joint à tout ce que j'espère trouver dans les Observations Météorologiques, & dans les Mémoires des diverses Académies de l'Europe, ne laissera pas de former un tout assez complet, & de fournir un jour de quoi perfectionner ou éclaircir cette Théorie. Car je compte suivre le plan que je me suis fait là-dessus, & rassembler toujours pour cela la plus grande quantité de matériaux qu'il me sera possible.

On s'attendroit peut-être à trouver ici, avec les observations de l'Aurore Boréale, une suite plus exacte & plus détaillée que celle qu'on y verra, des apparitions de la Lumière Zodiacale. Mais je dois demander encore plus d'indulgence à cet égard que sur les Aurores Boréales. Comme les observations de cette Lumière sont pénibles par l'assujettissement qu'elles entraînent après elles à certaines heures du soir & du matin, après la fin ou avant le commencement du crépuscule, & que d'ailleurs je pense avoir déjà recueilli, ou observé moi-même dans ce genre, tout ce qui m'étoit nécessaire pour la correspondance que j'avois à établir entre les deux Phénomènes, j'avoue que je me suis un peu relâché sur cet article, principalement

Mém. 1733.

Ff

sur

sur les observations du matin, & que je m'en rapporterai souvent là-dessus aux personnes à qui d'autres engagemens, & une situation de lieu plus avantageuse, facilitent ces observations.

Année 1732.

En *Janvier*. Je n'ai vu dans ce mois qu'une petite Aurore Boréale le 28. Elle s'est manifestée par un brouillard fumeux vers le Nord, en forme de segment de cercle irrégulier & mal terminé, mais surmonté d'une clarté blanchâtre, qui ne pouvoit avoir d'autre cause que l'Aurore Boréale; ce qui a duré depuis environ 9 heures jusqu'à 11. Il avoit fait tout le jour un tems de dégel, & un vent de Sud.

Mais la Lumière Zodiacale a paru souvent, & toutes les fois que le ciel a été découvert après le crépuscule du soir. Elle s'étoit montrée quelques jours avant le 16; mais je n'ai commencé de la bien observer que ce jour-là, où elle étoit très claire, quoique beaucoup moins blanche que la voye de lait, plus uniforme, & pour ainsi dire, plus compacte. Elle tiroit auprès de l'horizon sur la couleur rouge-jaunâtre. On avoit bien de la peine à discerner les Etoiles à travers, même assez près de sa pointe, comme, par exemple, l'Etoile de la queue de la *Baleine*, de la 3^{me} grandeur.

Elle a presque toujours occupé environ 25 degrés d'amplitude sur l'horizon, ou un peu au-dessus, parce que je n'en pouvois voir la base. A 6 heures $\frac{1}{2}$ du soir, sa longueur ou sa

sa pointe s'étendoit jusqu'aux Etoiles de la tête de la *Baleine*, passant sur les Etoiles du *Verseau*, sur la jambe antérieure duquel étoit sa plus grande clarté, & allant aboutir par sa pointe entre l'Etoile β de la *Baleine*, & la Planete de Saturne, assez proche de celle-ci. A 7^h $\frac{1}{2}$ elle m'a paru s'étendre encore plus loin, & aller presque jusqu'au dessous de la tête du *Bélier*, ce qui, à partir du lieu du Soleil, donne environ 90 degrés de longueur. A 9^h sa pointe paroissoit encore, & toute cette partie occidentale du ciel est demeurée beaucoup plus claire que le reste, jusqu'à 11^h, où j'ai cessé de l'observer.

Le 17, la Lumiere Zodiacale paroît à peu près comme le jour précédent.

Le 19, le tems s'étant éclairci vers les 7^h $\frac{1}{2}$, la Lumiere Zodiacale paroît, couchée le long d'un nuage qui touche l'horizon, & qui se termine par sa base vers le Nord, selon la position décrite ci-dessus le 16; mais beaucoup moins étendue par sa pointe. La clarté qui bordoit le nuage dont je viens de parler, avoit toutes les apparences de l'arc lumineux de l'Aurore Boréale sur le segment fumeux, & je ne voudrois pas assurer, que cet autre Phénomene ne se mêlât ce jour-là avec celui de la Lumiere Zodiacale, comme il arrive souvent depuis quelques années, sur-tout ayant encore vu jusqu'à 11^h toute cette partie du ciel retenir une impression de clarté. Un peu avant 9^h j'avois distingué la pointe de la Lumiere Zodiacale que je ne voyois pas auparavant. Ce qui me persuade, comme je l'ai remarqué en plusieurs autres

occasions, que la partie la plus dense de cette Lumiere, & qui étoit alors sous l'horizon, ternit ou efface quelquefois sa Lumiere moins dense qui est vers la pointe.

Le 24, la Lumiere Zodiacale paroît à 6^h $\frac{1}{2}$ assez éclatante, mais mal terminée; à en juger par ce qu'on voyoit, elle pouvoit avoir 55 ou 56 degrés de longueur, sur une vingtaine de largeur sur l'horizon.

Le 26, je la revois à 7^h; rougeâtre & mal terminée, sa pointe alloit 10 ou 12° au-delà de la Planète de Saturne, & pouvoit donner en tout depuis le Soleil 70° de longueur.

En *Février*. Le 2, ayant regardé le Ciel à 8^h du soir, j'y ai vu la Lune entourée d'une *Halo* ou cercle blanchâtre, du nombre de ceux qui ont environ 45° de diametre, dans lequel, y compris ses bords, les Etoiles paroissent très bien, le tems étant d'ailleurs fort clair. A 8^h $\frac{1}{2}$, l'*Halo* étoit fort affoiblie; mais il y avoit au Couchant, & au-dessous de la Lune, de grandes trainées de nuages, rares, blancs & transparens, qui venoient du Nord, & qui m'ont fait penser aux jets, & aux colonnes de l'Aurore Boréale. En effet, ayant tourné mes regards vers le Nord, j'y ai vu un nuage blanc, sous la forme ordinaire de ce que j'appelle le *segment obscur & fuméux*, qui a coutume d'accompagner ce Phénomene, mais qui paroît blanc quelquefois, lorsqu'il est éclairé par les rayons de la Lune. Il y avoit aussi vers le Levant de semblables trainées partant du Nord, ou y allant aboutir. De sorte que je ne doute point que ce ne fût une Aurore Boréale, seulement un
peu

peu déguisée, & fort diminuée par la lumière de la Lune qui approchoit de son premier quartier, & qui étoit à 40 ou 45° au-dessus de l'horizon. A 9 & jusques vers les 10^h, le nuage blanchâtre du Nord s'étoit plus élevé & plus étendu, sur-tout du côté de l'Orient, après quoi toutes ces apparences ont diminué, ou se sont enfin dissipées.

Le Barometre avoit été tout ce jour-là à 28 pouces moins une demi-ligne, ou un quart de ligne, & le tems assez froid, avec le vent au Nord.

Le 4, la Lune ayant près de 9 jours, & le tems s'étant éclairci vers les 7^h du soir, après avoir été couvert dans la plus grande partie de la journée, vent Ouest tirant vers le Sud, le Barometre à 27 pouces 10 lignes $\frac{1}{2}$, j'ai remarqué du côté du Levant, Est-Nord-Est, un grand arc d'une lumière foible, & assez transparente pour laisser voir toutes les Etoiles auxquelles il répondoit: il les obscurcissoit cependant un peu à son bord méridional; il s'étendoit jusqu'à l'Ouest; il renfermoit les deux plus claires Etoiles du *Bélier*, α , β , près de son sommet, à droite en regardant vers le Sud; ce sommet déclinait à gauche un peu vers le Nord; on voyoit au-dessous vers le Sud-Est la constellation d'Orion, mais un peu ternie. Cette espece de Zone parut un moment surmontée vers le Nord, d'une autre qui lui étoit concentrique, & qui étoit plus foible. Le reste du Ciel étoit semé de grandes bandes ou pieces de matiere transparente, qui sembloient aboutir au Nord, comme à un foyer ou point de

concours. Toutes ces apparences furent de peu de durée; mais il restoit toujours de légères traces de la même matiere dirigées du Nord au Sud. A 9^h il n'en restoit presque plus, le Ciel étoit par-tout fort clair, excepté dans la partie septentrionale, qui s'étoit chargée d'un brouillard fumeux. A 9^h $\frac{1}{2}$, l'Arc a reparu, mais un peu plus bas vers le Midi qu'à 7^h, il n'a duré que quelques minutes.

Je ne me suis attaché à observer ce Phénomene & à le décrire, que parce que j'ai cru qu'il tenoit à l'Aurore Boréale, ainsi que quelques autres qui lui ressemblent, & dont j'ai parlé dans mon Traité. Et en effet, j'appris quelques jours après de M. *Godin*, qu'il avoit observé ce jour-là même à 7^h $\frac{1}{2}$ une petite Aurore Boréale, ou plutôt Australe, à arc & à rayons, qui étoit élevée d'environ 10 degrés sur l'horizon vers le Midi, qui s'étendoit d'une vingtaine en amplitude de part & d'autre, mais dont la corde déclinait par son milieu de 4 degrés vers l'Occident, comme je l'ai recueilli de la figure & de la note qu'il m'en a donnée.

Le 5, on a vu des bandes semblables à celles du 4, mais beaucoup plus interrompues, sans doute par la grande clarté de la Lune.

Le 15, le vent ayant été toute la journée au Sud, tems doux, lâche & humide, le Barometre à 27 pouces 11 lign. la Lumiere Zodiacale a paru vers les 7^h du soir, à travers quelques nuages. Sa pointe alloit jusqu'après des *Pleiades*, c'est-à-dire, à plus de 90°. A la droite, en tirant vers le Nord, par rapport

port au spectateur tourné vers le Couchant, elle paroissoit se confondre avec un commencement d'Aurore Boréale, de celles qui sont peu brillantes, & qui se mêlent avec les vrais nuages qui occupent la partie inférieure de notre Atmosphere.

A $8^h \frac{1}{2}$, tout le Ciel est couvert de flocons de matiere blanchâtre plus éclairés vers le couchant d'Hiver que par-tout ailleurs. Mais le lieu de ce plus de clarté varioit d'un moment à l'autre. Le Nord étant toujours fort chargé d'un brouillard fumeux.

A $9^h \frac{1}{2}$, le tems a paru s'épaissir, & à 10^h on ne voyoit presque plus les Etoiles.

A 11^h , le nuage auparavant gris & fumeux, du côté du Nord, étoit devenu clair & blanchâtre, sans doute par la clarté de la Lune qui devoit être levée à 10^h , & qui rendoit cette dernière apparence fort équivoque.

Le double Phénomene de la Lumiere Zodiacale, & de ces sortes d'Aurores Boréales qui l'accompagnent dans cette saison, a été fort ordinaire cette année, de même que les précédentes; ainsi je me contenterai d'indiquer que le 17, le 19, les 21, 22, 23, 26 & 28 du même mois de Février, il y a eu des apparences à peu près pareilles à celles du 15.

Le 29, il y avoit à $11^h \frac{1}{2}$, un commencement d'Aurore Boréale dont j'ai été averti, & qui effectivement, s'est trouvée très décidée à minuit ou minuit & demi; elle étoit *Tranquille*.

En Mars. Le 2, la Lune approchant de son premier quartier, j'ai remarqué vers les

11^h du soir, de ces grandes trainées blanches & transparentes, qui vont du Nord au Sud, avec le brouillard fumeux du côté du Nord. Le 10 les trainées ou bandes sont encore mieux marquées, au nombre de 4, 5, ou 6, quoique la Lune soit presque dans son plein, le Nord toujours chargé du brouillard blanchâtre. Ce que je rapporte, non pour mettre absolument tous ces Phénomènes au nombre des Aurores Boréales, mais pour qu'on puisse un jour s'en assurer, par des observations correspondantes qui auront été faites en des pays éloignés, & où la Lune ne jette pas la même incertitude sur ce point.

Le 15, le vent étant Nord-Nord-Ouest, & le Barometre à 28 pouces, le tems beau, quoique mêlé de quelques nuages, la Lumière Zodiacale se faisoit distinguer, & étoit très brillante dès 7^h du soir, c'est-à-dire une demi-heure avant la fin du crépuscule : elle paroissoit au-dessus d'un gros nuage qui en occupoit la partie inférieure.

Le 23 ; il y a eu une de ces Aurores Boréales *Informes*, qui se confondent d'abord avec la Lumière Zodiacale, qui semble en faire partie. Elle duroit encore à 11^h $\frac{1}{2}$, comme je le juge par ces nuages fumeux répandus par tout le Ciel, & principalement vers le Nord, sombres & grisâtres par la partie inférieure, blancs & lumineux par la supérieure.

Le 26 & le 28, il y a eu de semblables indices, ou vestiges d'Aurore Boréale, mais moins marqués.

En *Avril*. Le 3, il y a eu une Aurore Boréale.

réale assez bien marquée, vers les 8 heures; à 9^h elle l'étoit moins, mais on voyoit un grand Arc ou Zoné dans le Ciel, qui passoit fort près du Zénit, de l'Ouest au Nord-Est: cet Arc m'a paru double, dans quelques momens, & toujours foible; sans doute à cause du clair de la Lune, qui étoit dans son premier quartier.

Je ne dois pas passer sous silence, que deux fois dans ce mois, savoir, le 13 & le 20, je n'ai pu découvrir vers l'Occident aucun vestige de la Lumière Zodiacale, par le tems du monde qui sembloit y être le plus favorable, & à l'heure, comme à la saison où cette Lumière est le plus visible. Et ce qui est encore digne de remarque, c'est qu'elle s'est montrée le lendemain de chacun de ces jours, le 14 sur-tout, très brillante, & très étendue, malgré la Planete de Vénus, qui en occupoit à peu près le milieu; mais elle étoit fort mal terminée, & d'autant plus mal, qu'il se joignit bien-tôt à son bord septentrional un peu d'Aurore Boréale, & de ces flocons de matiere, moitié fumeux, moitié cotonneux, qui l'annoncent, ou qui l'accompagnent.

Le 16, le 17 & le 18, malgré le tems pluvieux, & la pluie même, qu'il a fait toutes les soirées, j'ai vu, par reprises, des marques très sensibles des mêmes Phénomènes de l'Aurore Boréale, principalement auprès de l'horizon, du côté de l'hémisphère septentrional; mais je n'ai apperçu des traces de la Lumière Zodiacale que le 18.

Le 25, l'Aurore Boréale a paru sans équi-

voque, & avec une petite pluie, qui tomboit par reprises, & qui avoit commencé à 8^h $\frac{1}{2}$ ou $\frac{1}{2}$; à 10^h $\frac{1}{2}$, c'étoit un grand segment obscur, fumeux & nuageux, mais sensiblement circulaire, bordé d'un blanc verdâtre. J'en ai jugé la hauteur vers le sommet, d'environ 50 à 55 degrés, & sa déclinaison occidentale de 12 à 15. Quant à son amplitude, je n'ai pu la prendre, tant parce que je n'étois pas en un lieu propre à voir l'horizon, que parce que le Phénomène m'a paru devoir être fort mal terminé par sa base, qui continuoit de s'étendre indistinctement à droite & à gauche, par une clarté blanchâtre. Les Etoiles paroissoient presque par-tout en ce moment, avec un mélange de fumée qui les obscurcissoit ou les ternissoit de tems à autre. Quelques minutes après, le Ciel s'est beaucoup obscurci, il s'est dégagé dans la suite, & cela plusieurs fois, selon les vicissitudes qui regnent dans ce Phénomène, depuis deux ou trois mois.

Le 26 & le 27, l'Aurore Boréale a continué de paroître à peu près dans les mêmes circonstances, fort étendue, mais fort basse, & du nombre de celles qu'on appelle *Horizontales*.

En *Mai*. Le 14, le 20 & le 23, il y a eu des Aurores Boréales, que je n'ai apperçues que vers les 11^h, ou minuit, soit que j'eusse négligé de regarder le Ciel auparavant, soit que le tems sombre, ou la pluie, comme à celle du 14, les eût empêché de paroître avant cette heure-là; elles n'ont rien eu de remarquable, quoique je présume que cette

der-

dernière, celle du 14, doit avoir été très grande, & avoir paru telle dans les endroits où les circonstances du tems n'y ont pas été contraires.

Le 12, le 19, le 25 & le 26, il n'y a eu que des signes, des apparences indécises d'Aurore Boréale, mais que je crois devoir remarquer par la raison que j'en ai dite ci-dessus.

En *Juin*. Je n'a vu qu'une seule Aurore Boréale dans ce mois, le 26, mais grande, à jets, & à vibrations de lumière: j'en fus averti à 11^h. Elle étoit déjà toute formée, fort étendue sur l'horizon, mais fort basse, par rapport à son étendue. Le nombre de rayons qui sortoient d'une base fumeuse & obscure étoit si grand, que le total ressembloit quelquefois à une crinière hérissée. Elle alloit depuis les extrémités du Sud-Ouest, en passant par le Nord, jusqu'à l'Est, ne laissant qu'une petite portion de l'horizon vers le Sud & le Sud-Est, sans lumière, ou sans fumée. Elle étoit fort occidentale, & c'étoit aussi vers l'Occident qu'étoient les plus grands, & la plus grande quantité de rayons ou de colonnes. On y remarquoit en même tems de gros bouillons, ou des ondes, qui me firent penser à un guéret chargé d'épis agités par le vent. A 11^h $\frac{1}{4}$, elle étoit diminuée, à 11^h $\frac{1}{2}$ encore davantage, & bien-tôt après tout l'incendie sembloit s'éteindre; mais à minuit elle reprit de nouvelles forces, qui furent cependant de peu de durée.

Il y eut un moment vers les 11^h, où un rayon, le plus grand de tous, s'éleva dans la même direction précisément que la ligne

Ff 6.

sur

sur laquelle étoient les Planetes de Jupiter & de Mars, en les rafant vers la droite ou le Nord, & les laiffant à gauche vers le Midi, à la distance d'environ un degré.

Il y eut auffi assez longtems vers le Nord un nuage brifé en plusieurs endroits ou pommelé, & noir comme de l'encre. Il tenoit la place du segment obscur ordinaire, & il ne monta jamais qu'à 15 ou 20 degrés au-dessus de l'horizon.

Toute la clarté de cette Aurore Boréale étoit assez opaque, & un peu verdâtre.

En *Juillet*. Le 12, étant à la campagne*, vers les 9^h $\frac{3}{4}$, un peu avant le lever de la Lune, j'ai remarqué un nuage obscur du côté du Nord, avec beaucoup de clarté par-dessus, que je crois être une Aurore Boréale *Tranquille*, laquelle a disparu vers les 11^h, au clair de la Lune, qui étoit pleine quatre jours auparavant.

Le 17, le 29 & le 30, il n'y a eu que de simples soupçons d'Aurore Boréale.

En *Août*. Le 12, le 14, le 15, le 16 & le 19, apparences d'Aurore Boréale. Celle du 19 m'a semblé un peu plus décidée, & je crois qu'on la peut compter pour telle.

Le 21, à 8^h du soir, il y avoit dans le Ciel de grandes trainées en côte de melon, dont les deux extrémités alloient aboutir au Nord-Est d'un côté, & au Sud-Ouest de l'autre, & dont la transparence, & la durée, m'ont rendu attentif sur l'Aurore Boréale, qui cependant n'a point paru.

Le

* A. Maudry.

Le 22 nous fournit une Aurore Boréale remarquable. Elle s'est manifestée dès les $8^{\text{h}}_{\frac{1}{2}}$, ou $8^{\text{h}}_{\frac{3}{4}}$, par une lumière assez vive du côté du Nord-Nord-Ouest, interrompue & entrecoupée auprès de l'horizon par plusieurs nuages fort obscurs. Je ne pus juger si c'étoient en effet de vrais nuages, ou des parties fumeuses du Phénomène, parce que je ne voyois point d'Etoiles à travers.

A 9, $9\frac{1}{2}$ & 10 heures, c'étoit encore à peu près la même apparence, une Aurore Boréale tranquille, parsemée de parties obscures près de l'horizon; mais sa clarté avoit considérablement augmenté de densité, quoique sa hauteur fût presque la même.

Enfin à 10 heures $\frac{1}{2}$, toutes les parties obscures se trouverent réunies sur l'horizon en forme de segment, comme il arrive d'ordinaire, & bordées d'une bande de lumière fort vive, blanche, un peu verdâtre, tirant sur le celadon. Le milieu ou le sommet de l'arc obscur me parut répondre sous les deux Etoiles de la seconde grandeur de la poitrine de la *grande Ourse* (α & β), & décliner au Couchant d'environ 20 degrés. Sa hauteur étoit de 10 à 11 degrés, à peu près égale à la distance de l'Etoile α à l'Etoile β de la même constellation, & son amplitude d'environ 100 degrés, ce que je jugeai encore, parce qu'il se terminoit vers l'Occident, un peu au-delà du vertical qui passoit par l'Etoile du Bouvier (*Arcturus*).

Comme je recueillois ces dimensions, je vis ébrécher le bord du segment obscur vers l'Occident, & il en sortit bien-tôt un jet de

lumiere d'environ 2 degrés de largeur, qui monta à 25 ou 30 degrés vers le Zénit. Celui-ci n'étoit pas fini, qu'il en naquit promptement & successivement trois autres, selon la longueur de l'arc, en allant vers le levant, & à distances à peu-près égales; ils étoient fouettés à leur extrémité d'une teinte de rouge très légère. Il y en eut encore quelques-uns pendant trois ou quatre minutes; mais le Phénomene ne parut plus faire dans la suite que diminuer & s'affoiblir, de sorte qu'à 11 heures, où je cessai de l'observer, le segment obscur n'avoit guere que 3 ou 4 degrés de hauteur, & 70 ou 80 de longueur. Tout étoit donc tranquille, & sembloit tirer sur sa fin; mais j'ai su qu'on l'avoit vue encore après minuit. M^{rs}. *Cassini* & *Maraldi* m'ont dit aussi avoir vu la Lumiere au Midi, vers les 8½ ou 9 heures, avec une colonne ou bande Zodiacale qui passoit par les Etoiles du *Cheval*. Le tems avoit été assez beau toute la journée, mais un peu variable, avec un vent d'Ouest.

Le 30, j'ai appris de M. *du Fay* qu'il y avoit eu ce jour-là, vers le minuit, une Aurore Boréale, qui consistoit en une grande clarté vers le Nord, & une colonne ou bande colorée de la largeur de deux ou trois fois le disque du Soleil; elle s'élevoit du Couchant vers le Zénit, & passoit au-delà vers le Levant. Elle étoit tout-à fait séparée de la Lumiere du Nord.

En *Septembre*. M. *Buache*, de cette Académie, m'a donné la figure & la note d'une Aurore Boréale à jets de lumiere qu'il a observé.

fervée le 1. de ce mois à 10 heures : je ne m'étois pas avisé d'y regarder, le Ciel étant couvert de gros nuages à 7, 8 & 9 heures du soir, avec une grande pluie, & des tonnerres. Le vent étoit Nord, & le Barometre avoit été dans la journée à 28 pouces. La Lune étoit sur l'horizon, & avoit 12 jours.

Le 5, l'Aurore Boréale reparoit. Ce même jour m'étant trouvé, par hasard, sur pied à 4 heures du matin, j'ai été regarder le Levant, le Ciel étant beau & serein, pour voir si la Lumière Zodiacale paroïssoit, & je l'y ai vue grande, brillante, & fort dense vers sa base, mais très mal terminée. C'est sans doute à cause de cette même densité qui en effaçoit les extrémités, & aussi parce que le crépuscule devoit avoir déjà une demi-heure.

Le 10, l'Aurore Boréale commence à paroître foiblement vers les 8 $\frac{1}{2}$ ou 9 heures du soir, mais elle est bien-tôt effacée par le lever de la Lune.

Le 11, elle est plus marquée, & l'on y apperçoit quelques rayons vers les 11 heures $\frac{1}{2}$.

Le 16, je remarque la même bande du Levant au Couchant, dont il a été parlé déjà plusieurs fois ci-dessus, & à la laquelle ils'en est joint plusieurs autres à peu près sous la forme du 21 Août. Ce qui a duré, avec divers changemens, depuis 6 heures $\frac{1}{2}$ du soir jusqu'à près de 9 heures. La première de ces bandes m'a toujours paru moins changeante que les autres. Elle avoit, ce me semble aussi, un petit mouvement vers le Nord, où l'on voyoit en même tems au dessous de la grande Ourse, depuis la dernière E-

toi-

toile de sa queue, jusqu'à sa poitrine inclusivement, un amas de fumée légère ; cette fumée s'est rangée en arc assez bien formé vers les 9 heures $\frac{1}{2}$; cet arc a duré près d'une heure, & il pouvoit avoir à son sommet 9 à 10 degrés de hauteur sur l'horizon. Il m'a paru enfin se confondre avec les vapeurs de l'horizon.

Ces dernières observations, depuis le 7 de Septembre, de même que toutes celles qui suivent, jusqu'au commencement de Novembre, ont été faites à la campagne, & à un Ciel très découvert. *

Le 19, le 20 & le 21, l'Aurore Boréale a paru. L'apparition du 21 a eu ceci de remarquable, que la Lumière du Nord, & qui bordoit l'horizon, étoit interrompue par cinq petits nuages fumeux, en forme de colonnes de 10 à 12 degrés de longueur, sur 4 à 5 de largeur ; ils étoient élevés par leur bout inférieur, de 5 à 6 degrés sur l'horizon, au-dessous duquel ils concouroient, & étoient divergens comme vers un centre. Je les ai apperçus un peu après 8^h ; ils se sont soutenus à la même place, & sans varier sensiblement de grandeur, une demi-heure ou trois quarts d'heure : après quoi ils se sont comme fondus peu à peu dans la Lumière septentrionale, qui étoit encore assez forte à 11^h. Le tems avoit été sombre & pluvieux dans la journée, mais il étoit devenu très beau & très serein à 8 heures.

Le

* Pour la plupart à Brenillepont, Diocèse d'Evreux, entre Pacy & Ivry.

Le 26, petite Aurore Boréale avec quelques rayons, après une pluie qui a duré tout le jour.

Le 27, autre petite Aurore Boréale, de peu de durée, mais que je ne crois pas équivoque.

En *Octobre*. Comme ce mois a été celui de l'année où il y a eu le plus d'Aurores Boréales, & les mieux marquées, ainsi qu'il l'est communément, j'abrègerai encore ici plus que par tout ailleurs les descriptions que j'en ai retenues, & je me contenterai d'indiquer ou de désigner les apparitions de ce Phénomène qui n'auront rien eu de particulier.

Le 1, le 2 & le 3, il y a eu des marques d'Aurore Boréale par le segment fumeux, & bien terminé en Arc, vers le Nord, tout le reste du Ciel étant fort clair; mais la Lune qui approchoit de son plein, lequel devoit arriver le 4, a rendu ces marques moins apparentes, & a presque entièrement effacé la lumière de ces Phénomènes.

Le 5, l'Aurore Boréale, à jets, & à vibrations de lumière, est remarquable, en ce qu'elle paroît dès les 6^h $\frac{1}{2}$ du soir, une heure avant la fin du Crépuscule, & la Lune étant sur l'horizon quasi pleine. Le Ciel étoit clair & serein, & l'avoit été toute la journée, avec le plus beau coucher de Soleil, le plus pur, & le plus dégagé de nuages & de vapeurs, que j'en aye vu de l'année. D'abord la Lune étant peu élevée sur l'horizon, c'étoit le Crépuscule qui nuisoit davantage; mais celui-ci diminuant toujours, & la Lune

NON.

montant de plus en plus, elle l'a bien-tôt emporté, & elle a éteint enfin la lumière de l'Aurore Boréale, dont il ne restoit presque plus de vestige à $9^h\frac{1}{2}$. J'ai considéré avec plaisir cette espèce de combat, & cette alternative entre la grandeur ou la force du Phénomene, & la clarté de la Lune. Cependant le segment obscur bordé de blanc a toujours subsisté, du moins subsistoit-il encore à $11^h\frac{1}{2}$, & à minuit; mais les jets de lumière qui étoient d'abord fort grands, & qui passaient au-delà du Zénit ont diminué promptement, les ondulations & les vibrations de lumière ont été encore plus courtes, & n'ont pas duré un demi-quart d'heure. Le plus beau moment avoit été à $6^h 55'$. Ces grands Phénomènes sont ordinairement accompagnés de diverses couleurs fort vives, mais il n'y avoit presque jamais que du blanc dans celui-ci, avec un peu de céladon aux trouées du segment fumeux d'où s'élevoient les jets, & un couleur de rose encore plus léger, & plus lavé, à l'extrémité de ces jets. J'ai jugé la hauteur du sommet du limbe éclairé, qui bordoit le segment obscur, de 25 à 26 degrés sur l'horizon, parce que la portion qui répondoit sous l'Etoile Polaire partageoit sensiblement l'Arc de l'Azimuth ou du Méridien, compris entre cette étoile & l'horizon en deux parties égales. L'Amplitude en a été toujours fort incertaine, de 100 ou 110 degrés. Cet Arc & ce segment ont été longtemps invariables, mais de 10 heures jusqu'à $11^h\frac{1}{2}$, ils ont baissé de 7 à 8 degrés. La déclinaison occidentale qui étoit au commen-

ce.

cement de 10 à 12°, s'étoit aussi réduite alors à environ 7 degrés. Je passe sous silence quelques autres accidens de ce Phénomene, dont j'ai mes registres chargés dans un plus grand détail.

Le 6, Aurore Boréale à jets de lumière, plus courte & moins considérable que la précédente.

Le 14. Aurore Boréale, qui ne se montre que par reprises, à cause du tems couvert & pluvieux.

Le 15 & le 16, elle est plus visible. J'ai remarqué dans la dernière à 8^h $\frac{1}{2}$, deux ou trois petits éclairs fort vifs, & fort isolés, qui sont partis du segment fumeux, au-dessous de l'Etoile γ de la *grande Ourse*, & qui m'ont paru cependant tenir beaucoup plus des éclairs ordinaires ou Météores, que de ceux que j'ai observés quelquefois dans l'Aurore Boréale.

Le 17, à 1^h $\frac{1}{2}$, l'Aurore Boréale paroît, petite, *Tranquille*, mais très bien formée au-dessus du segment obscur.

Le 18, malgré le tems affreux qu'il a fait toute la journée, & qui dure encore le soir, pluie, vent de tempête Sud-Sud-Ouest, & le Ciel très couvert, l'Aurore Boréale ne laisse pas de se montrer, à 9^h $\frac{1}{2}$ du soir, par des nuages blanchâtres, & même par quelques rayons. Je crois qu'elle seroit très grande sans ces obstacles.

Le 20, elle se montre encore dans des circonstances de tems peu favorables; mais elle est moins marquée que la précédente.

Le 22, c'est une Aurore Boréale tranquille.

le, sans segment obscur, mais dont la lumière est entre-coupée de flocons de nuage fumeux assez particuliers. J'en ai retenu la Figure.

Le 23, le Phénomene paroît encore.

Le 24, il se montre avec un peu de pluye.

Le 25 & le 26, il est marqué par la clarté septentrionale, mais la Lune qui est forte le dissipe en partie.

En *Novembre*. J'apprends qu'il y a eu le 4 ou le 5, & le 9, des Aurores Boréales qui ont été vues après minuit.

Le 12, je n'ai vu que des signes équivoqués du Phénomene; mais j'apprends par une Lettre de M. *Horrebow* écrite de Copenhague, que le Phénomene y a paru ce jour-là avec des circonstances dignes de remarque, & qu'il a fort bien décrites.

En *Décembre*. Je n'ai lieu de croire que l'Aurore Boréale ait paru ici dans ce mois que le 4 & le 13, encore la Lune qui étoit forte m'a-t-elle empêché de m'en bien assurer.

Année 1733.

En *Janvier*. Je n'ai vu des apparences de l'Aurore Boréale que le 19, j'ai trouvé même qu'elles se confondoient avec celles de la Lumière Zodiacale, & avec de ces grandes trainées disposées en côte de melon, qui vont du Sud-Ouest au Nord-Est, à peu près comme le 21 Août dernier.

En *Février*. L'Aurore Boréale paroît le 14 & le 16, mais fumeuse & informe. Le 14, ce fut peu de tems après la Lumière Zodiacale

le, qui étoit à 7^h $\frac{1}{2}$ très brillante, & assez terminée; elle occupoit 25 à 30 degrés sur l'horizon, elle passoit par la p^ointe au-dessus des Etoiles de la tête du *Bélier*, des *Pleiades*, & atteignoit quasi jusqu'à l'*œil du Taureau*: ce qui lui donne une centaine de degrés de longueur par rapport au lieu actuel du Soleil. Le tems étoit beau, après avoir été sombre & couvert jusqu'à 4 ou 5^h, & après plusieurs jours de pluie. Le Barometre à 27 pouc. 11 lignes.

En *Mars*. Le 8, la Lumiere Zodiacale paroît, & elle est, à mon avis, suivie d'une Aurore Boréale indécise, & mal terminée.

Le 9 & le 13, les mêmes phénomènes, la Lumiere Zodiacale suivie de l'Aurore Boréale.

En *Avril*. Le 2, Aurore Boréale vers le Nord & Nord-Ouest, basse & irrégulière.

Le 4, la Lumiere Zodiacale paroît vers les 8^h $\frac{1}{2}$ ou $\frac{3}{4}$, elle s'étend jusqu'aux Etoiles des *Gemeaux*, c'est-à-dire, environ 90 degrés. L'Aurore Boréale se mêle avec elle, & dure jusques vers les 11^h informe.

Les 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 & 13, Aurores Boréales informes, & presque toutes mêlées avec la Lumiere Zodiacale. Je ne compte véritablement que celles du 8, du 9 & du 12, à cause de plusieurs circonstances dont je supprime ici le détail.

Le 18, l'Aurore Boréale est plus décidée, & mieux marquée.

En *Mai*. Le 6 & le 9, j'ai apperçu à 11^h, une grande clarté vers le Nord & Nord-Ouest, qui ne pouvoit avoir d'autre cause que l'Aurore Boréale.

Le

Le 14, j'apprends qu'on a vu ce jour-là autour du Soleil plusieurs arcs blanchâtres.

Le 16, j'ai été averti à 11^h $\frac{1}{2}$ que l'Aurore Boréale paroïssoit, & je l'ai trouvée en effet très visible, & très bien formée, avec des jets de lumière verdâtres; mais elle étoit peu élevée, &, à mon avis, sur ses fins. Cependant M. *du Fay* l'a encore remarquée vers le minuit, avec un concours de bandes ou de rayons vers le Sud. La Lune qui avoit été sur l'horizon jusqu'à plus de 10^h $\frac{1}{2}$ a été cause, sans doute, que cette Aurore Boréale n'a pas été plutôt remarquée.

En *Juin*. Le 20, à minuit, le Ciel étant par-tout ailleurs clair & serein, il y a vers le Nord un segment de cercle obscur bordé de lumière, qui ne peut être, ce me semble, attribué qu'à l'Aurore Boréale.

En *Juillet*. Le 7, Aurore Boréale bien marquée, à jets de lumière.

Le 8, le 9 & le 10, Aurores Boréales informes, vagues & indéterminées; celle du 9 est la plus marquée.

Le 13 & le 14, je vois sur l'horizon, vers le couchant, après l'heure du crépuscule du soir, une lumière rougeâtre, étendue sur l'horizon, mal terminée, & précisément à la place où doit se trouver la Lumière Zodiacale dans cette saison.

Le 15, vers les 11 heures, le Nord est chargé d'une vapeur fumeuse éclairée au dessus, qui tient beaucoup de l'Aurore Boréale.

Le 21, j'apprends de M. *Grandjean* que de 11^h à minuit il y a eu une Aurore Boréale à jets de lumière.

Le

Le 22, M. de *Maupertuis* m'a dit avoir vu de 11 à 12 heures une bande obscure fort singulière, étendue sur le Zodiaque, à travers laquelle on voyoit fort bien les Etoiles. Le reste du Ciel étoit clair & serein, & il ne croit pas, non plus que quelques autres personnes qui étoient avec lui, que ce Phénomene fût causé par des nuages ordinaires.

En *Août*. Le 3, le tems ayant été beau tout le jour, quoique mêlé de quelques nuages de peu de durée, avec un beau coucher du Soleil, j'ai remarqué à 8 heures du soir vers l'Orient, d'assez grands pelotons de nuages bien arrondis, dont la partie supérieure étoit d'un blanc à éblouir, & beaucoup plus éclatant que celui de plusieurs autres nuages pareils qui se trouvoient vers le Couchant, & près du Zénit, quoique tous ceux-ci fussent exposés à une lumière du crépuscule beaucoup plus forte. Cette apparence m'a donné de l'attention pour le reste de la soirée, ou de semblables nuages blancs par leur partie supérieure ont continué de paroître, & de manière à me faire juger que le crépuscule n'en pouvoit être la cause, non plus que la Lune qui ne devoit se lever qu'après $11^h \frac{1}{4}$. Enfin à $10^h \frac{1}{2}$ j'ai vu le Nord couvert près de l'horizon, du brouillard fumeux qui a coutume d'annoncer l'Aurore Boréale; toute la partie au dessus est devenue peu de tems après lumineuse & rougeâtre; ce qui a fait en tout une petite Aurore Boréale *Tranquille & Horizontale*.

Le 4 à 11 heures, plusieurs bandes claires
qui

qui concourent vers le Couchant au dessous de l'Etoile du Bouvier.

Le 5, grandes dispositions à l'Aurore Boréale, d'où il ne résulte rien que de vague, & d'informe.

Le 6, mêmes apparences qu'hier, qui semblent se déterminer un peu plus vers le Nord, de 9^h $\frac{1}{2}$ jusqu'à 11 heures, où j'ai cessé de les observer. Mais j'apprends par une Lettre de M. le Comte de *Plelo*, que l'Aurore Boréale a paru fort belle ce même soir à Coppenhague, après minuit.

Le 7, Aurore Boréale à jets de lumière; elle ne s'est montrée que vers les 11 heures. Il sembloit à 11^h $\frac{1}{2}$ qu'elle s'alloit éteindre; mais M. *Buache*, qui l'a observée, m'assure qu'elle s'est renouvelée après minuit, & qu'elle a duré jusqu'à 2 heures. M. de *Maupepertuis* a encore vu ce même soir de 9^h à 9^h $\frac{1}{2}$, une bande lumineuse qui s'étendoit sur le Zodiaque étoilé, & qui alloit de l'horizon vers les constellations du *Scorpion*, du *Sagittaire*, & au-delà. Le lieu, l'heure, & la saison, rendent ce Phénomène douteux entre la Lumière Zodiacale fort étendue, & mal terminée, & les bandes Zodiacales dont il a été déjà parlé plusieurs fois ci-dessus.

Le 8, grandes dispositions à l'Aurore Boréale, qui deviennent équivoques, par le tems peu favorable; éclairs qui se confondent avec la lumière de l'horizon, & qui ont été suivis de Tonnerre quelques heures après.

Le 9, mêmes dispositions, & mêmes obstacles de 9 heures jusqu'à 10; mais depuis

ro jusqu'à 10 $\frac{1}{2}$ je ne crois pas qu'il y ait d'équivoque, & l'Aurore Boréale paroît sensiblement.

Le 14, petite Aurore Boréale, bien marquée, qui a commencé à 9^h, & qui duroit encore à 11. Il y a eu quelques éclairs vers l'Orient, qui m'ont paru douteux entre les effets de ce Phénomene, ou du Météore.

Le 17, il y a une Aurore Boréale qui ne se rend bien visible qu'après minuit, à cause de la Lune, & des circonstances du tems.

Le 28, la Lune paroît avec une *Halo* blancheâtre.

Le 29, l'Aurore Boréale paroît à plusieurs marques qui ne sont pas équivoques, malgré la pluie, & plusieurs autres circonstances peu favorables.

En *Septembre*. Il y a eu le 2, le 3, & dans quelques autres jours de ce mois, des signes du Phénomene, que je crois pouvoir appeler de la matiere Boréale répandue dans l'Atmosphère.

Le 6, l'Aurore Boréale se montre par une grande lumière vers le Nord, depuis 9 heures jusqu'à minuit, sans rayons.

Le lendemain, ou peu de jours après, il y a eu une petite Aurore Boréale horizontale, où j'ai oublié d'écrire le quantième du mois.

* Le 27, il paroît, de 8^h à 8 $\frac{1}{2}$, une petite Aurore Boréale fort basse, qui est remarquable par la figure triangulaire, ou conique, que prend la matiere fumeuse du Nord auprès de l'horizon, & par la maniere dont

* A Breuillepont.

Mém. 1733.

Gg

dont la clarté du Phénomene est couchée auprès de ses bords. J'en ai retenu la Figure.

En *Octobre*. Le 2 & le 3, Aurores Boréales *Tranquilles*.

Le 4, Aurore Boréale assez grande, bien terminée depuis $7^h \frac{1}{2}$ jusqu'à 8, mais qui s'est rendue fort confuse en augmentant; au-lieu de jets de lumière, il y avoit des especes de colonnes fumeuses qui partoient du segment obscur, & qui formoient la patte d'oie. Si elles eussent été un peu plus ferrées, & en plus grand nombre, elles auroient représenté les créneaux, ou la bande crénelée qui parut dans un moment de l'Aurore Boréale du 19 Octobre 1726. Le tems qui est devenu sombre, a aussi beaucoup contribué à rendre celle-ci informe; elle se montroit encore de tems en tems de 11^h à minuit. Dans sa plus grande régularité, je veux dire de $7^h \frac{1}{2}$ à 8 heures, le milieu de l'Arc atteignoit aux Etoiles de la *grande Ourse*, & pouvoit avoir 18 à 20 degrés de hauteur sur l'horizon. Il ne déclinait à l'Occident que de 3 ou 4°, ce qui est assez rare pour mériter d'être remarqué.

Le 5, le Phénomene reparoit comme hier, mais plus bas & plus étendu sur l'horizon. Il a été accompagné d'une espece d'arc ou de segment qui a paru quelquefois vers l'Orient, tirant vers le Midi, & qui sembloit symétriser avec l'Occident.

Les 7, 8 & 9, Aurores Boréales peu considérables, tant par elles-mêmes, que par les circonstances du tems qui font obstacle à leur apparition.

Le

Le 10, Aurore Boréale très remarquable. Je n'en ai jamais vu de mieux formée, & où le segment obscur & l'arc fussent plus régulièrement circulaires, & mieux tranchés. J'ai commencé d'en appercevoir les traces à 6^h $\frac{1}{2}$, le tems étant très serein, & le crépuscule encore dans toute sa force. A 7^h le segment & l'arc ou limbe lumineux étoient formés, comme je viens de dire, avec une netteté extraordinaire. J'ai soigneusement remarqué à quelles Etoiles répondoient toutes ses parties; le sommet du segment obscur alloit à environ le milieu de la distance de l'horizon à l'Etoile β de la *grande Ourse*, & pouvoit avoir 10 à 11 degrés de hauteur sur l'horizon; sa jambe occidentale n'alloit pas tout-à-fait à l'Azimuth du lieu où étoit alors l'Etoile *Arcturus*, ce que j'ai évalué à environ 72 ou 73 degrés d'amplitude depuis le Nord. La jambe orientale passoit au-delà de l'Etoile de la *Chevre*, & demouroit endecà de celles de la *tête de Méduse*, c'est-à-dire, à environ 50 degrés, à compter de même depuis le Nord; ce qui donne 122 ou 123 degrés d'Amplitude totale, & environ 11 degrés de déclinaison vers l'Occident. Le limbe lumineux qui bordoit le segment obscur, lui étant par-tout sensiblement parallèle ou concentrique, partageoit en deux parties égales, l'espace compris entre ce segment & l'Etoile β de la *grande Ourse*, de sorte que son sommet pouvoit avoir 15 à 16 degrés de hauteur. A 7^h $\frac{1}{2}$ a paru un second Arc lumineux, mais plus foible, rompu par son milieu, large de même de 5 à 6 degrés,

& écarté du précédent à peu près de toute sa largeur. Il n'a guere duré qu'un quart d'heure; mais il a reparu dans la suite plus d'une fois, pour quelques instans. Le Phénomene a pris diverses formes, depuis 8 heures jusqu'à près de minuit, dont j'ai retenu la note, mais dont je crois qu'il seroit inutile de rapporter ici le détail.

Les 15, 16, 28, 30 & 31, il y a de la lumière vers le Nord; mais les circonstances du tems, & du clair de la Lune, m'empêchent d'en rien dire de positif.

En *Novembre*. * Le 7, Aurore Boréale qui est tout-à-fait déclarée à 10^h $\frac{1}{2}$ ou 11^h, après avoir été un peu douteuse depuis 6^h $\frac{1}{2}$ jusques-là. La matiere qui la compose est plus opaque qu'à l'ordinaire; plusieurs Etoiles en sont obscurcies.

Le 8, apparences de l'Aurore Boréale, matiere claire & fumeuse répandue dans l'Atmosphere.

Le 12, Aurore Boréale qui paroît à 10 & 11 heures, basse, mais assez bien terminée dans son segment obscur & son Arc lumineux. J'avois remarqué un peu après le coucher du Soleil, que tout le Ciel étoit peint d'un rouge couleur de feu mêlé de verd céladon, dont l'effet étoit extrêmement beau; quelque tems après, & un peu avant la fin du crépuscule, les grandes bandes à côte de melon du Nord-Ouest au Sud-Est se trouverent répandues presque dans tout le Ciel, comme le 21 Août de l'année dernière, mais beau.

beaucoup moins régulièrement. La Lune en étoit ternie comme par un léger brouillard. Je rapporte toutes ces circonstances, les Couronnes autour de la Lune, & quelques autres, non comme étant des signes du Phénomene, ou n'en étant pas; mais parce que ne sachant point en effet ce qu'il en faut penser, je crois, en attendant, qu'il n'y a rien de mieux à faire que de les observer.

Le 13, Ciel pareil au précédent, suivi d'un vestige de Lumière Boréale près de l'horizon.

Le 23, Aurore Boréale *Occidentale* qui se manifeste par une grande clarté sur l'horizon, depuis le Sud-Ouest jusqu'au Nord-Nord-Ouest, & au-delà. La Lune & le mauvais tems l'effacent bien-tôt, & ce tems dégénère en un vent de tempête Sud-Ouest, qui dure une grande partie de la nuit.

Le 24, le Phénomene paroît comme hier, & se trouve effacé par la Lune, qui étoit dans son plein trois jours auparavant.

En *Décembre*. Le 8, depuis 7 heures jusqu'à 8^h $\frac{1}{2}$, le Ciel est parsemé de quantité de nuages, parmi lesquels il y en a plusieurs du caractère de ceux qui annoncent, ou qui suivent l'Aurore Boréale, clairs, blancs & verdâtres par leur partie supérieure; & il y en a plus de ceux-ci du côté du Nord, Nord-Ouest & Nord-Est, que par-tout ailleurs. Les uns cachent les Etoiles, & les autres les laissent paroître. Enfin le Ciel se couvre entièrement jusques vers les 9^h $\frac{1}{2}$, où il devient assez clair par reprises dans un grand espace autour du Zénit, toute la partie d'auprès de l'horizon demeurant obscure. J'ai apperçu

Gg 3 alors

alors à toutes ces reprises de clarté, & dans les intervalles changeans & successifs où brilloient les Etoiles entre des pelotons de nuages, une grande piece d'Arc ou de Zone blanchâtre tirant sur le citrin, & qui par sa constance & son immobilité m'a paru digne de remarque. Elle étoit un peu concave vers le Sud, & convexe vers le Nord. Elle passoit par la tête du *Taureau*, & venoit de là vers celle du *Bélier*, entre les Etoiles de laquelle elle s'étendoit, jusqu'à celles de la queue du *Poisson Boréal*. Elle se confondoit ensuite dans des brouillards qui montoient vers le Zénit, & qui l'ont enfin tout-à-fait dérobée à mes yeux un peu avant 10^h. Ayant mis un moment après le Globe céleste dans la situation où étoit alors le Ciel, je trouve que cette bande pouvoit avoir à l'endroit le plus élevé, un peu vers l'Occident, près de la tête du *Bélier*, quelque 54 ou 55 degrés de hauteur sur l'horizon, par son bord inférieur, & 57 ou 58 par le supérieur, car j'ai jugé sa largeur d'environ 3 degrés.

Le 9 & le 10, je vois, ce me semble, bien de la matiere Boréale répandue dans l'Atmosphère, mais les circonstances du tems m'empêchent d'en rien conclure.

Le 27 & le 30, les marques du Phénomène sont moins équivoques; le 30 sur-tout il s'est montré par une lumière rougeâtre fort vive du côté du Nord-Est, à la hauteur de 12 ou 15 degrés, laquelle faisoit visiblement partie d'un Arc Boréal, dont le reste étoit caché par des brouillards.

Cette année 1733 a été moins féconde en gran-

grandes Aurores Boréales que la précédente 1732, & celle-ci beaucoup moins que 1731, laquelle a été très remarquable dans ce genre, sur-tout en Automne; comme on peut voir par les descriptions que j'en donnai alors, & qui ont été insérées dans le volume des Mémoires de ladite année.



OBSERVATIONS

METEOROLOGIQUE S

FAITES A BEZIERS,

Depuis le commencement de 1725, jusqu'à la fin de 1733, communiquées à l'Académie

Par M. DE MAIRAN.

LEs Observations Météorologiques sont des matériaux si nécessaires à la Physique, qu'on ne sauroit trop les multiplier, sur-tout lorsqu'elles sont faites réciproquement en des lieux fort éloignés les uns des autres. Dans cette vue, je proposai en 1724 à M. Bonillet, Médecin, Secrétaire de l'Académie des Sciences & Belles-Lettres de Béziers, & dont le nom s'est fait connoître depuis long-tems dans le Monde savant, de donner ses soins à ces sortes d'observations, ou d'en charger quelqu'un de sa Compagnie. C'est ce qui a été exécuté depuis 1725 inclusivement jusqu'en 1733; savoir, les Observations du Chaud

& du Froid, du poids de l'Air, ou des différentes hauteurs du Mercure dans le Barometre, par M. *Bouillet*; & celles de l'Eau de pluye par M. *Andoque* de la même Académie, & comme lui Correspondant de l'Académie Royale des Sciences. Ces dernières Observations n'ont été poussées que jusqu'à la fin de 1732, par des raisons qu'il seroit inutile de rapporter: les autres vont, comme l'annonce le titre, jusqu'à la fin de 1733.

La situation du Bas Languedoc, & de la Ville de Béziers, à l'une des extrémités méridionales de la France, peut fournir un terme de comparaison assez marqué, eu égard à Paris, qui n'est pas loin de ses Provinces les plus septentrionales. Cette comparaison ne sauroit manquer d'être utile, & de le devenir toujours de plus en plus, pour la connoissance que nous devons tâcher d'acquérir de la température du Royaume dans ses différentes parties. Il résulte déjà assez sensiblement de la quantité de pluye qui est tombée à Béziers pendant les huit années que nous donnons ici, qu'il pleut davantage à cette Ville qu'à Paris. Car en faisant une somme totale des huit sommes de la Table suivante, on trouve 129 pouces 7 lignes & $\frac{1}{2}$ d'eau, tandis qu'aux mêmes années, comme on le recueille de nos Mémoires, il n'en est tombé à Paris que 115. pouces 9 lignes. J'avoue que l'intervalle de huit années est trop court pour en tirer une conséquence bien certaine; mais du reste il n'y auroit rien à cela d'extraordinaire, & ce ne seroit pas le seul exemple d'où l'on pourroit conclure qu'il

qu'il pleut davantage dans les pays chauds que dans les pays froids; peut-être par la même raison qu'en un même pays, à Paris par exemple, & dans la plupart des contrées de la France, les plus grandes pluies arrivent le plus souvent aux mois de Juillet & d'Août, qui sont presque toujours les plus chauds de l'année.

A l'égard du chaud & du froid qu'il a fait à Béziers pendant les neuf années dont M. *Bouillet* m'a envoyé les Observations, je ne saurois en faire la comparaison avec le chaud ou le froid de Paris, parce qu'elles ont été faites avec un Thermometre qui par sa construction & sa graduation n'indique rien de fixe ni de connu. Mais j'espère remédier à ce défaut, tant pour le passé que pour l'avenir, en envoyant à M. *Bouillet* le Thermometre de M. *de Reaumur*, avec lequel il pourra confronter & qualifier les indications de celui dont il s'est servi.

Ses Observations du Barometre donnent, comme je m'en étois apperçu pendant le séjour que j'ai fait dans le même pays, les plus grandes hauteurs du Mercure toujours plus petites de 1, 2, 3, & jusqu'à 4 lignes, qu'à Paris, & à peu près les mêmes jours. Ces hauteurs ne passent pas 28 pouces 3 lignes jusqu'en 1733, où le Mercure fut à 28 pouces 4 lignes le 4 & le 5 Février. Le 5 du même mois, le 6, le 7 & le 8, il monta à Paris à 28 pouces 6 lignes, dans le tems de ces brouillards si extraordinaires qu'il fit cette année. Il avoit été 2 lignes plus haut en 1726, le 27 Décembre, savoir à 28 pouces 8 lignes, n'ayant été en Languedoc, &

le même jour, qu'à 28. pouces 3 lignes. L'on fait en général, que cette partie de notre Atmosphere qui agit sur le Barometre devient toujours moins pesante, à mesure que la latitude des lieux de l'observation est moindre, & qu'on approche davantage de l'Equateur. La somme des plus grandes hauteurs a été, pendant les neuf années dont il s'agit, à Béziers, 253 pouces 6 lign. $\frac{1}{2}$; à Paris 255 pouces 8 lign. $\frac{1}{2}$, c'est-à-dire de 2 pouc. 2 lignes plus grande. Mais la somme des moindres hauteurs pendant ces mêmes années ayant été à Béziers à 244 pouc. 2 lign. n'a été surpassée par sa semblable à Paris que de 2 lign.; & par conséquent la différence des plus grandes aux moindres hauteurs, ou la somme des variations du Barometre qui en résulte, pendant les neuf susdites années, étant à Paris de 11 pouc. 4 lign. $\frac{1}{2}$ ne se trouve à Béziers que de 9 pouc. 4 lign. $\frac{1}{2}$, conformément encore à ce que nous savons d'ailleurs sur ce sujet, qu'en général, les variations du Barometre sont renfermées dans des limites d'autant plus étroites, qu'on approche davantage de l'Equateur; comme on remarque aussi que dans chaque pays elles sont moindres en Eté & dans les tems chauds, qu'en Hiver & dans les tems froids.

J'ajoute aux Observations dont je viens de parler, celle de l'Eclipse de Lune du 20 Juin 1731, que j'avois oublié de remettre à l'Imprimerie en son tems. Elle a été faite dans la même Ville par les mêmes Observateurs, & aussi par M. de Clapiés.

GIQUES S,

E compris 1732.

1728.			1732.	
pouces.	lignes.	po	pouces.	lignes.
0	1	2	2	8
1	8 $\frac{1}{4}$	0	1	3
1	4 $\frac{1}{4}$	1	0	3
2	9 $\frac{1}{2}$	0	1	2
1	0 $\frac{1}{2}$	0	4	5
1	6 $\frac{1}{4}$	0	0	7
0	2 $\frac{1}{4}$	0	0	6
0	0	0	1	6 $\frac{1}{2}$
0	2	0	0	5 $\frac{1}{2}$
-	-	-		



A l'égard des Observations du Thermometre & du Barometre, je vais non-seulement ajouter celles de 1733, mais spécifier encore un peu mieux celles des années précédentes, après avoir fait remarquer que je me suis toujours servi du même Thermometre & du même Barometre, mais que ces Instrumens n'ont pas été toujours placés au même endroit, à cause que j'ai changé trois fois de logement pendant cet intervalle.

Je dois aussi avertir que mon Thermometre, quoique fait à Paris par le Sr. Deville, me paroît un peu trop sensible. Il s'accorde assez bien avec beaucoup d'autres avec lesquels je l'ai comparé, à marquer le temperé au 48^{me}, 49^{me} ou 50^{me} degré ; mais il s'en écarte beaucoup dès qu'il est descendu au dessous du 40^{me}, ou qu'il est monté au dessus du 60^{me} degré ; ce qui vient, sans doute, principalement de la capacité de la boule, qui doit être trop grande par rapport au diametre & à la hauteur du tuyau, & peut-être aussi, en partie, de la liqueur, qui est plus pure que celle des autres Thermometres. Quoique cette remarque ait été communiquée avec les Observations de 1725, on a cru qu'il ne seroit pas inutile de la répéter ici.

1725. Le plus grand froid du commencement de cette année est arrivé le 4 Février, le Thermometre exposé sur une fenêtre étant descendu le matin au 20^{me} degré ; & celui de la fin de l'année est arrivé le 7. & le 30 Décembre, le Thermometre marquant 22 degrés.

Le plus grand chaud est arrivé le 21 Septembre, le Thermometre étant monté à 92 degrés sur une fenêtre non exposée au Soleil vers les 3 à 4 heures du soir.

1726. Le plus grand froid est arrivé les 17, 18, 20 & 21 Janvier, le Thermometre étant descendu au 5^{me} degré. Et le plus grand chaud le 12 d'Août, le Thermometre étant monté à 90 degrés $\frac{1}{2}$.

1727. Le plus grand froid le 6 Février, le Thermometre étant à 16 degrés; & le 1^{er} Décembre, le Thermometre étant à 18 degrés. Le plus grand chaud le 27 Juillet, le Thermometre étant monté à 89 degrés.

1728. Le plus grand froid le 13 Février, le Thermometre étant à 16 degrés $\frac{1}{2}$; & le 29 Décembre, le Thermometre à 12 degrés. Le plus grand chaud le 19 d'Août, le Thermometre étant monté à 99 degrés.

1729. Le plus grand froid de cette année est arrivé le 17 Janvier, la liqueur du Thermometre n'étant qu'à 1 degré $\frac{1}{2}$ au-dessus de la boule. Et le plus grand chaud le 5 Juillet, la liqueur du Thermometre étant montée au-dessus du 100^{me} degré, & ayant été obligé de le retirer de sa place, de crainte qu'il ne crevât.

1730. Le commencement de cette année n'a pas été froid, le Thermometre n'étant pas descendu au-dessous de 28 de-

degrés; il n'étoit pas même descendu si bas à la fin de l'année précédente. Le plus grand chaud est arrivé depuis le 10 jusqu'au 14 Juillet, le Thermometre étant monté à 93 degrés. Et le plus grand froid est arrivé le 16 Décembre, le Thermometre étant descendu à 11 degrés; & les 14, 18 & 19 du même mois, le Thermometre étant à 12 degrés.

1731. Le plus grand froid est arrivé le 5 Février, le Thermometre étant descendu à 5 degrés; & les 9 & 15 Décembre, le Thermometre étant à 19 deg. Le plus grand chaud est arrivé le 10 Juillet, le Thermometre étant monté à 93. degrés.

1732. Le plus grand froid le 6 Janvier, le Thermometre étant descendu à 13 degrés; & le 15 Décembre, le Thermometre étant à 15 degrés. Le plus grand chaud les 3 & 4 d'Août, le Thermometre étant monté à 94 degrés.

1733. Le plus grand froid de cette année est arrivé le 29 Janvier, le Thermometre étant descendu à 24 deg. Et le plus grand chaud le 10 Juillet, le Thermometre étant monté à 98 degrés.

Toutes les observations du froid ont été faites le matin, & celles du chaud vers les 3 à 4 heures du soir.

On a déjà envoyé les observations du Barometre, mais on ne laissera pas de rapporter

ter encore ici la plus grande & la moindre hauteur chaque année.

		Hauteur du Barom.	
1725.	Le 3 Mars.....	28 ^p	2 ^l $\frac{1}{2}$
	Le 3 Avril, & le 29 Octobre.	27	4
1726.	Le 26 & le 27 Décembre ...	28	3
	Le 25 Janvier.....	27	3
1727.	Le 19, le 29 & le 30 Novem- bre, & le 1 ^{er} Décembre.	28	2
	Le 31 Janvier.....	27	0
1728.	Souvent pendant l'année. ...	28	0
	Le 30 Décembre.....	26	11
1729.	Le 31 Décembre.....	28	1
	Le 12 Janvier.....	27	3
1730.	Le 24 & le 25 Novembre..	28	1 $\frac{1}{2}$
	Le 11 & le 12 Mars, & le 16 Octobre.	27	1
1731.	Le 4 & le 5 Janvier.....	28	2 $\frac{1}{2}$
	Le 8 Février.....	26	8
1732.	Le 23 Février.....	28	2
	Le 22 & le 23 Mars.....	27	4
1733.	Le 4 & le 5 Février.....	28	4
	Le 24 & le 25 Mars.....	27	4

D'où il réfute que la plus grande hauteur du Barometre dans l'intervalle de ces 9 années, n'a pas paffé 28 pouces 4 lignes, & que la moindre hauteur n'a pas été au deffous de 26 pouces 8 lign.; & qu'ainfi l'étendue de fes variations n'est pas allée au-delà de 1 pouce 8 lignes.

OBSERVATION

De l'Eclipse de Lune du 20 Juin 1731.

LE 19 Juin 1731 au soir, nous nous rendîmes, M. de Clapiés, M. Astier & moi, à la Tour de l'Evêché, où j'avois eu soin de régler exactement notre Pendule; & la Lune qui, peu de tems après minuit, avoit paru embrumée, nous parut à la vue simple, entièrement éclipfée à 1h 10' du matin 20^{me} Juin, tant la pénombre étoit forte; mais après 1h 17' nous ne doutâmes plus, même avec la Lunette de 7 pieds, du commencement de l'Eclipse, de sorte qu'il fut déterminé à cet instant-là, quoique nous soupçonnâssions quelques secondes d'erreur. Toutes les autres phases furent déterminées exactement avec la même Lunette de 7 pieds.

Temps vrai.

A 1h 17'	0"	Commencement de l'Eclipse.
33	46	L'ombre couvre Helicon.
34	40	_____ rase Platon.
35	22	_____ couvre Platon.
43	5	_____ au bord d'Hermes.
44	45	_____ couvre Hermes.
2	22	13 Platon entierement hors de l'ombre.
40	57	Fin de l'Eclipse.

Si de la fin de l'Eclipse, on retranche 1h 24' 26" qui est la durée de l'Eclipse, selon le calcul de la Connoissance des Temps, on aura

ra le commencement de l'Eclipse à Béziers à 1^h 16' 31", une demi-minute plutôt qu'il n'avoit été déterminé ci-dessus.

Pendant cette Eclipsé, M. de Clapiés qui avoit fait porter à la Tour son Quart-de-Cercle fait par Langlois, observa le passage des cornes & de l'ombre par les fils, comme il suit.

A 1 ^h	52'	46"	Première corne à l'horizontal.
53	17		Milieu de l'ombre à l'horizontal.
53	26		Dernière corne à l'horizontal.
55	23		Première corne à l'oblique.
56	13		Milieu de l'ombre à l'oblique.
56	24		Première corne au vertical.
57	1		Dernière corne à l'oblique.
57	16		Milieu de l'ombre au vertical.
58	0		Dernière corne au vertical.



OBSERVATIONS
MÉTÉOROLOGIQUES
FAITES

PENDANT L'ANNÉE M. DCCXXIII.

Par M. MARALDI. *

Observations sur la quantité de Pluie.

	pouc. lign.		pouc. lign.
En Janvier ...	0 11	En Juillet	0 6
Février ...	0 9 $\frac{1}{2}$	Août 0	9
Mars 1	7 $\frac{1}{2}$	Septembre. 0	3
Avril 0	4 $\frac{2}{3}$	Octobre ... 0	2 $\frac{1}{2}$
Mai 2	3	Novembre. 0	4 $\frac{1}{2}$
Juin 1	6	Décembre. 0	3
	<u>7 5 $\frac{1}{2}$</u>		<u>2 3 $\frac{1}{2}$</u>

Donc la quantité de la pluie tombée en 1733 à l'Observatoire est de 9 pouces 9 lignes $\frac{1}{2}$, ce qui marque une année sèche par rapport à 17 pouces $\frac{1}{2}$ qu'on a établis pour une année commune.

La pluie tombée dans les six derniers mois n'est que de 2 pouces 3 lignes $\frac{1}{2}$, qui n'est pas le tiers de celle qui est tombée dans les six

* 9 Janvier 1734.

six premiers mois, qui a été de 7 pouces 5 lignes $\frac{1}{2}$, & n'est que de $\frac{1}{2}$ de ligne plus grande que celle qui est tombée pendant le seul mois de Mai.

Observations sur le Thermometre.

Le Thermometre a marqué le plus grand froid de l'année 1733, le 31 de Janvier & le premier jour de Février, car la liqueur du Thermometre ordinaire descendit dans ces deux jours à 26 parties $\frac{1}{2}$, & celle du Thermometre de M. de Reaumur à 998 $\frac{1}{4}$, c'est-à-dire, à 1 $\frac{1}{4}$ parties au-dessous de la congélation artificielle de l'eau, par un tems serein à un vent de Nord-Est, ce qui marque un froid très modéré.

Ces mêmes Thermometres ont marqué la plus grande chaleur de l'Été le 7, le 8 & le 9 de Juiller, car la liqueur du premier est montée à 71 parties au lever du Soleil, & à 77 après-midi, & celle du second a été à 1022 parties, c'est-à-dire à 22 parties au-dessus de la congélation de l'eau au lever du Soleil, & à 1026 après-midi.

Sur le Barometre.

Le Barometre a marqué la plus grande élévation du Mercure à 28 pouces 6 lignes le 5, le 6, le 7 & le 8 de Février, par ces grands brouillards qu'il a fait au commencement de ce mois, & il a marqué la moindre élévation à 27 pouces 4 lignes $\frac{1}{2}$ le 30 de Mars, &

& le 2 d'Avril par un tems couvert & un vent de Sud-Ouest foible.

On a eu cette année de grands Vents de Sud & de Sud-Ouest, & particulièrement dans les mois de Janvier, Mars & Décembre.

Déclinaison de l'Aiguille aimantée.

J'ai observé plusieurs fois, au commencement de Décembre, avec une Aiguille de 4 pouces, la déclinaison de l'Aimant, de 15° 45' au Nord-Ouest.

~~~~~  
**MESSIEURS DE LA SOCIÉTÉ**

*Royale des Sciences, établie à Montpellier, ont envoyé à l'Académie l'Ouvrage qui suit, pour entretenir l'union intime qui doit être entre elles, comme ne faisant qu'un seul Corps, aux termes des Statuts accordés par le Roi au mois de Février 1706.*

---

**M E M O I R E**

*Où l'on donne les raisons pourquoi les Chevaux ne vomissent point.*

Par M. LAMORIER.

**C**ETTE question fut proposée il y a longtemps dans une Assemblée de la Société Royale des Sciences ; elle me parut difficile.

difficile, & peu intéressante, & je ne me suis déterminé à la résoudre que parce que j'ai considéré que la connoissance des causes qui empêchent les Chevaux de vomir, pouvoit contribuer à établir les causes qui concourent au vomissement dans l'Homme.

Les Maréchaux les plus employés, & ceux qui fréquentent les Chevaux, conviennent qu'ils ne vomissent jamais naturellement, & que jusqu'ici on n'a trouvé aucun Remede qui excite en eux un véritable vomissement de matieres alimenteuses. Il est vrai qu'ils jettent par les nazeaux & par la bouche beaucoup de glaires, soit dans quelques maladies qui les attaquent, comme dans la gourme & dans le morfondement, soit que l'on ait injecté dans les nazeaux ou dans la bouche quelque breuvage âcre & piquant; mais ces matieres glaireuses ne viennent point de l'estomac. M. Solleyfel, qui n'a pas considéré combien les glandes de la membrane pituitaire qui tapisse tous les sinus de la base du Crâne, combien les glandes salivaires & celles qui environnent le Larinx & le Pharynx peuvent fournir d'humidités, a fait venir cette matiere de la gourme & du morfondement tantôt des Rognons, tantôt de la Rate.

Le Vin émétique donné à une certaine dose, devient sudorifique; mais si on s'avise de le donner à plus grande dose, il survient un battement des flancs, une chaleur ardente, le Cheval devient quelquefois fourbu, & souvent il meurt sans qu'on ait pu le faire vomir.

Pour

Pour rendre raison de ce fait, je crus d'abord que les Chevaux n'ayant point de Vésicule de fiel, la bile ne pouvoit pas acquérir cette amertume qu'elle acquiert dans l'Homme & dans les animaux qui ont une Vésicule, & qu'elle ne pouvoit pas picotter l'estomac pour aider le vomissement; mais ayant réfléchi que le Perroquet & d'autres animaux vomissent sans avoir de Vésicule du fiel, & que d'ailleurs la force des Emériques devoit suppléer au défaut de l'amertume de la bile, j'abandonnai cette cause.

Je m'imaginai ensuite que les fibres de l'estomac des Chevaux ne devoient pas avoir la même force & le même ressort, que les fibres de l'estomac de l'Homme & des animaux qui vomissent; mais ayant examiné ces fibres, je les ai trouvées très fortes & très épaisses: elles seroient donc capables d'une suffisante contraction pour exciter le vomissement, si elles pouvoient être aidées du secours du diaphragme & des muscles du bas-ventre, comme dans l'Homme.

C'est dans le défaut de ces deux forces qui concourent ensemble, & dans la découverte d'une Valvule placée à l'orifice supérieur de l'estomac, que j'établis la cause du phénomène que je traite; elle paroît du moins démontrée, comme on le verra par les observations suivantes. Je n'ai pas jugé à propos de donner ici le mécanisme du Vomissement, cette matiere a été suffisamment traitée. J'ai cru aussi qu'il étoit inutile de faire dessiner les parties que j'ai examinées; outre qu'on

qu'on peut les voir aisément sur l'original, la plupart sont très bien gravées dans les Tables de Ruiny. On peut les voir aussi dans l'Anatomie générale du Cheval, traduite nouvellement de l'Anglois par M. de Garfaut, Capitaine du Haras du Roi.

Ma première observation fut faite par hazard sur un petit Cheval qui fut forcé à une montée. Curieux de voir la cause de sa mort presque subite, j'assistai à son ouverture. Nous trouvâmes le Diaphragme fendu en long, comme si on l'avoit déchiré; cet accident, que l'on voit très souvent dans les Chevaux qui périssent après des efforts, de même que beaucoup d'hernies diaphragmatiques, démontrent la foiblesse de leur diaphragme.

La seconde observation fut faite sur un Cheval dont les viscères étoient parfaitement sains. Les fausses côtes forment un grand cercle fort allongé du côté du sternum, ce qui rend la région épigastrique très grande; le grand boyau \* ou colon occupe presque tout le bas-ventre, il couvre le foye, & il s'applique contre une grande partie du diaphragme; le ligament ombilical est coudé & presque en équerre, la longueur de ce ligament est double de l'espace compris depuis le nombril jusqu'au cartilage xyphoïde; on ne découvre le foye † qu'après avoir porté le grand boyau vers le bas du ventre; on voit alors l'estomac dont la situation est très profonde,

\* *V. Ruiny, Pl. 32. ou M. de Garfaut, Pl. 3.*

† *V. Ruiny, Pl. 30.*

fonde, ce qui me fit penser que ce viscere ne pouvoit pas recevoir les compressions des muscles du bas-ventre. Mon idée fut confirmée par une troisieme observation faite sur un Cheval où je trouvai l'estomac entierement rempli d'alimens, qui n'avoit pourtant paru qu'après avoir fait ôter le grand boyau; ayant examiné ensuite la distance de l'estomac jusqu'aux muscles du bas-ventre, je vis qu'il s'en falloit près d'un pied que ces muscles pussent faire quelque pression sur ce viscere.

Il étoit question d'examiner si dans l'orifice supérieur il n'y avoit pas quelque espece de soupape ou de valvule, qui pût empêcher le retour des alimens dans l'œsophage. Je tirai l'estomac, où je laissai le duodenum & deux ou trois pans d'œsophage; une compression assez forte ne put rien faire sortir par l'orifice supérieur: mais ayant vidé par le duodenum une partie des alimens grossiers, je mis de l'eau dans l'estomac pour détremper le reste, & l'ayant comprimée sur un plan horizontal, l'eau sortit par l'orifice supérieur, en moindre quantité véritablement que par le pilore; mais ayant relevé le fond & abaissé les orifices, l'eau sortit alors en plus grande quantité par l'œsophage que par le duodenum. Je fis ensuite souffler l'estomac par l'orifice inférieur, pour voir si l'air pourroit être retenu; mais dès que ses membranes furent un peu distendues, l'air s'échapa par l'œsophage. Enfin j'ouvris l'estomac, pour voir le dedans de l'orifice supérieur; j'y découvris une Valvule qui alloit de devant en ar-

arriere, & qui pouvoit couvrir presque les deux tiers du diametre de l'orifice. Je fus curieux de voir la figure de cette valvule dans l'état sec, je fis souffler plusieurs estomacs, que je fis sécher, après les avoir liés dans l'œsophage & dans le duodenum; la valvule fut dans tous fort sensible, elle avoit la figure d'un croissant, & elle ne couvroit qu'environ le tiers de l'orifice, parce que dans l'état sec il est plus distendu que dans l'état frais. On peut comparer cette valvule à un des panneaux de la valvule du colon humain, à la difference que dans celle-ci les deux panneaux dont elle est composée étant joints ensemble, elle empêche l'air & l'eau d'entrer du colon dans l'ileon, ce que ne fait point la valvule de l'orifice supérieur de l'estomac du Cheval.

Je n'ai pu étendre la découverte de cette valvule que sur l'estomac de l'Ane & du Mulet, où je l'ai observée à peu de difference près; peut-être la trouveroit-on aussi dans le reste des solidipedes, savoir dans le Monoceros, dans l'Onager & dans l'Eléphant.

Je comparai ensuite la situation de l'estomac des Chevaux avec ceux de l'Homme & des animaux qui vomissent. Je ne répéterai pas le détail exact de la situation particulière de l'estomac de l'Homme que nous a donné le célèbre & M. Winslow dans son Exposition anatomique du Corps humain, n'ayant besoin que de la situation générale de ce viscere. L'estomac de l'Homme \* qui est entierement  
vui-

\* V. *Eustache, Tab. 9.*



vuide, ne paroît à la vérité qu'après avoir tiré le colon un peu en bas, ou bien après avoir relevé un peu le bord antérieur du foye; mais si l'estomac \* est plein, il paroît dès que le péritoine est ouvert, sans toucher ni au foye ni au colon.

Dans les Chiens, dans les Chats, qui vomissent aisément, l'estomac est placé beaucoup plus près des muscles du bas-ventre que dans l'Homme. Ces animaux n'ont presque point de gros boyau, le colon qui part du cæcum s'éloigne de l'estomac, & il se jette d'abord sur le derriere des intestins grêles pour former le rectum, de maniere que dans ces animaux toute la pression des muscles du bas-ventre se fait sur l'estomac.

On doit regarder l'action par laquelle les ruminans font revenir l'herbe à la bouche pour la remâcher, comme un vomissement intercalaire; aussi quand on voit ouvrir les Bœufs & les Moutons, la premiere chose qui se présente, c'est la pance ou l'herbier qui touche immédiatement les muscles du bas-ventre.

Nous concluons de ces observations, 1°. Que l'on ne sauroit douter que les Emétiques ne mettent les muscles du bas-ventre des Chevaux dans une violente contraction, ce qui est démontré par le battement des flancs.

2°. On ne peut pas dire que la longueur de l'œsophage soit la cause qui les empêche de vomir, puisque les Bœufs & les Chameaux l'ont encore plus long; cependant ils ruminent.

3°. La

\* V. Vesale, Tom. 1. Fig. 6. Liv. 5.  
Mém. 1733. Hh

3°. La valvule de l'orifice supérieur peut bien empêcher les alimens grossiers & durs, de sortir par le vomissement, mais elle seule ne sauroit empêcher les alimens qui sont digérés; de sorte que si les Chevaux ne vomissent point les liquides, c'est parce que leur estomac est placé vers le derriere de la région épigastrique, c'est-à-dire, vers les reins, & qu'il ne peut pas recevoir les compressions des muscles du bas-ventre, sur-tout des muscles droits: d'ailleurs le diaphragme dont nous avons établi la foiblesse, ne peut pas pousser avec force l'estomac contre eux; mais la grande raison est que leur colon étant d'une grandeur prodigieuse, reçoit toute la contraction de ces muscles, & les empêche d'agir sur l'estomac.

4°. Le défaut de pression des muscles du bas-ventre sur l'estomac des Chevaux, confirme le sentiment de ceux qui ont démontré par de bonnes expériences, que le vomissement dans l'Homme, & dans beaucoup d'animaux, dépendoit de la pression des muscles du bas-ventre & du diaphragme sur le ventricule.

5°. On pourroit se flatter de rendre raison pourquoi certaines personnes ne vomissent jamais, quelques Emétiques qu'elles prennent, & que l'on dit communément avoir un *estomac de Cheval*, tandis qu'il y en a d'autres qui vomissent quand ils veulent, & que l'on peut regarder comme des ruminans. La Nature auroit-elle placé dans les premiers une valvule dans l'orifice supérieur? Il est bien plus

plus naturel de penser que leur estomac est placé vers le derriere de la région épigastrique, ou bien que leur colon étant plus grand que dans les autres Hommes, il empêche les muscles du bas-ventre d'agir sur l'estomac; tandis que dans les derniers, l'estomac doit être placé vers le devant de la région épigastrique, & leur colon doit être fort petit.

C'est une conjecture qui peut recevoir des éclaircissemens par l'ouverture des cadavres de ceux qui n'ont jamais vomé, & de ceux qui ont, pour ainsi dire, ruminé.

Enfin, si l'on peut pénétrer les intentions que la Nature a eues en plaçant, & en conformant ainsi l'estomac des Chevaux, on peut dire que ces animaux sont destinés à des courses & à des efforts très considérables, qui les exposeroient à vomir trop facilement les alimens déjà digérés, & qui doivent réparer les grandes pertes qu'ils font dans leurs travaux si pénibles & si nécessaires.

J'ai fait dessiner la Valvule de l'orifice supérieur dans l'état sec, avec une portion de l'Estomac & de l'Oesophage. L'observation dans cet état pouvant devenir difficile par la difficulté qu'il y a de dessécher l'estomac du Cheval après avoir été soufflé, par rapport à son grand volume, je me suis servi très commodément dans cette occasion de la dissolution du Sel que l'on tire de la terre après en avoir tiré le Salpêtre. Cette liqueur saline & nitreuse conserve & dessèche parfaitement

*Hb 2*


bien

bien les pieces d'Anatomie. J'ai fait part depuis quelque tems à la Société de la maniere de la faire & de s'en servir.


F I N.



LIS.











## AVIS AU RELIEUR.

Le Relieur aura soin de conserver le papier blanc qui est à côté des Figures, afin de les faire déborder hors du Livre.

## AAN DEN BOEKBINDER.

De Boekbinder zy gewaarschouwt het papier ter zyde de Figuren niet af te snyden, maar zodaanig in te zetten, datze buiten het Boek uitflaan.



L I S T E  
DE MESSIEURS  
D E  
L'ACADEMIE  
R O Y A L E  
D E S  
S C I E N C E S ,


Depuis l'Etablissement de cette Com-  
pagnie en 1666, jusqu'en 1733.

A V E C  
L E C A T A L O G U E

*des Ouvrages qu'ils ont publiés.*



A A M S T E R D A M ,  
Chez P I E R R E M O R T I E R .  
M D C C X X X V I I .





## AVERTISSEMENT.

**C**ETTE LISTE est Chronologique. A côté du Nom de chaque Académicien, à gauche on y a mis l'année de sa Reception, à droite l'année de sa Mort. Il n'y a rien vers la droite à côté du Nom de ceux qui vivent. Les Points de ce même côté signifient que l'Année de la Mort de ces Académiciens est inconnue.

On a indiqué leurs Ouvrages, ordinairement sur l'Edition la meilleure ou la plus complète, sans rapporter toutes celles qui ont été faites. On en a excepté tout ce qui se trouve dans les Volumes de l'Académie en forme de Mémoires, pour lesquels on renvoie aux Tables des Matieres. On a encore affecté de ne citer presque que les Ouvrages de Physique & de Mathématique; ainsi on ne doit pas s'attendre de trouver ici une Liste complète de tous ceux

(a) 2 que

## AVERTISSEMENT.

*que plusieurs Académiciens ont publiés dans  
différens genres.*

*Après cette Liste générale on en trouve-  
ra une Alphabétique , & une particulière  
de l'Académie , telle qu'elle est à présent.*

L I S.



L I S T E  
DE MESSIEURS  
D E  
L'ACADEMIE  
R O Y A L E  
D E S  
S C I E N C E S ,

Depuis l'Etablissement de cette Com-  
pagnie , jusqu'en 1733.

*Avec le Catalogue des Ouvrages qu'ils ont publiés.*



Année  
de  
Recept.

Année  
de la  
Mort.

1666



PIERRE DE CARCAVI, 1684  
Conseiller au Parlement de  
Toulouse, puis Conseiller  
au grand Conseil, Garde de  
la Bibliothèque du Roi.  
Géometre.

(a) 3

On

## LISTE CHRONOLOGIQUE

On a de lui quelques Lettres imprimées parmi celles de M. Descartes.

1666 Chrétien HUYGHENS DE ZUYLI- 1695  
CHEM. Géometre.

Ses Ouvrages sont,

- 1 *Horologium.*
- 2 *Horologium Oscillatorium, sive de motu pendulorum ad horologia aptatio, demonstrationes geometrica.*
- 3 *Brevi institutio de motu horologiorum ad inveniendas longitudes.*
- 4 *Controversia de sua centri Oscillationis determinatione.*
- 5 *Machina quadam & varia circa Mechanicam, scilicet:*  
*Inventio horologiorum portatilium exactissimorum.*  
*Novum genus Libellæ telescopia instructa.*  
*Astroscopia Compendiaria Tubi optici molimine liberata.*  
*Nova methodus construendi Barometrum.*  
*Nova vis movens mediante pulvere nitrato & aëre.*  
*Demonstratio Equilibræ Bilancis.*  
*De potentiis fila funesve trabentibus.*  
*Inventio Lineæ juxta quam si Corpus descendat temporibus aequalibus, æqualiter tellurem versus accedat.*  
*Solutio problematis de linea in quam flexile se pondere proprio curvat.*  
*Annotationes in librum D. Renau de Manuaria Nautica.*
- 6 *Theoremata de Quadratura Hyperbo-*

lic,



les, Ellipsis & Circuli ex dato  
portionum gravitatis centro, quibus  
subjuncta est *Ἐξήρασις* Cyclometria  
cl. viri Gregorii à Sancto Vincentio,  
cum assertione hujus *Ἐξήρασις*.

7 De Circuli magnitudine inventa.

8 De Circuli & Hyperbolæ quadraturâ  
Controversia.

9 Geometrica varia, scilicet:

Constructio loci ad Hyperbolam per  
Asymptotos.

Demonstratio Regula de maximis &  
minimis.

Regula ad inveniendas Tangentes li-  
nearum curvarum.

Epistola de Curvis quibusdam peculia-  
ribus.

Solutio Problematis à D. Joan. Ber-  
noulli propositi.

10 De Saturni Luna seu Satellite obser-  
vatio nova.

11 Systema Saturnium cum assertione Sy-  
stematis sui.

12 De Saturni annulo observationes.

13 Cosmotheoros, sive de Terris Cœ-  
lestibus earumque ornatu conjectura.

14 De Ratiociniis in Ludo Aleæ.

15 Novus Cyclus Harmonicus.

16 Varia de Optica.

17 Experimenta Physica.

18 Dioptrica.

19 Commentarii de formandis poliendis-  
que vitris ad Telescopia.

20 Dissertatio de Coronis & Parbeliis.

21 De motu corporum ex percussione.

22 De vi centrifuga.

23 Descriptio Automati Planetarii.

24 Traité de la Lumière, où sont ex-

# § LISTE CHRONOLOGIQUE

1666 pliquées les causes de ce qui lui arrive dans la Réflexion & dans la Réfraction, &c.

25 Discours de la cause de la Pesanteur.

26 Traité de l'Aiman. MS. dans les *Registres de l'Académie.*

Tous ces Ouvrages, excepté le dernier, ont été recueillis en sept Volumes in-4°. & imprimés à Leyde chez Vander Aa en 1724. & à Amsterdam chez les Janson-Waesberge en 1728.

1666 Gilles PERSONNE DE ROBERVAL 1675  
Professeur Royal en Mathématiques dans la Chaire de Ramus, & dans celle du College de Maître Gervais.  
*Géometre.*

Ses Ouvrages sont,

1 Observations sur la composition des Mouvements, & sur le moyen de trouver les Touchantes des lignes courbes.

2 Projet d'un Livre de Méchanique, traitant des Mouvements composés.

3 *De recognitione Equationum.*

4 *De Geometrica planarum & cubicarum Equationum resolutione.*

5 Traité des Indivisibles.

6 *De Trochoïde ejusque spatio.*

7 *Epistola ad Mersennum & Torricellium.*

Ces Ouvrages sont imprimés dans le Tome III. des Mémoires de

l'Aca-

1666 l'Académie Royale des Sciences, contenant les Ouvrages adoptés, in 4°. imprimés à Amsterdam 1737. chez Pierre Mortier, & que l'on peut avoir séparément.

8 Elémens de Géométrie. MS. dans les Registres de l'Académie.

9 *Aristarchi Hamii de mundi systemate, partibus & motibus ejusdem, Libellus, cum notis &c.* Paris. 1644. in-12. Extat etiam correctior in 3°. Tom. *Observationum Physico-Mathematicarum Merfenni.*

1666 Nicolas FRENICLE DE BESSY, 1675  
Conseiller du Roi en sa Cour des Monnoyes. Géometre.

Ses Ouvrages sont,

1. Méthode pour trouver la Solution des Problèmes par les Exclusions.

2. Traité des Triangles rectangles en nombres.

3. Abrégé des Combinaisons.

4. Des Quarrés ou Tables magiques, avec des Tables, &c.

Ces Ouvrages se trouvent dans le Tome II. des Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, contenant les Ouvrages adoptés, in 4°. imprimés à Amsterdam chez Pierre Mortier en 1736. & que l'on peut avoir séparément.

# 10 LISTE CHRONOLOGIQUE

1666 Adrien AUZOUT. *Astronome.*

1691

Ses Ouvrages sont,

1. Lettres à M. l'Abbé Charles sur le *Ragguaglio di nuove osservazioni, &c. da Giuseppe Campani*, avec des Remarques où il est parlé des nouvelles découvertes dans Saturne & dans Jupiter, &c.
  2. Lettres à M. Hooek sur le sujet des grandes Lunettes.
- Ces Traités se trouvent dans le Tome VI. des Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, contenant les Ouvrages adoptés, in 4<sup>o</sup>. imprimés à *Amsterdam*, chez *Pierre Mortier* en 1736. & que l'on peut avoir séparément.
3. Du Micrometre, & de son usage.
  4. Mesures prises sur les Originaux, & comparées avec le Pied du Châtelet de Paris.
- Ces Traités se trouvent dans le Tome IV. des Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, contenant les Ouvrages adoptés, in 4<sup>o</sup>. imprimés à *Amsterdam*, chez *Pierre Mortier* en 1736. & que l'on peut avoir séparément.
5. Ephémérides de la Comete (qui a paru sur la fin de l'année 1664. & au commencement de 1665.) 4<sup>o</sup>. Paris 1665.

Jean

1666 Jean PICARD, Prêtre. *Astronome.* 1682

Ses Ouvrages sont,

- 1 Traité du Nivellement.
  - 2 Pratique des grands Cadrans par le Calcul.
  - 3 Fragmens de Dioptrique.
  - 4 *Experimenta circa Aquas effluentes.*
  - 5 *De Mensuris.*
  - 6 *De Mensura Liquidorum & Aridorum.*
  - 7 Mesure de la Terre.
  - 8 Voyage d'Uranibourg, ou Observations Astronomiques faites en Dannemarc.
  - 9 Observations Astronomiques faites en divers endroits du Royaume.
- Ces Traités se trouvent dans le Tome IV. des Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, contenant les Ouvrages adoptés, in 4<sup>o</sup>. imprimés à *Amsterdam*, chez *Pierre Mortier* en 1736. & que l'on peut avoir séparément.
- 10 La Connoissance des Tems pour les années 1679. 1680. 1681. 1682. 1683.

1666 Jacques BUOT, Ingénieur du Roi, 1675  
& Professeur de Mathématiques des Pages de la Grande Ecurie. *Géomètre*

- Il a publié : Usage de la Roue de Proportion, avec un Traité d'Arithmétique. *Paris* 1647. 8<sup>o</sup>.

(a) 6

Leçons

1666 Leçons de Mathématiques faites aux  
Pages du Roi. Paris 4<sup>o</sup>.

1666 Jean-Baptiste DU HAMEL, Aumô- 1706  
nier du Roi, Secrétaire, & depuis  
Anatomiste.

Ses Ouvrages sont,

- 1 *Elementa Astronomica, ubi Theodosii Tripolita Sphaericorum libri tres cum universa triangulorum resolutione, nova, succincta & facilissima arte demonstrantur.* Paris. 1643. in-16.
- 2 *De Meteoris & Fossilibus libri duo.* Paris. 1660. 4<sup>o</sup>.
- 3 *Astronomia Physica, seu de Luce, natura, & motibus corporum Cœlestium, &c.* Paris. 1660. 4<sup>o</sup>.
- 4 *De Consensu veteris & novæ Philosophiæ, Libri duo.* Paris. 1663. 4<sup>o</sup>.
- 5 *De Corporum affectionibus cum manifestis tum occultis, seu promota per experimenta Philosophiæ specimen.* Parisiis 1670. 12.
- 6 *De Mente humana Libri quatuor.* Paris. 1672. 12.
- 7 *De Corpore animato, seu promota per experimenta Philosophiæ Specimen alterum.* Paris. 1673. 12.
- 8 *Philosophia vetus & nova ad usum Scholæ accommodata, &c.* Paris. 1681. in-12, 6 Vol. & ibid. 1684. 4<sup>o</sup>. 2 Vol.
- 9 *Regiæ Scientiarum Academia Historia.* Paris. 1698. 4<sup>o</sup>. & ibid. 1701. 4<sup>o</sup>. Editio auctior.

Marin

1666 Marin CUREAU DE LA CHAMBRE, 1671.  
Medecin ordinaire du Roi, de l'A-  
cadémie Françoisé. *Physicien.*

Ses Ouvrages sont,

- 1 Les Caracteres des Passions. Paris.  
1640. & suiv. 4°. 5 Tomes.
- 2 L'Art de connoître les Hommes.  
Paris 1660. 4°.
- 3 Le Systême de l'Ame. Paris 1664.  
4°.
- 4 Traité de la Connoissance des A-  
nimaux. Paris 1684. 4°.
- 5 Nouvelles Pensées sur la cause de  
la Lumiere. Paris 1662. 4°.
- 6 Nouvelles Observations sur l'Iris.  
Paris 1662. 4°.
- 7 Discours sur les Causes du Débor-  
dement du Nil, & de la Nature  
divine, selon les Platoniciens.  
Paris 1665. 4°.
- 8 *Nova Methodus pro explanandis Hip-  
pocrate & Aristotele.* Paris 1655.  
4°.
- 9 *Liber Physica Auscultationis Aristot-  
elis, Gr. Lat.* Paris 16. . . 4°.
- 10 La Physique d'Aristote en Fran-  
çois. Paris 16. . . 4°.
- 11 Nouvelles Conjectures sur la Di-  
gestion. Paris 1636. 4°.
- 12 Discours de la Chiromance. Paris  
1653. 4°.
- 13 Discours de l'Amitié & de la Hai-  
ne qui se trouvent entre les A-  
nimaux. Paris 1667. 8°.
- 14 Recueil des Epitres, Lettres &  
Préfaces. Paris 1664. 12.

(a) 7

Clau-

1666 Claude PERRAULT, Docteur en 1688  
Médecine de la Faculté de Paris.  
*Physicien.*

Ses Ouvrages sont,

- Essais de Physique, ou Recueil de plusieurs Traités touchant les choses naturelles; savoir,
- 1 De la Pesanteur des Corps, de leur Ressort, & de leur Dureté.
  - 2 Du Mouvement peristaltique.
  - 3 De la Circulation de la Sève des Plantes.
  - 4 Nouvelle insertion du Canal Thorachique.
  - 5 Découverte d'une Communication du Canal Thorachique avec la veine Cave inférieure.
  - 6 Description d'un nouveau Conduit de la Bile.
  - 7 Traité du Bruit.
  - 8 De la Musique des Anciens.
  - 9 De la Méchanique des Animaux,  
ou  
Des Organes des Sens.  
Des Organes du Mouvement.  
Des Organes de la Nourriture.
  - 10 De la Génération des Parties qui reviennent à quelques Animaux après avoir été coupées.
  - 11 Des Sens extérieurs.
  - 12 De la Transparence des Corps.
  - 13 De la Réflexion des Corps.
  - 14 De l'endurcissement de la Chaux.
  - 15 Expériences sur la Congélation.
  - 16 Expériences faites pour examiner la bonté des Eaux.

17 De



- 1666 17 De la Transfusion du Sang.  
 18 Lettres & Observations sur diverses choses de Physique & de Mécanique.  
 19 Recueil de plusieurs Machines de nouvelle invention.  
 Tous ces Traités ont été rassemblés & imprimés à *Leyde* en 1721. 4<sup>e</sup>. 2 Vol.  
 20 Ordonnance des cinq especes de Colomnes (en Architecture) selon la méthode des Anciens. *Paris* 1683. fol.  
 21 L'Architecture de Vitruve traduite avec des Notes. *Paris* 1673. folio.  
 22 Mémoires pour servir à l'Histoire naturelle des Animaux. *Paris* 1671. & 1676. in folio maximo.  
 Les mêmes revus & augmentés d'un nouveau volume, à *Amsterdam* 1736. chez *Pierre Mortier*, dans les Mémoires de l'Académie, contenant les Ouvrages adoptés, Tome I. & la suite, que l'on peut avoir séparément.

1666 Samuel COTREAU DU CLOS, Médecin ordinaire du Roi. *Chimiste*. 1685

Ses Ouvrages sont,

- 1 Dissertation sur les Principes des Mixtes naturels.
- 2 Observations sur les Eaux minérales de plusieurs Provinces de France.

Claude

# 16 LISTE CHRONOLOGIQUE

1666 Claude BOURDELIN, Docteur en 1699  
Médecine. *Chimiste.*

1666 Jean PECQUET, Docteur en Mé- 1674  
decine de la Faculté de Mont-  
pellier. *Anatomiste.*

Il a publié,  
*Experimenta nova Anatomica.* Paris. 1654.  
4°.

1666 Louis GAYANT, Chirurgien Juré à 1673  
Paris. *Anatomiste.*

1666 Nicolas MARCHANT, Docteur en 1678  
Médecine de l'Université de Pa-  
doue, Premier Botaniste de  
Monsieur Gaston de France, &  
Directeur de la culture des Plan-  
tes du Jardin Royal. *Botaniste.*

Il a publié,  
Descriptions des Plantes don-  
nées par l'Académie. Paris 1676.  
*folio.*

1666 . . . NIQUET. *Géometre.* . . .

1666 Claude-Antoine COUPLET, Profes- 1722  
seur de Mathématiques des Pa-  
ges de la Grande Ecurie, Tré-  
sorier de l'Académie. *Mécani-  
cien.*

1666 Jean RICHER. *Astronome.* 1696

Il a publié,  
Observations Astronomiques &  
*Physi-*

1666 Physiques faites en l'Isle de Cayenne.

Elles se trouvent dans le Tome IV. des Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, contenant les Ouvrages adoptés, in 4°. imprimés à Amsterdam 1736. chez Pierre Mortier, & que l'on peut avoir séparément.

1666 . . . . PIVERT.

1666 . . . . DE LA VOYE MIGNOT. Géometre.

Il a publié,  
 Traité de la Musique, qu'il a augmenté d'une 4<sup>e</sup>. Partie dans une 2<sup>e</sup>. édition, donnée en 1666. 4°. Paris.

1666 Edme MARIOTTE. Physicien.

1684

- Il a publié,
- 1 Traité de la Percussion ou Choc des Corps.
  - Essais de Physique, ou Mémoires pour servir à la science des choses naturelles; savoir,
  - 2 De la Végétation des Plantes.
  - 3 De la nature de l'Air.
  - 4 Du Chaud, & du Froid.
  - 5 De la nature des Couleurs.
  - 6 Traité du mouvement des Eaux & des autres Corps fluides.
  - 7 Règles pour les Jets d'Eau.
  - 8 Nouvelle Découverte touchant la Vue.
  - 9 Traité du Nivellement, avec la

DeG

18 LISTE CHRONOLOGIQUE

1666 Description de quelques Niveaux  
nouvellement inventés.

10 Traité du mouvement des Pendu-  
les.

11 Expérience touchant les Couleurs  
& la congélation de l'Eau.

12 Essai de Logique contenant les  
Principes des Sciences, & la  
maniere de s'en servir pour fai-  
re de bons Raisonnemens.

Tous ces Ouvrages ont été imprimés  
à Leide en 1717. 2 Vol. in 4<sup>o</sup>.

1668 Jean GALLOYS, Abbé de Saint 1707  
Martin de Cores, Bibliothécaire  
du Roi, Professeur en Grec,  
& Inspecteur au College Royal,  
de l'Académie François. Géo-  
metre.

Ses Ouvrages sont,

1 Le Journal des Sçavans depuis  
1666 jusqu'en 1674.

2 Lettres à M. le Marquis de l'Hô-  
pital touchant le Livre de M.  
Catelan. Paris 4<sup>o</sup>.

3 Les Mémoires de l'Académie des  
années 1692 & 1693, mis en or-  
dre par ses soins.

4 Lettre à M. le Marquis de l'Hô-  
pital, touchant le Livre de la  
Logistique, ou Science des Li-  
gnes Courbes.

1669 François BLONDEL, Seigneur de 1685  
Croisettes & de Gaillardon, Pro-  
fesseur Royal en Mathématiques,  
& en

1669

& en Architecture, Maréchal de  
Camp aux Armées du Roi. *Géo-  
metre.*

Ses Oeuvres sont,

- 1 Cours de Mathématiques. *Paris*  
1683. 4°. & *Amst.* 1699. conte-  
nant divers Traités; savoir,  
Discours sur les Mathématiques en  
général.  
La Géométrie Spéculative; & la  
Géométrie Pratique,  
L'Arithmétique Spéculative, &  
l'Arithmétique Pratique.
- 2 Résolution des quatre principaux  
Problèmes d'Architecture. *Pa-  
ris* 1676. fol. max. & dans le  
Tom. II. des Mémoires de l'A-  
cadémie Royale des Sciences,  
contenant les Ouvrages adop-  
tés, in 4°. imprimés à *Amster-  
dam* 1736, chez *Pierre Mor-  
tier*, & que l'on peut avoir sé-  
parément.
- 3 Cours d'Architecture. *Paris* 1675.  
fol.
- 4 L'Art de jetter les Bombes. *La*  
*Haye* 1685. 4°.
- 5 Histoire du Calendrier Romain.  
*Paris* 1682. 4°. & *Amst.* 1699.

1669 Jean-Dominique CASSINI, Premier 1712.  
Professeur d'Astronomie à Bolo-  
gne, Sur-Intendant des Eaux de  
Bologne. *Astronome.*

Ses Ouvrages sont, outre plusieurs Piè-

1669

ces de lui répandues dans les Jour-  
naux des Sçavans, depuis 1666  
jusqu'en 1711.

- 1 *De Cometa Anni 1652. & 1653.*  
Mutinæ fol. 1653.
- 2 *Specimen Observationum Bononien-*  
*sium.* Bononiæ 1656. fol.
- 3 *Varie figure intagliate in rame che*  
*representano la prospettiva de' Pia-*  
*neti con le proportioni delle loro*  
*distanze al Sole & alla Terra, pe-*  
*riodiche rivoluzioni, directioni & re-*  
*trogradazioni.* 1659. fol.
- 4 *Epistola Astronomica cum Tabulis ad*  
*Marchion. Malvasiam; inserta ejus-*  
*dem Malvasia Ephemeredibus.* Mu-  
tinæ 1662. fol.
- 5 *Epistola de Observationibus in D.*  
*Petronii Templo habitis.* 1663. fol.
- 6 *Observatione dell'Eclisse Solare fatta*  
*in Ferrara l'anno 1664. con una*  
*figura intagliata in rame che re-*  
*presenta un nuovo methodo di tro-*  
*var le apparenze varie che fa nel*  
*medesimo tempo in tutta la Terra.*  
Ferrara.
- 7 *Theoria motus Cometa anni 1664.*  
Romæ 1665. fol.
- 8 *Lettere Astronomiche al Sign. Abbate*  
*Ottavio Falconieri sopra il confron-*  
*to d'alcune osservazioni delle Co-*  
*mete dell'Anno 1665.* Roma 1665.  
fol.
- 9 *Lettera Astronomica al medesimo so-*  
*pra l'Ombre de Pianetini in Giove.*  
Roma 1665. fol.
- 10 *Quatre Lettere al medesimo sopra la*

1669

- varietà delle macchie osservate in Giove, e loro diurne rivoluzioni, con le Tavole. Roma 1665. fol.
- 11 *Epistola ad P. Fr. de Gottignez responsoria, de nonnullis difficultatibus circa Eclipses in Jove à Mediceis Planetis effectas, aliaque noviter in ipso detecta.* Bononiæ 1665. fol.
- 12 *Epistola ad Gemin. Montanari de Refractionum Cælestium methodo.*
- 13 *Martis circa axem proprium revolvibilis Observationes Bononiæ habitæ.* Bonon. 1666. fol.
- 14 *Dissertationes Astronomicæ Apologetica.* Bonon. fol.
- 15 *De Solaribus hypothesebus & refractionibus Epistola tres.* Bonon. 1666. fol.
- 16 *Nuncii Siderci Interpres.* Bononiæ. fol. Cet Ouvrage, quoiqu'imprimé, n'a jamais paru, & n'est pas même achevé d'imprimer.
- 17 *Ephemerides Bononienses Mediceorum syderum.* Bononiæ 1668. fol.
- 18 *Spina Celeste, o apparizioni dell'anno 1668.* Bologna 1668. fol.
- 19 *Nouvelles Observations des Taches du Soleil, avec quelques autres Observations sur Saturne.* Paris 1671. 4°.
- 20 *Observations & Réflexions sur la Comete de l'an 1672.*
- 21 *Découverte de deux nouvelles Planetes autour de Saturne.* Paris 1673. fol.
- 22 *Observations & Réflexions sur la Comete de 1680. & 1681.* Paris 1681. 4°.

23 Nou-

- 1669 23 Nouvelles Découvertes dans le  
Globe de Jupiter. *Paris* 1690. 4<sup>o</sup>.  
Les Traités suivans se trouvent  
dans le Tome V. des Mémoi-  
res de l'Académie Royale des  
Sciences, contenant les Ouvra-  
ges adoptés, in 4<sup>o</sup>. imprimés  
à *Amsterdam* 1736. chez *Pierre*  
*Mortier*, & que l'on peut avoir  
séparément.
- 24 De l'Origine & du Progrès de  
l'Astronomie, & de son usage  
dans la Géographie & dans la  
Navigation.
- 25 Les Elémens d'Astronomie véri-  
fiée par le rapport des Tables  
aux Observations de M. Richer  
faites en *Cayenne*.
- 26 Découverte de la Lumière Cé-  
leste qui paroît dans le Zodia-  
que.
- 27 Règles de l'Astronomie Indienne  
pour calculer les mouvemens  
du Soleil & de la Lune, expli-  
quées & examinées.
- 28 Les Hypothèses & les Tables des  
Satellites de Jupiter réformées  
sur de nouvelles Observations.
- 29 Observations Astronomiques faites  
en divers endroits du Royaume.
- 30 *La Meridiana del Tempio di S. Pe-  
tronio tirata e preparata per le  
Observazioni Astronomiche l'anno  
1655. rivista e restaurata l'anno  
1695. Bologna* 1695. folio.

On a encore de lui,

31 *Magna Periodus Lumi-solaris Et Pæ-*

*schalis.*



1669 *ſebalis duobus Libris comprehenſa, quorum primus magna Periodi fundamenta ejuſque uſum exponit, alter uſum ejus Civilem & Eccleſiaſticum.* Paris 12. Cet Ouvrage paroît n'avoir pas été achevé, & n'a pas été publié.

32 Une Cosmographie ou Description du Monde en vers Italiens. MS.

33 Tables des Mouvemens du Soleil & de la Lune, &c. MS.

1672 Olaus ROEMER, Conſeiller d'Etat 1710 en Dannemarc, Lieutenant de Police, & premier Conſul de Copenhague. *Aſironome.*

1673 Denis DODART, Conſeiller Médecin 1707 ordinaire du Roi, & Docteur Régent de la Faculté de Paris. *Botaniſte.*

On a de lui l'Ouvrage ſuivant,

Mémoires pour ſervir à l'Histoire des Plantes, ou Projet de cette Histoire. On les trouve dans le Tome I. des Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, contenant les Ouvrages adoptés, in 4<sup>o</sup>. imprimés à Amſterdam 1736. chez Pierre Mortier, & que l'on peut avoir ſéparément.

1674 Pierre BOREL, Conſeiller Médecin 1689 ordinaire du Roi, Docteur en Médecine. *Chimiſte.*

On

- 1 *Bibliotheca Chimica, seu Catalogus Librorum Philosophicorum Hermeticorum usque ad annum 1655.* Paris. 1654. 12.
- 2 *De vero Telescopii inventore, cum brevi omnium Conspicillorum historia; accessit Centuria Observationum microscopicarum.* Hagæ Comitum 1655. 4°.
- 3 *Historiarum & Observationum Medico-physicarum Centuriæ quatuor.* Parisiis 1657. 8°.
- 4 *Compendium vite Renati Cartesii.* Paris. 1656. 8°.
- 5 *Hortus seu Armamentarium Simplicium, Mineralium, &c.* 1666. 8°.

1674 Guichard - Joseph DU VERNEY, 1730  
Docteur en Médecine, & Professeur d'Anatomie au Jardin Royal.  
*Anatomiste.*

Il a publié,

Traité de l'organe de l'Ouïe. Paris 1683. 12. & à Leide 1731.

Il a laissé en manuscrit plusieurs *Observations sur l'Anatomie de differens Animaux*; dont l'Académie a confié le soin de l'Edition à MM. Winslow, Petit le Médecin, & Morand.

1675 Godefroy - Guillaume LEIBNITZ, 1716  
Conseiller Aulique, Président de la Société de Berlin, &c. *Associé Etranger.*

Ses Ouvrages sont; outre plusieurs Pièces

1675

Pièces inserées dans le Journal des  
Sçavans, dans les Actes de Leip-  
sic, & autres Journaux,

1 *Dissertatio de Arte Combinatoria.*  
Lipsiæ 1666. & Francof. 1690.  
4o.

2 *Nota in Nizolium de veris principiis  
& vera ratione philosophandi.*  
Francof. 1670. in 4o.

3 *Hypothesis Physica nova, &c. nec  
non Theoria motus abstracti.* Lon-  
dini, 1671. 12.

4 *Epistola de Analyst promota, &c.*  
Dans le *Commercium Epistolicum*  
de Collins.

5 *Notitia Optica promota.* Imprimé  
dans les Oeuvres posthumes de  
Spinoza.

6 *Essais de Théodicée sur la Bonté  
de Dieu, la Liberté de l'Hom-  
me, &c. Amsterdam 1710. 12.*  
2 Vol. & réimprimés en 1734. aug-  
mentés de l'Hist. de sa Vie &  
de ses Ouvrages.

7 *Lettres à M. Clarke, &c. sur divers  
sujets de Philosophie & de Ma-  
thématique, & sur l'invention  
du Calcul infinitésimal. Dans le  
Recueil de M. des Maisseaux.*

1678 Philippe DE LA HIRE, Professeur 1719  
Royal de Mathématique & d'Ar-  
chitecture. *Astronome.*

Ses Ouvrages sont, outre plusieurs  
Pièces répandues dans les Jour-  
naux,

1 *Nouvelle Méthode en Géométrie  
pour les Sections des superfi-*

(b)

cies

26 LISTE CHRONOLOGIQUE

1678 cies Coniques & Cylindriques ,  
qui ont pour bases des Cercles ,  
ou des Paraboles, des Ellipses ,  
ou des Hyperbolés. Paris 1673.

4°.

2 De Cycloïde Opusculum. Paris. 1676.

4°.

3 Nouveaux Elémens des Sections  
Coniques; les Lieux Géométri-  
ques; la Construction ou Effec-  
tion des Equations. Paris 1679.

12.

4 *Sectiones Conicae in novem Libros dis-  
tributæ.* Paris. 1685. folio.

5 Traité du Nivellement de M. Pi-  
card mis en lumière, avec des  
Additions, par M. de la Hire.  
Paris 1684. 12.

6 L'Ecole des Arpenteurs, Paris  
1692. 12.

7 La Gnomonique, ou Méthode  
universelle de tracer des Horlo-  
ges solaires ou Cadrans sur tou-  
tes sortes de surfaces. Paris  
1682, & 1698. 12.

8 *Tabula Astronomica in quibus Solis,  
Lunæ, reliquorumque Planetarum  
motus ex ipsis observationibus nulla  
adhibita hypothesis traduntur, &c.*  
Pars prior Paris. 1687. 4°. Par-  
tes ambæ Paris. 1702. & 1727.  
4°.

Ces Tables sont encore en François,  
corrigées & traduites par M. de la  
Hire même, & s'impriment actuel-  
lement. Il y en a une Edition  
Allemande faite à Nuremberg en  
1725. par M. Klimm.

9 Def.

- 1678 9 Description & Explication des Globes qui sont placés dans les Pavillons du Château de Marly, (à présent à la Bibliothèque du Roi.) Paris 1704. 8°.
- 10 *Veterum Mathematicorum Opera Gr. & Lat.* Paris. è Typ. Reg. 1693. fol.
- 11 Observations Astronomiques faites sur les Côtes de France.
- 12 Traité des Epicycloïdes & de leurs usages dans les Mécaniques.
- 13 Explication des principaux effets de la Glace & du Froid.
- 14 Dissertation sur les différences des Sons de la Corde de la Trompette marine.
- 15 Traité des différens accidens de la Vue.
- 16 Traité de Méchanique.
- 17 Traité de la Pratique de la Peinture.
- 18 Les Constellations Célestes, avec les Etoiles qui y sont comprises, divisées en deux Planisphères. Paris 1702.
- Il reste encore de M. de la Hire en manuscrit & en état d'être imprimé,*
- 19 Traité du Docte Manuel Moschopule, de l'Invention des Nombres quarrés.
- 20 Nouveau Traité des Sections Coniques.
- 21 Traité de *Maximis & Minimis*, avec des Remarques & des Exemples.
- 22 Les Pneumatiques d'Heron d'Alexandrie,

28 LISTE CHRONOLOGIQUE  
 1678 alexandrie, avec des Remarques  
 & des Corrections.

1678 Jean MARCHANT, Directeur de la  
 Culture des Plantes du Jardin  
 Royal. *Botaniste*.  
 Il a composé les Descriptions des  
 Plantes du grand Recueil de l'A-  
 cadémie.

1679 . . . . DE LANNION. *Géometre*. . . .  
 Exclus en 1685.

1681 . . . . SEDILEAU. *Astronome*. 1693  
 Il a laissé en manuscrit une Traduction  
 du Traité de Frontin des Aque-  
 ducs, avec des Remarques.

1682 Ernſtroy Walther DE TSCHIRNHAU. 1708  
 SEN, Seigneur de Kiſlingswald,  
 & de Stoltzenberg. *Géometre*, &  
*Aſſocié Etranger*.  
 On a de lui,  
*Medicina Mentis, ſive ars inveniendi præ-*  
*cepta generalia; Medicina Corporis,*  
*ſeu Cogitationes aſtmodum probabiles*  
*de conſervanda ſanitate.* Lipſiæ 1695.  
 4<sup>o</sup>. Edit. 2.

1682 Laurent POTHENOT, Profefſeur de 1732  
 Mathématiques dans la Chaire de  
 Ramus. *Géometre*. Exclus par ab-  
 ſence avant 1699.

1682 . . . . LE FÈVRE. *Aſtronomie*. 1706  
 Exclus en 1702.  
 Il a calculé la Connoiſſance des Tems  
 depuis 1684 juſqu'en 1701 inclu-  
 ſivement,

- 1682 sivement, & des Ephémérides pour les années 1684 & 1685, au Méridien de Paris.
- 1683 Henri DE BESSE' sieur de la Chapel. 1692  
le-Milon, Inspecteur des Beaux Arts.
- 1684 Jean MERY, Chirurgien Juré de Paris, 1722  
Chirurgien de la feue Reine,  
Chirurgien Major des Invalides,  
& ensuite de l'Hôtel-Dieu de Paris. *Anatomiste.*  
On a de lui,  
1 Observations sur la maniere de  
tailler dans les deux sexes pour  
l'extraction de la Pierre, prati-  
quée par F. Jaques. *Paris. 1700.*  
12.  
2 Nouveau Système de la Circula-  
tion du Sang par le trou ovale  
dans le Fœtus humain; avec les  
Réponses aux Objections qui  
ont été faites contre cette hy-  
pothèse. *Paris 1700. 12.*  
3 Problèmes de Physique sur la Gé-  
nération & la Nourriture du Fœ-  
tus. *Paris 1712. 4°.*
- 1685 Melchisedec THEVENOT, Garde 1692  
de la Bibliotheque du Roi. *Physi-  
cien*  
Il a publié,  
Relations de divers Voyages curieux,  
&c. *Paris 1672. fol. 4. vol.*  
Relation d'un Voyage fait au Levant.  
*Paris 1663. 4°.*  
Suite du même. *ibid. 1674. 4°.*

(b) 3

Re.

# 30 LISTE CHRONOLOGIQUE

1685 Recueil de Voyages. *Paris* 1681. 8°. & à *Amsterdam*, en 5 vol.

L'Art de Nager démontré par figures, avec des avis pour se baigner utilement. *Paris* 1696. 12.

1685 Michel ROLLE. *Géometre.*

1719

Ses Ouvrages sont,

- 1 Traité d'Algebre. *Paris* 1690. 4°.
- 2 Demonstration d'une Méthode pour résoudre les Egalités de tous les degrés, &c. *Paris* 1691. 8°.
- 3 Méthode pour résoudre les Questions indéterminées de l'Algebre. *Paris* 1699. 4°.
- 4 Remarques touchant le Problème général des Tangentes. *Paris* 1703. 4°.

1685 . . . . CUSSET. *Astronome.* . . . .

1688 Pierre VARIGNON, de la Société 1722  
Royale de Londres, & de celle de  
Berlin, Professeur Royal de Phi-  
losophie & de Mathématiques au  
College Mazarin. *Géometre.*

Ses Ouvrages sont,

- 1 Projet d'une Nouvelle Méchanique, avec un Examen de l'Opinion de M. Borelli sur les propriétés des Poids suspendus par des cordes. *Paris* 1687. 4°.
- 2 Nouvelles Conjectures sur la Pesanteur. *Paris* 1690. 12.
- 3 Nou-



# DE L'ACADEMIE.

31

- 3 Nouvelle Méchanique. *Paris* 1725. 4°. 2. Vol. ouvrage posthume.  
On a publié sous son nom, après sa mort, les Ouvrages suivans.
- 4 Eclaircissement sur l'Analyse des Infiniment-Petits, & sur le Calcul exponentiel de M. Bernoulli. *Paris* 1725. 4°.
- 5 Traité du Mouvement des Eaux, &c. *Paris* 1725. 4°. Ouvrage posthume.
- 6 Elémens des Mathématiques, *Paris* 1732. 4°. Ouvrage posthume.

1691 Jean-Paul BIGNON. Abbé de Saint Quentin, &c. Doyen des Conseillers d'Etat, Bibliothécaire du Roi, de l'Académie Française, & de celle des Belles-Lettres. *Honoraire.*

1691 Joseph. PITTON TOURNEFORT, 1708  
Professeur de Botanique au Jardin Royal, & Docteur en Médecine de la Faculté de Paris. *Botaniste.*

Ses Ouvrages sont,

- 1 Elémens de Botanique, ou Méthode pour connoître les Plantes. *Paris* 1694. 8°. 3 vol.
  - 2 Institutiones Rei Herbariae. *Parisi.* 1700. 4°. 3 vol. & *Lyon* 1719.
  - 3 Corollarium Institutionum Rei Herbariae *Parisi.* 1703. 4°.
- De optimâ Methodo instituendâ in Re herbariâ Epistola, in quâ respondetur Dissertationi D. Rati de variis

(b) 4

Plan-

# 32 LISTE CHRONOLOGIQUE

1691 *Plantarum Methodis.* Paris. 1697.  
80.

5 Histoire des Plantes qui naissent  
aux environs de Paris. *Paris*,  
1698. & depuis augmentée par  
M. de Jussieu, & imprimée en  
2 vol. en 1725.

6 Voyage au Levant. *Paris* 1717.  
40. 2 vol. & *Amst.* 1718

7 Traité de la Matière médicale,  
ou l'Histoire & l'Usage des mé-  
dicamens. *Paris* 1717. 12. 2 vol.

1691 Guillaume HOMBERG, premier Me- 1715  
decin de M. le Duc d'Orleans.  
*Chymiste.*

1692 Moyse CHARAS Docteur en Méde- 1698  
cine à Londres, Professeur de  
Chymie au Jardin Royal. *Chymiste.*

Ses Ouvrages sont,

1 Nouvelles Expériences sur la Vi-  
pere. *Paris* 1669. avec figures.  
In 80. en 1672. 2 vol. in 12. &  
depuis en 1694.

2 Suite des nouvelles Expériences  
sur la Vipere, pour servir de  
replique à François Redi. *Ibid.*  
1671. in 80.

3 Pharmacopée Royale, Galénique  
& Chymique. *Paris chez d'Houri*  
1682. in 80. 2 vol. avec figures,  
& auparavant en 1676. in 40.

1693 . . . . . DE LA COUDRAYE. . . . .

Guil-

1693- Guillaume François DE L'HOPITAL 1704  
Chevalier, Marquis de Sainte Mè-  
me, Comte d'Entremont. *Hono-  
raire.*

Il a publié,

- 1 Analyse des Infiniment-Petits. *Pa-  
ris 1696. in 4o.*
- 2 Traité des Sections Coniques. *Paris  
1707. in 4o.*

1693 . . . . MORIN, de Toulon. *Bota. . . .  
niste.*

1694 Jacques CASSINI, Maitre des Comp-  
tes de la Société Royale de Lon-  
dres. *Astronome.*

Il a publié,

- 1 De la grandeur & de la figure de  
la Terre, &c. Suite des Mé-  
moires de l'Academie Année  
1718.
- 2 Elémens d'Astronomie, ou la  
Théorie des Planetes, avec les  
Tables, *sous presse.*

1694 Gabriel Philippe DE LA HIRE, Pro- 1718  
fesseur Royal d'Architecture. *Astro-  
nome.*

Il a publié,

*Regiæ Scientiarum Academia Ephe-  
merides juxta recentissimas obser-  
vationes. Annor. 1701. 1702.  
1703. Paris. in 4o.*

1694 Simon BOULDU, ancien Juge-Con- 1729  
sul, Apoticaire de S. A. R. Mada-  
me Douairiere d'Orleans, & de  
la Reine Douairiere d'Espagne,

(b) 5

Dé.

34 LISTE CHRONOLOGIQUE

1694 Démonstrateur en Chymie au Jardin Royal. *Chymiste.*

1694 Jaques-Philippe MARALDI. *Astronome.* 1729

Il a laissé en MS.

- 1 Les Tables des Satellites de Jupiter corrigées sur les nouvelles observations.
- 2 Une Uranometrie, ou Description des Etoiles avec leur Longitude & Latitude, *presque finie.*
- 3 Catalogue des Etoiles du Zodiaque *imprimé dans le 1. Tome des Ephémérides de M. Manfredi.*

1695 Jean · Matthieu DE CHAZELLES. 1716.  
*Astronome.*

1696 Thomas FANTET DE LAGNY, . . .  
Garde de la Bibliothèque du Roi,  
de la Société Royale de Londres.  
*Géometre.*

Il a publié,

- 1 Méthodes nouvelles & abrégées pour l'extraction & l'approximation des Racines, & pour résoudre par le cercle & la ligne droite plusieurs Problèmes solides & surfolides, &c. 2<sup>e</sup>. Edit. Paris 1692. in 4<sup>o</sup>.
- 2 Nouveaux Elémens d'Arithmétique & d'Algebre, ou Introduction aux Mathématiques. Paris 1697. in 12.
- 3 La Cubature de la Sphere, où l'on démontre une infinité de por-

tions

1696 tions de Sphere égales à des Pyramides rectilignes. *La Rochelle* 1702. in 12.

4 Arithmetique nouvelle (*Binaire*). *Rochefort* 1703. 4°.

5 Analyse générale, ou Méthodes nouvelles pour résoudre les Problèmes de tous les genres & de tous les degrés à l'infini. *Paris* 1733. in 4°.

1696 Joseph SAUVEUR, Professeur Royal 1716 de Mathématiques, & Examinateur des Ingénieurs. *Géometre*.

On a de lui,

Le Neptune François, ou Recueil des Cartes Marines levées & gravées par ordre du Roi: premier volume, contenant les côtes de l'Europe sur l'Océan depuis Dronthem en Norwege; jusqu'à Gibraltar; avec la Mer Baltique. *Fol.* 1691.

1696 Pierre COUPLET DE TARTREUX, Professeur de Mathématiques des Pages de la Grande-Ecurie du Roi, Trésorier de l'Académie. *Mécanicien*.

1696 Dominique GUGLIELMINI, Doc. 1710 teur en Médecine à Bologne, premier Professeur de Mathématiques, & Sur-Intendant des Eaux de l'Etat. *Associé Etranger*.

Il a publié divers Ouvrages recueillis en 2 vol. in 4°. *Geneve* 1719. savoir,

(b) 6

*Volan-*

1696

- Volantis flammæ Epitropeia.*  
*De Cometarum natura & ortu.*  
*Observatio Solaris Eclipsis anni 1684.*  
*De Salium figuris.*  
*Aquarum fluentium mensura.*  
*Epistola tres Hydrostatica.*  
*De Fluminum naturâ Tractatus Physico-Mathematicus.*  
*Exercitatio Physico-Médica de Sanguinis natura & constitutione.*  
*Praelectio pro Theoria Medica, adversus Empiricam sectam.*  
*De Salibus Dissertatio Epistolaris.*  
*De Idearum vitiiis correctione & usu, ad statuendam & inquirendam morborum naturam.*  
*De principio sulphureo Dissertationes.*  
*Dissertatio de Aëthere.*  
*Epistola ad Lancisium.*  
*Dissertationes duæ de primis Materia affectionibus, & de Origine & proprietatibus primarum affectionum Materia.*  
*Epistola de Quinquina Cortice; seu de ejusdem operandi ratione.*

1697 Bernard DE FONTENELLE, de l'Académie Française, de celle des Belles-Lettres, de la Société Royale de Londres. Secrétaire perpétuel.

- Il a publié, outre les Volumes de l'Histoire de la Compagnie,  
 1. Entretiens sur la Pluralité des Mondes. Paris 1694. 12.  
 2. Elémens de la Géométrie de l'Infini. Paris 1727. 4°. & in douze sous presse chez Pierre Mortier à Amsterdam.

3. His-

- 1697 3 Histoire de l'Académie Royale des Sciences depuis son Etablissement jusqu'en 1680. 4<sup>o</sup>. & in douze, sous presse chez Pierre Mortier à Amsterdam.

1697 Louis CARRE. *Géometre.*

1711

Il a publié,

Méthode pour la Mesure des Surfaces, la dimension des Solides, leur Centre de Pesanteur, de Percussion & d'Oscillation. Paris 1700. 4<sup>o</sup>.

- 1698 Daniel TAUVRY, Docteur en Médecine de la Faculté de Paris. Anatomiste.

Ses Ouvrages sont,

1. Traité de la Génération & de la Nourriture du Fœtus. Paris 1700. 12.

2. Nouvelle Anatomie raisonnée, où l'on explique les usages de la structure du Corps de l'Homme, & de quelques autres Animaux, suivant les loix de la Méchanique: 4<sup>e</sup>. Edit. Paris 1721. 12.

3. Pratique des Maladies aiguës, & de toutes celles qui dépendent de la fermentation des Liqueurs: 4<sup>e</sup>. Edit. Paris 1720. 12. 2 vol.

4. Traité des Médicamens, & la manière de s'en servir pour la guérison des Malades. Paris 1722. 12. 2 vol.

5. Pratique des Maladies Chroniques

(b) 7,

ou

# 38 LISTE CHRONOLOGIQUE

1698 ou habituelles. Ouvrage posthume. *Paris* 1724. 12.

1698 . . . . . DE LANGLADE. *Chymiste*. 1717

1699 Nicolas LEMERY, Docteur en Médecine de la Faculté de Paris. 1715.  
*Chymiste*.

Il a publié,

1 Cours de Chymie, contenant la manière de faire les Opérations qui sont en usage dans la Médecine; 10<sup>e</sup>. Edit. *Paris* 1713. 8<sup>o</sup>. & à *Leide* 1716.

2 Pharmacopée universelle, contenant toutes les Opérations de Pharmacie qui sont en usage dans la Médecine; 2<sup>e</sup>. Edit. *Paris* 1716. 4<sup>o</sup>. & à la Haye 1729.

3 Traité universel des Drogues simples mis en ordre alphabétique. *Paris* 1714. 4<sup>o</sup>. & à *Rotterdam* 1727.

4 Traité de l'Antimoine, contenant l'Analyse chymique de ce Minéral. *Paris* 1707. 8<sup>o</sup>.

1699 Sebastien TRUCHET, Religieux Carmélite. *Honoraire*. 1729

1699 Bernard RENAUD D'ELISAGARAY, 1719  
Lieutenant-Général des Armées du Roi d'Espagne, Conseiller du Conseil de Marine, & Grand-Croix de l'Ordre de Saint Louis. *Honoraire*.

Il a



1699

Il a publié,

- 1 La Théorie de la Manœuvre des Vaisseaux. *Paris* 1689. 8°.
- 2 Réponses à M. Huyghens, &c. 1703 & 1704. 8°.
- 3 Mémoire, où est démontré un Principe de la Méchanique des Liqueurs dont on s'est servi dans la Théorie de la Manœuvre des Vaisseaux, & qui a été contesté par M. Huyghens. *Paris* 1712. 12.

1699 Nicolas DE MALEZIEU, Chancelier de Dombes, de l'Académie Française. *Honoraire.* 1727

Il a publié,

- 1 Nouveau Traité de la Sphere. *Châlons* 1679. 8°.
- 2 Géométrie de M. le Duc de Bourgogne: 2<sup>e</sup>. Edition; avec un Traité des Logarithmes, & l'Introduction à l'application de l'Algebre à la Géométrie. *Paris* 1722. 4°.

1699 Nicolas MALEBRANCHE, Prêtre de l'Oratoire. *Honoraire.* 1715

Ses Ouvrages sont,

- 1 De la Recherche de la Vérité, 6<sup>e</sup>. Edition. *Paris* 1712. 4°.
- 2 Conversations Chrétiennes. *Paris* 1702. 12.
- 3 Traité de la Nature & de la Grace. *Rotterdam* 1703. 12.
- 4 Meditations Chrétiennes & Métaphysiques.

1699

- physiques. *Lyon* 1699. 12. 2 tom.
5. Traité de la Morale. *Lyon* 1707. 12. 2 tom.
- 6 Réponse au Livre de M. Arnauld des vraies & des fausses Idées. *Rotterdam* 1684. 12.
7. Entretiens sur la Métaphysique & sur la Religion. *Paris* 1703. 12. 2 tom.
- 8 Réponses à M. Regis, 12.
9. Traité de l'Amour de Dieu. 1698. 12.
- 10 Entretien d'un Philosophe Chrétien, & d'un Philosophe Chinois, sur l'existence de Dieu. *Paris* 1708. 12.
- 11 Avis touchant cet Entretien contre les Journaux de Trevoux. 1708. 12.
- 12 Réflexions sur la Prémotion Physique. *Paris* 1715. 12.
- 13 Recueil de toutes les Réponses à M. Arnauld. *Paris* 1709. 12.

1699 Thomas GOUYE, Jésuite. *Honoraire*. 1725.

Il a publié,

- Observations Physiques & Mathématiques pour servir à l'Histoire Naturelle, & à la perfection de l'Astronomie & de la Géographie, envoyées de Siam à l'Académie par les PP. Jésuites Missionnaires, &c. avec des Réflexions & des Notes. En II. Parties, la I. à la suite des *Mémoires de Mathématique & de Physique* de l'Académie, année 1692, imprimés in 12 à *Amsterdam*; & la II. à la suite des mêmes

Mé-

# DE L'ACADEMIE.

41

*Mémoires, année 1693, imprimés  
aussi à Amsterdam, in 12.*

1699 Gilles FILLIAUX DES BILLETTES. 1720  
*Mécanicien.*

1699. . . . . JEAUGEON. *Mécanicien.* 1725

1699 André DALESME. *Mécanicien.* 1727

1699 Pierre-Sylvain REGIS. *Géometre.* 1707

Ses Ouvrages sont,

1 Cours de Philosophie. *Paris 1690.*

4°. 3. vol. & *Amst. 1691.*

2 L'Usage de la Raïson & de la Foi.

*Paris. 1704. 4°.*

3 Réponse à la Censure de la Philo-  
sophie Cartésienne de M. Huet.

*Paris 1691. 12.*

4 Réponse aux Réflexions Critiques  
de M. du Hamel, &c. *Paris*  
*1692.*

5 Trois Repliques au P. Malebran-  
che, *insérées dans le Journal des*  
*Sçavans de 1694.*

1699 Claude BOURDELIN, Premier Mé- 1711  
decin de Madame la Duchesse  
de Bourgogne, de la Société Ro-  
yale de Londres. *Botaniste.*

1699 Louis MORIN, Docteur en Méde- 1715  
cine, & Médecin de l'Hôtel-  
Dieu de Paris. *Botaniste.*

Il a laissé en Manuscrit,

1 Un Index d'Hippocrate Grec &  
Latin, fort ample & fort correct.

2 Un

42 LISTE CHRONOLOGIQUE

1699 2 Un Journal de plus de quarante années des Variations du Barometre & du Thermometre.

1699 . . . . . MONTI. *Astronome. Exclut*  
par absence.

1699 Etienne-François GEOFFROY, Doc- 1731  
teur en Médecine de la Faculté  
de Paris, Lecteur & Professeur  
Royal en Médecine & en Chymie,  
de la Société Royale de Londres.  
*Chymiste.*

Il a laissé en Manuscrit,  
*De Materia Medica*, Ouvrage complet,  
excepté les Plantes considérées  
comme herbes, à l'égard desquelles  
il est resté à la *Melissa*.

1699 Guy Crescent FAGON, Docteur en 1718  
Médecine de la Faculté de Paris,  
Premier Médecin du Roi, Pro-  
fesseur de Botanique & de Chymie  
au Jardin Royal. *Honoraire.*

1699 Camille LE TELLIER DE LOU- 1718  
vois, Docteur de Sorbonne, Abbé  
de Bourgueil & de Vauluisant,  
nommé à l'Evêché de Clermont,  
Bibliothécaire du Roi, de l'Aca-  
démie Française, & de celle des  
Belles-Lettres. *Honoraire.*

1699 Sebastien LE PRESTRE Seigneur 1707  
de VAUBAN, Maréchal de Fran-  
ce, Chevalier des Ordres du Roi,  
Commissaire général des Fortifi-  
cations, Grand-Croix de l'Ordre

de

1699

de S. Louis, & Gouverneur de la  
Citadelle de Lille. *Honoraire.*

On a de lui,

Projet d'une Dixme Royale. *Paris*  
1708. 12.

1699

Nicolas HARTSOEKER, de la Société 1725  
de Berlin. *Affocié Etranger.*Ses Ouvrages sont, outre plusieurs  
Pièces inserées dans les Journaux,1 Essai de Dioptrique. *Paris* 1694. 4°.2 Principes de Physique. *Paris* 1696.  
4°.3 Conjectures Physiques. *Amsterdam*  
1706. 4°.4 Eclaircissemens sur les Conjectures  
Physiques. *Amsterdam* 1710. 4°.5 Suites des Conjectures Physiques  
& des Eclaircissemens sur les  
Conjectures Physiques. *Amster-*  
*dam* 1712. 4°.6 Description de deux Niveaux d'une  
nouvelle invention, &c. *Amst.*  
1711. 4°.7 Recueil de plusieurs Pièces de  
Physique, où l'on fait voir  
l'invalidité du Systême de M.  
Newton, &c. *Utrecht* 1722. 12.8 Cours de Physique; Oeuvre post-  
hume, accompagné de plusieurs  
autres Pièces. *La Haye* 1730. 4°  
favor,Lettre sur le Systême de M. Newton.  
Remarques sur trois Dissertations de  
M de Mairan qui ont remporté  
les Prix de l'Académie de Bour-  
deaux, &c.

Re-

1699

Remarques sur une These Physique  
de M. Muller sur la Génération  
des Animaux.

1699

Dissertation sur le Principe & la Na-  
ture du Mouvement, & sur la  
Cause de la communication des  
Mouvemens.

Remarques sur une These de M.  
Bernoulli de Bâle sur le Phos-  
phore du Barometre.

1699

Dissertation sur les Passions de l'Ame.

Dissertation sur la Peste & sur les  
moyens de s'en garantir.

Explication Physique des Flux &  
Reflux surprenans de l'Europe.

Extrait critique des Lettres de M.  
Leeuwenhoek.

1699 Jaques BERNOULLI, Professeur de 1705.  
Mathématiques à Bâle. *Associé E-  
tranger.*

Ses Ouvrages sont;

- 1 *Conamen novi Systematis Cometarum.*  
Amst. 1682. 8°.
- 2 *Dissertatio de Gravitate Ætheris.*  
ibid. 1683.
- 3 *Parallelismus ratiocinii Logici & Al-  
gebraici.* Basil. 1685. 4°.
- 4 *Methodi ratiocinandi, sive usus Lo-  
gica.* Basil. 1686. 4°.
- 5 *Solutio tertij Problematis Arith-  
metici, Geometrici & Astronomici.*  
Basil. 1687. 4°.
- 6 *Positiones de Sericibus infinitis, Partib.*  
V. Basil. 1689. & seq. 4°.
- 7 *Solutio Problematis Isoperimetrici,*

cum

1699 *cum Analyfi ejusdem.* Basil. 1700.  
& 1701. 4°.

8 *In Geometriam Cartesii Notæ.*

9 *Ars conjectandi, Opus posthumum;*  
*accessit Tractatus de Seriebus Inf-*  
*initis, & Epistola Gallica de Ludo*  
*Pila reticularis.* Basil. 1713. 4°.

1699 Jean BERNOULLI, Professeur de  
Mathématiques à Groningue, &  
ensuite à Bâle, de la Société  
Royale de Londres, de celle de  
Berlin, & de l'Acad. Impériale de  
Russie. *Socié Etranger.*  
il a publié,

1 *Dissertatio Physico-Mechanica de Ef-*  
*fervescentia & Fermentatione.* Basil.  
1690. 4°.

2 *Dissertatio Physico-Anatomica de motu*  
*Musculorum.* Basil. 1694. 4°.

3 *De Nutritione.* Groning. 1699. 4°.

4 *Spinosisimi Depulsionis Echo, &c.*  
Groning. 1702. 4°.

5 *Essai d'une nouvelle Théorie de*  
*la Manœuvre des Vaisseaux,*  
*avec quelques Lettres sur le*  
*même sujet.* Bâle 1714. 8°.

6 *Dissertatio Physica de Mercurio lucente*  
*in Vacuo.* Basil. 1719. 4°.

7 *Positiones Physicae de Origine Fontium.*  
Basil. 1721. 4°.

8 *Dissertatio de Calculo Exponentiali.*  
Paris. 1725. 4°.

9 *Discours sur les Loix de la Com-*  
*munication du Mouvement, &c.*  
Paris, 1727. 4°.

10 *Nouvelles Pensées sur le Systême*  
*de Descartes.* Paris 1730. 4°.

Isaac

1699 Isaac NEWTON Chevalier, Maître 1727  
de la Monnoye d'Angleterre, &  
Président de la Société Royale de  
Londres. *Affocié Etranger.*

1699

Ses Ouvrages sont, outre plusieurs  
Pièces insérées dans différens Jour-  
naux,

1 *Philosophiæ Naturalis Principia Ma-  
thematica* : Edit. 3<sup>a</sup>. Londini  
1726. 4<sup>o</sup>.

2 *Optice, sive de Reflexionibus, Re-  
fractionibus, Inflexionibus & Co-  
loribus lucis, &c.* Edit. 2<sup>a</sup>. Lon-  
dini 1719. 4<sup>o</sup>. traduit sur l'ori-  
ginal Anglois par Samuel Clark;  
& ensuite en François par M.  
Coste. Amst 1720. 12.

3 *Arithmetica universalis.* Londini  
1722. 8<sup>o</sup>.

4 *Analysis Infinitorum à Jones ; cum  
enumeratione Linearum tertii Or-  
dinis & Quadratura curvarum.*  
Londini 1711. 4<sup>o</sup>.

5 *Abregé de sa Chronologie traduit,*  
&c. Paris 1725. 12.

1699

6 *Réponse aux Observations du  
Traducteur de cet Abregé, &c.*  
Paris 1728. 12.

1699 C

7 *La Chronologie des anciens Ro-  
yaumes corrigée, &c. traduite  
de l'Anglois.* Paris 1728. 4<sup>o</sup>.

8 *Plusieurs Lettres insérées dans les  
Ouvrages de Wallis, Collins &  
Des Maizeaux.*

1699

1699 Vincent VIVIANI Noble Florentin. 1703  
*Affocié-Etranger.*

Ses



1699

Ses Ouvrages sont,

- 1 *De Maximis & Minimis Geometrica Divinatio in quintum Conicorum Apollonii Pergæi. Florentiæ 1659. fol.*
- 2 *Quinto libro d'egli Elementi d'Euclide, ovvero scienza universale delle Proporzioni, spiegata colla Dottrina del Galileo. Firenze 1674 4º.*
- 3 *Enodatio Problematum universis Geometris propositorum à Claud. Comniers. Florentiæ 1677. 4º.*
- 4 *La Struttura, e Quadratura esatta dell' intero e delle parti d'un nuovo Cielo ammirabile, e di uno degli Antichi delle volte regolari degli Architetti Firenze 1692.*
- 5 *De locis solidis Aristæi senioris, Opus Conicum Florentiæ 1673. Ibid. 1701. augmenté fol.*

1699 Claude BURLET, Docteur en Médecine, & premier Médecin du Roi d'Espagne. *Botaniste.* 1731

1699 Claude BERGER, Docteur en Médecine, Professeur en Chymie au Jardin Royal. *Botaniste.* 1712

1699 Gilles François BOULDU, Premier Apoticaire du Roi, ancien Echevin, ancien Juge-Consul, Démonstrateur en Chymie au Jardin Royal. *Chymiste.*

Adrien

# 43 LISTE CHRONOLOGIQUE

1699 Adrien TULLIER, Docteur-Régent 1702  
en Médecine de la Faculté de  
Paris. *Chymiste.*

1699 François CHEVALIER, Maître de  
Mathématiques du Roi & des Pa-  
ges de la Petite Ecurie. *Mécanicien.*

1699 Alexis LITRE, Docteur en Méde- 1725  
cine. *Anatomiste.*

1699 François POUPART, Docteur en 1709  
Médecine. *Anatomiste.*

1699 Hervé SIMON DE VALHEBERT.

1699 Antoine PARENT. *Mécanicien.* 1716

Il a publié, outre plusieurs Pièces  
imprimées dans différens Journaux,

1 Elémens de Mécanique & de  
Physique. Paris 1700. 12.

2 Recherches de Mathématique &  
de Physique Paris 1713. 12. 3 vol.

3 Arithmétique Théori-Pratique. Pa-  
ris 1714. 8o.

1699 Michel DE SENNE, Intendant des  
Bâtimens de S. A. S. M. le Duc.

1699 Michel-Louis RENEAUME DE LA  
GARANNE, Docteur-Régent de la  
Faculté de Paris. *Botaniste.*

Il a publié,

Discours pour l'Ouverture de l'Ecole  
de Chirurgie ; avec une Thèse  
paraphrasée sous ce Titre : Essai  
d'un Traité des Hernies nommées  
Descentes. Paris 1726. 12.

1699 Il fait imprimer actuellement un Recueil de ses Theses & Discours publics.

1699 Guillaume AMONTON s. Mécanicien. 1705  
Il a publié,

Remarques & Expériences Physiques  
sur la construction d'une nouvelle  
Clepsydre; sur les Barometres,  
Thermometres & Hygrometres.  
Paris 1695. 12.

1699 . . . . . DU TORAR . . . . .  
Il a publié,

- 1 Elémens de Géométrie. Paris 1692.  
12.
- 2 Leçons de Géométrie-pratique. Paris 1705. 12.

1699 Jacques LIBOTAUD. Astronomie. 1733  
Il a publié,

Les Connoissances des Temps des Années 1693. 1694. 1702. & suivantes, jusques & compris l'Année 1729. 30. vol.

*Regia Scientiarum Academia Ephemerides Annorum 1704. & seqq. usq. ad an. 1711.*

1699 . . . . . DE BEAUVILLIERS In- 1730  
génieur de la Marine.

1699 Louis LEMERY, Docteur en Médecine de la Faculté de Paris, Médecin ordinaire du Roi, Professeur de Chymie au Jardin Royal. Chymiste.

1699

Il a publié,

Traité des Alimens , où l'on trouve  
par ordre & séparément la diffé-  
rence & le choix que l'on doit fai-  
re de chacun d'eux en particulier,  
les bons & les mauvais effets qu'ils  
peuvent produire, &c. avec une  
Dissertation sur la nourriture des  
Os. 2<sup>e</sup> Edit. Paris. 1705. 12.

1701 Pierre DU VERNEY, Chirurgien- 1728  
Juré. *Anatomiste.*

1702 Jean-Baptiste CHOMEL, Médecin  
ordinaire du Roi, Docteur-Régent  
de la Faculté de Paris. *Botaniste.*

Il a publié,

Abregé de l'Histoire des Plantes U-  
suelles ; 4<sup>e</sup>. Edit. Paris 1730.  
12. 3. vol.

1702 Guillaume DELISLE, Premier Géo- 1726  
graphe du Roi. *Astronome.*

*Voici une Liste complete de toutes les Cartes Geogra-  
phiques qu'il a publiées.*

Deux Globes d'un pied de diametre.  
1700.

Deux Globes d'un demi-pied de dia-  
mètre 1700.

*Géographie ancienne.*

*Theatrum historicum Occidentale & O-  
rientale ad Annum 400. 1705.*

*Orbis veteribus noti Tabula. 1714.*

*Gracia Meridionalis. 1707.*

*Gracia*

# DE L'ACADEMIE. 31

*Gracia Septentrionalis.* 1708.

*Italia.* 1715.

*Regionum Italia mediarum Tabula.* 1711.

*Sicilia.* 1714.

*In Notitiam Ecclesiasticam Africa Tabula.*  
1700.

*Retraite des Dix mille.* 1723. \*

## *Géographie du moyen Age.*

*Civitas Leucorum* , Diocèse de Toul.  
1707.

*Delpbinatus.* 1711.

*Imperii Orientalis Tabula dua.* 1712.

*Empire Romain; avec les Colonies  
Romaines.* 1715.

## *Géographie moderne.*

*Mappemondes.* 1700. 1720.

*Hémisphère Septentrional.* 1714.

*Méridional.* 1714.

*Oriental.* 1724.

*Occidental.* 1724.

*EUROPE.* 1700. 1724.

*Îles Britanniques.* 1702.

*Couronnes du Nord* , partie Septen-  
trionale. 1706.

*Id. Méridionale.* 1706.

*Royaume de Dannemarck.* 1710.

*Moscovie Septentrionale.* 1706.

*Id. Méridionale.* 1706.

*France.* 1703. 1721.

*Prévôté & Vicomté de Paris* 1711.

*Plan de Paris.* 1716.

*Diocèse de Senlis.* 1709.

*Diocèse de Beauvais.* 1710.

*Picardie Méridionale.* 1712.

(c) 2

Cham-

## LISTE CHRONOLOGIQUE

Champagne Septentrionale. 1713.  
 Champagne Méridionale. 1713.  
 Généralité d'Orléans, ou Beauce, &c.  
 1718.  
 Anjou. 1720.  
 Le Maine & le Perche. 1719.  
 Normandie. 1716.  
 Bourgogne Septentrionale. 1709.  
 Bourgogne Méridionale. 1709.  
 Bourdelois, Angoumois, &c. 1714.  
 Béarn, Armagnac, &c. 1712.  
 Diocèse de Narbonne. 1704.  
 Diocèse de Beziers. 1708.  
 La Provence. 1715.  
 Pays-Bas Catholiques. 1702.  
 Artois & Picardie Septentrionale. 1704.  
 1711.  
 Comté de Flandre. 1704.  
 Hainaut, Namur, & Cambresis. 1706.  
 Brabant & pays voisins. 1705.  
 Provinces-Unies des Pays-Bas. 1702.  
 1701.  
 Cours du Rhin, de Bâle à Strasbourg.  
 1704.  
 Id. de Strasbourg à Worms. 1704.  
 Id. de Worms à Bonne. 1704.  
 Suabe Septentrionale. 1704.  
 Id. Méridionale. 1704.  
 Principauté de Neuchâtel. 1720.  
 La Suisse. 1715.  
 Pologne. 1703.  
 Espagne. 1701.  
 Italie. 1700.  
 Piémont & Monferrat Septentrional.  
 1707.  
 Id. Méridional. 1707.  
 Sicile. 1717.

Hon-

Hongrie, ou Turquie Européane Septentrionale. 1703.

Hongrie en particulier. 1717.

Grece, ou Turquie Européane Méridionale. 1707.

ASIE. 1700. 1723.

Turquie, Arabie & Perse. 1701.

Mer Caspienne, partie Septentrionale. 1722.

Id. Méridionale. 1722.

Pays voisins de la Mer Caspienne. 1723.  
Perse. 1724.

Indes, Chine & Isles d'Asie. 1705.

Côtes de Malabar & Coromandel. 1723.

Isles de Ceylan. 1722.

Tartarie. 1706.

AFRIQUE. 1700. 1722.

Barbarie, Nigritie, Guinée. 1707.

Egypte, Nubie & Abissinie. 1707.

Congo & Pays des Caffres. 1708.

AMERIQUE. 1700. 1722.

Canada & pays voisins. 1703.

La Louisiane ou Mississipi. 1718.

Mexique, Virginie, &c. 1703.

Les Isles Antilles Françoises. 1717.

Isle Saint-Domingue. 1725.

Terre Ferme, Perou & Bresil. 1703.

Paraguay & Chili. 1703.

*Cartes particulieres inserées dans differens Ouvrages.*

Gaule Cisalpine, Ligurie & Pays voisins. *Histoire & Romaine du P. Catrou.*

Ancienne Sicile, ou la Licanie & Trinacrie, *ibid.*

Grece, *ibid.*

(c) 3

Grece

Grece ancienne, *Har. de Demosth. trad.*  
par M. Toureil.

Pays où les Chevaliers de Malthe de  
Jérusalem ont porté leurs armes.

*Hist. de Malthe.*

Syrie & Isle de Chypre, *ibid.*

Isles Rhodiennes, *ibid.*

France, *Connoissance des Temps.*

Natolie & Pays voisins, *Voyages de Paul-*  
*Lucas.*

Route de M. Zurabeck, Ambassadeur  
de Sa Majesté Polonoise à Cha-  
Ussin Roi de Perse, depuis Cha-  
makié jusqu'à Hispahan.

Terres que le Roi d'Espagne possède  
dans les quatre parties du Monde,  
en plusieurs petites Cartes, *Hist.*  
*d'Espagne.*

Royaume d'Yemen dans l'Arabie Heu-  
reuse, *Voyage de Moka.*

Carte marine du Golphe de Lyon.

1702 Jacques OZANAM. Géometre. 1717

Ses Ouvrages sont,

1 Géométrie Pratique. Paris 1689.  
12.

2 Tables des Sinus, &c. Paris 1720.  
8o.

3 Dictionnaire Mathématique. Paris  
1691. 4o.

4 Usage du Compas de proportion.  
Paris 1700. 12.

5 Usage de l'Instrument universel  
pour résoudre les Problèmes de  
Géométrie sans calcul. Paris  
1700. 12.

6 Méthode pour tracer des Cadrans.  
Paris 1673. 12.

7 Mé.



- 7 Méthode pour Arpenter. *Paris* 1725. 12.
- 8 Nouvelle Trigonométrie, *Paris* 1699. 12.
- 9 Traité des Lignes du premier genre; les Lieux géométriques, & la Construction des Equations. *Paris* 1687. 40.
- 10 Nouveaux Elémens d'Algebre. *Amst.* 1702. 40.
- 11 Cours de Mathématique. *Paris* 1693. 80. 5. vol.  
Savoir,  
Introduction aux Mathématiques.  
La Géométrie élémentaire.  
L'Arithmétique.  
La Trigonométrie & les Tables des Sinus.  
La Géométrie-Pratique.  
La Méchanique.  
La Perspective.  
La Géographie.  
La Gnomonique.
- 12 Recréations Mathématiques & Physiques. *Paris* 1723. 80. 4 vol.
- 13 Il a encore donné une Edition des Elémens d'Euclide par le P. Dechales; & a augmenté la Géométrie-Pratique de Boullanger, & le Traité de la Sphere du même Auteur.

1703 Martin POLI, Ingénieur du Roi. 1714  
*Associé Etranger.*

On a de lui,  
*Triomfo degli Acidi vendicati delle calunnie di molti Moderni.* *Roma* 1706. 40.

36 LISTE CHRONOLOGIQUE

1704 Philippe DE COURCILLON Mar- 1720  
quis DE DANGEAU, Gouver-  
neur de Touraine, Conseiller  
d'Etat - d'Epée, Chevalier des  
Ordres du Roi, Grand-Maitre  
des Ordres de Notre-Dame de  
Mont-Carmel & de S. Lazare  
de Jérusalem, *Honoraire.*

1705 François BIANCHINI, Prêlat-Do- 1729  
mestique du Pape. *Affocié Etran-*  
*ger.*

On a de lui,

1. *De Calendario & Cyclo Cesaris, ac  
de Canone Paschali Sancti Hippo-  
lyti Martyris, Dissertationes dua.  
Romæ 1703.*
2. *Solutio Problematis Paschalis. Romæ  
1703. 4º.*
3. *De Nummo & Gnomone Clementino.  
Romæ fol.*
4. *Hesperii & Phosphori nova Phanome-  
na; sive Observationes circa Plane-  
tam Veneris, &c. Romæ 1728.  
fol.*

1705 . . . . . GUISNÉ'E. Géometre. 1718

Il a publié,

Application de l'Algebre à la Géomé-  
trie. Paris 1705. & 1733. aug-  
mentée 4º.

1705 Jean-Louis PETIT, Chirurgien-Juré  
à Paris; Censeur Royal, de la  
Société Royale de Londres.  
*Anatomiste.*

Il a publié,

Traité des Maladies des Os, dans le-

quel

- 1705 . . . . . quel on a représenté les appareils & les machines qui conviennent à leur guérison: 3<sup>e</sup> Edit. Paris 1734. 12. 3. vol.  
Lettres à M. Andry Auteur de l'Extrait du Livre précédent, Paris 1724. 12.

1706 François NICOLE. *Mécanicien.*

1706 Claude-Joseph GEOFFROI, Ancien Echevin de la Ville de Paris, de la Société Royale de Londres. *Chymiste.*

1706. Joseph SAURIN. *Géometre.*

1706 René-Antoine DE REAUMUR. *Mécanicien.*

Il a publié,

L'Art de convertir le Fer forgé en Acier, & l'Art d'adoucir le Fer, ou de faire des Ouvrages de Fer fondu aussi finis que de Fer forgé. Paris 1722. 4<sup>o</sup>. & in douze sous presse à Amsterdam chez P. Mortier.

Mémoires pour servir à l'Histoire des Insectes. Tome 1. 8<sup>o</sup>. Amsterdam 1736. La suite sous presse chez Pierre Mortier.

1706 . . . . . BOMIE. *Géometre. Exclus.*

1706 . . . . . SAULMON. *Mécanicien.* 1725

1707 Jean TERRASSON, Lecteur du Roi & Professeur en Philosophie au Collège Royal de France, de

(c) 5

l'Acad-

58 LISTE CHRONOLOGIQUE

1707 l'Académie Française. Géomé-  
tre.

Il a publié,

Histoire ou Vie de Sethos. Paris 1731,  
12. 3 Vol. & Amst. 1732.

Extrait du Livre de la Géométrie de  
l'Infini de M. de Fontenelle.  
Mém. de l'Acad. 1727.

1707 Victor Marie D'ESTREES, Duc, Pair,  
Maréchal de France, Vice-  
Amiral de France, Grand d'Es-  
pagne, & Chevalier des Ordres  
du Roi, de l'Académie Fran-  
çoise, & Honoraire de celle des  
Belles-Lettres. Honoraire.

1708 Pierre MAGNOL, Docteur en Mé- 1715  
decine de la Faculté de Mont-  
pellier. Botanique.

Ses Ouvrages sont,

- 1 *Botanicum Monspelienſe*. Monſpel.  
1686. 8°.
- 2 *Prodromus Hiſtoriæ generalis Plan-  
tarum*. Monſpel. 1689. 8°.
- 3 *Hortus Regius Monſpelienſis*. Monſ-  
pel. 1697. 8°.
- 4 *Novus Character Plantarum, opus  
poſthumum*. Monſpel. 1710. 4°.

1708 Raymond VIEUSSENS, Docteur en 1715  
Médecine de la Faculté de  
Montpellier. Anatomiste.

Ses Ouvrages sont,

- 1 *Neurographia univerſalis*. Lugd. 1684.  
fol.
- 2 *Novum vaſorum Corporis humani  
ſyſtema*. 8°.

3 Traité

DE L'ACADEMIE.

39

- 3 Traité du Cœur & de l'Oreille.
- 4 Traité des Liqueurs du Corps humain.
- 5 Lettres sur l'Acide du sang.
- 6 Réponse à trois Lettres imprimées de M. Chirac.

1708 Hans SLOANE, Docteur en Médecine, Président de la Société Royale de Londres. *Associé Etranger.*

Il a publié,

*Catalogus Plantarum quæ in Insula Jamaïca sponte veniunt.* Londini 1696. 8o.

*Voyages aux Îles de Madere, Barbades, Nieves, S. Christophle & la Jamaïque; avec une Histoire naturelle des Plantes de ces Pays (en Anglois.)* Londres 1707. & 1725. fol. 2 vol.

1708 Jaques-Benigne WINSLOW, Médecin de la Faculté de Paris, Interprete de la Langue Teutonique à la Bibliothèque du Roi, de la Société de Berlin. *Anatomiste.*

Il a publié,

*Lettre à M. Morand sur l'opération de la Taille au haut appareil, &c.* Paris 1728. 12.

*Exposition Anatomique de la structure du Corps humain.* Paris 1732. 4o. & 12. & *Amst.* 1732.

# 60 LISTE CHRONOLOGIQUE

1709 Jean-Baptiste ENGUEHARD, Doc- 1716  
 teur en Médecine de la Faculté  
 de Paris. *Anatomiste.*

1710 . . . Mylord Comte DE PEMBROK. 1733  
*Associé Etranger.*

1711 Jean-Nicolas DE LA HIRE, Docteur- 1727  
 Régent de la Faculté de Méde-  
 cine de Paris. *Botaniste.*

Il avoit commencé un Recueil de  
 Plantes dessinées au naturel par  
 le moyen d'un secret dont il étoit  
 l'inventeur, & qui est demeuré  
 enseveli avec lui; il les repré-  
 sentoit avec une telle vérité,  
 que l'on croyoit voir la Plante  
 même. Ce secret, autant qu'on  
 le peut conjecturer, consistoit à  
 rapporter au moyen d'une cer-  
 taine impression, les Plantes  
 elles-mêmes sur le papier.

1711 Bernard DE BRAGELOGNE, Doyen 3  
 & Comte de Brioude. *Associé-  
 Libre.*

Il a composé un Traité des Lignes du  
 quatrieme Ordre, lequel est sous  
 presse. 4o.

1711 Antoine DE JUSSIEU, Docteur-Régent  
 de la Faculté de Médecine de  
 Paris, Professeur de Botanique  
 au Jardin Royal des Plantes,  
 des Académies de Londres &  
 de Berlin. *Botaniste.*

# DE L'ACADEMIE.

67

Il a publié,

- 1 R. P. Jacobi Barrelieri *Planta per Galliam, Hispaniam & Italiam observata; Opus posthumum, ad recentiorum Botanicorum normam digestum.* Paris. 1714. fol.
- 2 Discours sur le Progrès de la Botanique prononcé au Jardin Royal; suivi d'une Introduction à la Connoissance des Plantes. Paris 1718. 4o.
- 3 Jos. Pitton Tournefort, &c. *Institutiones Rei Herbariae: Edit. 3. Appendicibus aucta.* Lug. 1719. 4o. 3 vol.
- 4 Dictionnaire universel des Drogues Simples, &c. par feu M. Lemeroy: 3e. Edit. revue & corrigée. Paris 1733. 4o.

1711 Jean-Henri IMBERT, Docteur en 1722  
Médecine de la Faculté de Paris.

1712 Pierre BLONDIN, Docteur en Médecine. 1713  
*Botaniste.*

1712 . . . . DESLANDES Commissaire  
de la Marine à Brest.

1712 Pierre-Simon ROUHAULT, Chirurgien Juré de Paris, Chirurgien du feu Roi de Sardaigne & de ses Armées, Professeur en Chirurgie dans l'Université de Turin.  
*Anatomiste.*

Il a publié,

- 1 Traité des Playes de Tête. Turin 1720. 4o. (c) 7.

2 Ob-

2 *Observationi Anatomico-Fisiche. Torino 1724. 4°.*

Cet Ouvrage contient six Dissertations :

*Della Placenta e delle Membrane del Feto.*

*Del Tralcio ossia Cordone ombelicale.*

*Della Nutrizione del Feto.*

*Per qual legge di forza passi il sangue della Madre al Feto.*

*Della circolazione del Sangue per il cuore del Feto.*

*Della Cagione del Parto.*

3 *Réponse à la Critique faite à son Mémoire de la Circulation du Sang dans le Fœtus humain par M. Winslow Docteur-Régent, &c. Turin 1728. 4°. en François & en Italien.*

1714 Eugene d'ALONVILLE, Chevalier 1731  
DE LOUVILLE. *Astronome.*

1714 Joseph-Nicolas DELISLE, Lecteur  
du Roi & Professeur en Mathématiques au Collège Royal de France, des Académies de Londres, de Berlin & de Russie.  
*Astronome.*

1715 Jean-Claude-Adrien HELVETIUS;  
Conseiller d'Etat, premier Médecin de la Reine, Médecin-Inspecteur des Hôpitaux Militaires. *Honoraire.*

Il a publié,

1 *Idée générale de l'Oeconomie Animale, & Observations sur la*

*petite*



- petite Verole. *Paris* 1722. 8o.  
 2 Lettres au sujet de la Lettre critique de M. Besse contre le Livre précédent. *Paris* 1725. 8o.  
 3 Eclaircissemens concernant la maniere dont l'Air agit sur le Sang dans les Poulmons ; avec une Lettre Latine à M. Winflow : *De Structura Glandulae*. *Paris* 1728. in-4o.  
 1715 . . . . Duc D'ESCALONE. *Affocié* 1725. *Etranger*.

1715 Louis-Ferdinand Comte MARSIGLI, 1730  
 Fondateur de l'Institut des Sciences & des Arts à Bologne.  
*Affocié Etranger*.

Ses Ouvrages sont,

- 1 *De Bosphoro Thracico*. Romæ 1681.
- 2 *Dissertatio de generatione Fungorum*. Romæ 1714. fol.
- 3 *Prodromus Dannubialis Operis*. Norriberg. 1700. fol.
- 4 *Dannubius Pannonico-Mysicus*. Hagæ-Com. 1726. fol. Atl. 6. vol.
- 5 *Histoire Physique de la Mer*. Ib. 1725. fol.
- 6 *Etat Militaire de l'Empire Ottoman, Italien & François*. La Haye 1732. fol.

1716 Melchior DE POLIGNAC, Cardinal,  
 Archevêque d'Auch, Primat d'Aquitaine, &c. Commandeur des Ordres du Roi, Général Grand-Maitre de l'Ordre du Saint-Esprit de Montpellier, de l'Académie Française, Hono-

raire

64 LISTE CHRONOLOGIQUE

raire de celle des Belles-Lettres.  
*Honoraire.*

1716 Marc-René DE VOYER DE PAUL- 1721 1716  
MY, Marquis D'ARGENSON,  
Garde des Sceaux de France.  
*Honoraire.*

1716 Louis-LEON PAJOT Comte d'ON-  
SEMBRAY, Intendant-général  
des Postes & Relais de France.  
*Honoraire.*

1716 Pierre CHIRAC, Docteur en Médecine 1732 1716  
de la Faculté de Montpellier,  
premier Médecin du Roi, Inten-  
dant du Jardin Royal des Plan-  
tes. *Associé Libre.* Ses princi-  
paux Ouvrages sont,

1 *De Motu Cordis Specimen analyticum.*  
80.

2 *De Pilorum structura, cum figuris:*  
imprimé dans les Journaux de  
Leipsic, & dans le Théâtre  
Anatomique de Manget. 1716

3 Plusieurs Theses curieuses; entre  
autres,  
*De Passione Iliaca.*  
*De Incubo.*  
*De Vulneribus.*

1716 Jean-Elie LERIGET DE LA FAYE, 1718  
Capitaine aux Gardes. *Associé.*  
*Libre.*

1716 Pierre REMOND DE MONTMOR. 1719  
*Associé-Libre.*

Il a publié,  
Essai d'Analyse sur les Jeux de Hazard.

Paris

Paris 1708. 1<sup>e</sup> Edit. & 1713.2<sup>e</sup> Edit. 4<sup>o</sup>.1716 Charles REYNEAU, Prêtre de l'Oratoire. 1728  
*Affocié-Libre.*

On a de lui,

- 1 La science du Calcul des Grandeurs en général; ou les Elémens des Mathématiques. Paris 1714. 4<sup>o</sup>.
2. Analyse démontrée, ou la Méthode de résoudre les Problèmes des Mathématiques, &c. Paris, 1708. 4<sup>o</sup>. 2 vol.

1716 Jean-Baptiste DESCHIENS DE RESSONS, Commandeur de l'Ordre Militaire de S. Louis, Brigadier des Armées du Roi, Lieutenant-Général d'Artillerie, & Lieutenant de Roi du Pays du Maine. 1728  
*Affocié-Libre.*

1716 Sebastien VAILLANT, Démonstrateur des Plantes du Jardin Royal. 1722  
*Botaniste.*

On a de lui,

- 1 Discours sur la Structure des Fleurs, leurs différences & l'usage de leurs parties : Franç. Lat. Leyde 1718. 4<sup>o</sup>.
- 2 Etablissement d'un nouveau genre de Plantes nommé *Araliastrum*. Hanov. 1718. 4<sup>o</sup>.
3. *Botanicon Parisiense, Operis majoris prodituri Prodromus.* Lugd Bat. 1723. 8<sup>o</sup>.
- 4 *Botanicon Parisiense*; ou dénombre-

ment

66 LISTE CHRONOLOGIQUE

ment par ordre alphabétique des  
Plantes qui se trouvent aux en-  
virois de Paris. *Leyde* 1727. fol.

1716 Antoine-Tristan DANTY D'ISNARD,  
Docteur en Médecine, ancien  
Professeur Royal des Plantes au  
Jardin du Roi. *Botaniste.*

1716 ..... DE CAMUS. *Mécanicien.* Ex-  
clus par absence.  
Il a publié,  
Traité des Forces mouvantes. *Paris*  
1722. 8°.

1718 Jean-Baptiste COLBERT, Marquis  
DE TORCY & de Sablé. *Ho-  
noraire.*

1718 ..... MARIUS. *Mécanicien.* 1720

1718 Henri-Jaques NOMPAR DE CAU- 1726  
MONT, Duc DE LA FORCE,  
Pair de France, de l'Académie  
Françoise. *Honoraire.*

1718 Jean-Jaques DORTOUS DE MAI-  
RAN. *Géometre.*

Il a publié,

1. Dissertation sur les variations du  
Barometre. *Beziers* 1712. 12.

2. Dissertation sur la Glace; ou Ex-  
plication physique de la forma-  
tion de la Glace & de ses divers  
phénomènes. *Paris* 1730. 12.

3. Dissertation sur la Cause de la Lu-  
miere des Phosphores & des  
Noctiluques. *Bordeaux* 1717. 12.

4. Traité

1718 4 Traité Physique & Historique de  
l'Aurore Boreale. *Suite des Mém.  
de l'Acad. de 1731. Paris 1733.  
4°. & Amst. in 12. chez Pierre  
Mortier.*

1719 Jean LAW, Contrôleur Général des 1729  
Finances. *Honoraire.*

1721 André-Hercule DE FLEURY, Cardi-  
nal, Ministre d'Etat, Grand-  
Aumônier de la Reine. *Hono-  
raire.*

1721 Jean-Baptiste-Henri DU TROUSSET 1730  
DE VALINCOUR, Secrétaire  
général de la Marine, de l'Aca-  
démie Française. *Honoraire.*

1721 Marie-Guillaume-Bénard DE REZAY.  
*Affilié-Libre.*

1721 Joseph PRIVAT DE MOLIERE,  
Lecteur du Roi & Professeur en  
Philosophie au Collège Royal  
de France, de la Société Royale  
de Londres. *Mécanicien.*

Il a publié,

1 Leçons de Mathématique néces-  
saires pour l'intelligence des  
Principes de Physique, &c. *Paris  
1725. 12.*

2 Leçons de Physique, contenant  
les Elémens de la Physique, dé-  
terminés par les seules Loix mé-  
caniques, 12°. 2 vol. *Paris  
1733 & 1736.*

1721 PIERRE I. Empereur des Russies. 1723  
Honneur.

1722 François PETIT, Docteur en Médecine, Médecin des Armées du Roi. *Anatomiste.*

Il a publié ;

- 1 Trois Lettres écrites à M. &c. Namur 1710. 4°. Savoir,  
Sur un nouveau Système du Cerveau.

Differtation sur le Sentiment, & plusieurs expériences de Chymie contraires au système des Acides & des Alcalis.

Critique des trois especes de *Chrysosplenium* des Instituts de M. Tournefort ; trois nouveaux genres de Plantes (*Provençalina palustris*, *Calamus Aromaticus*, *Dantia palustris*.)

- 2 Differtation sur une nouvelle Méthode de faire l'Opération de la Cataracte. Paris 1727. 12.

- 3 Lettre dans laquelle il est démontré que le Crystallin est fort près de l'Uvée, & où l'on rapporte de nouvelles preuves de l'Opération de la Cataracte. Paris 1729. 4°.

- 4 Lettre contenant des Réflexions sur ce que M. Hecquet Docteur en Médecine a fait imprimer touchant les Maladies des yeux. Paris 1729. 4°.

- 5 Lettre contenant des Réflexions sur des découvertes faites sur les yeux. Paris 1732. 4°.

Jaques

1722 Jaques TRANT, Docteur en Médecine de la Faculté de Paris.  
*Botaniste.*

1722 Sauveur MORAND, Chirurgien-Juré de Paris, Censeur & Démonstrateur Royal, de la Société Royale de Londres, Chirurgien des Invalides en survivance, & de l'Hôpital de la Charité en Chef.  
*Anatomiste.*

Il a publié,

- 1 Traité de la Taille au haut Appareil, &c. *Paris 1728. 12.*
- 2 Traité de la Taille par l'Appareil lateral, avec figures. *Sous presse.*

1723 Pierre-Louis MOREAU DE MAUPERTUIS, de la Société Royale de Londres. *Géometre.*

Il a publié,

Discours sur les différentes figures des Astres, d'où l'on tire des Conjectures sur les Etoiles qui paroissent changer de grandeur, & sur l'Anneau de Saturne; avec une exposition abrégée des Systèmes de M. Descartes & de M. Newton. *Paris 1732. 80.*

1723 Camille D'HOSTUN DUC DE TAL-LARD, Pair & Maréchal de France, & Gouverneur des Comtés de Foix & de Bourgogne. *Honoraire.*

1723 Charles DE CISTERNAY DU-FAY, Capitaine au Régiment de Picar-

die ;

70 LISTE CHRONOLOGIQUE

die, Intendant du Jardin Royal  
des Plantes, de la Société Royale  
de Londres. *Chymiste.*

1724 . . . . DE BEAUFORT, *Géometre.* 1728

1724 Henri PITÔT. *Géometre.*

Il a publié,

La Théorie de la Manœuvre des  
Vaisseaux réduite en Pratique,  
Paris 1731. 4°.

1724 Pierre SENAC, Docteur en Médecine.  
*Anatomiste.*

Il a publié,

1 Nouveau Cours de Chymie suivant  
les Principes de Newton & de  
Stahl. Paris 1723. 2 vol. 12.

2 Discours sur la Méthode de Fran-  
ce, & sur celle de M. Rau,  
touchant l'Opération de la Pier-  
re; avec le Traité de l'Opération  
de la Taille par Collot. Paris  
1727. 12.

1725 Jean-Frédéric PHELYPEAUX DE  
PONTCHARTRAIN, Comte DE  
MAUREPAS, Secrétaire d'Etat.  
*Honoraire.*

1725 Louis DELISLE de la Croyere.  
*Astronome.*

1725 Bernard DE JUSSIEU, Docteur en  
Médecine de la Faculté de Paris,  
Démonstrateur des Plantes au Jar-  
din du Roi, de la Société Royale  
de Londres. *Botaniste.*



1725

Il a publié,

Histoire des Plantes qui naissent aux environs de Paris; avec leur Usage en Médecine, par M. Tournefort, &c. 2<sup>e</sup> Edit. revue & augmentée. Paris 1725. 2 vol.

1725

Pierre LE MONNIER, Professeur de Philosophie dans l'Université de Paris. *Géometre*.

1725

Louis GODIN. *Astronome*.

Il a publié,

1 Tables des Matières contenues dans l'Histoire & les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences depuis 1666. jusqu'en 1730.

Paris 1728. 8<sup>e</sup> suiv. 4<sup>o</sup>. 4 vol.

& in douze sous presse chez Pierre Mortier, à Amsterdam.

2 Connoissances des Temps pour les Années 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. Paris 12.

3 Histoire de l'Académie Royale des Sciences depuis l'an 1680 jusqu'en 1698. 4<sup>o</sup>. & in douze sous presse à Amsterdam, chez Pierre Mortier.

1725

Pierre MALOET, Docteur en Médecine de la Faculté de Paris, Médecin de l'Hôtel Royal des Invalides. *Anatomiste*.

1725

Jean P. DE CROUSAZ, Gouverneur de S. A. S. le Prince Frédéric de Hesse-Cassel; ci-devant Professeur en Philosophie & en Mathématique

dans

1725

dans l'Université de Groningue,  
*Affocié Etranger.*

Il a publié,

- 1 Logique ou Système de Réflexions  
 qui peuvent contribuer à la net-  
 teté & à l'étendue de nos con-  
 noissances : 3<sup>e</sup> Edit. *La Haye*  
 1725. 4. vol. 12.
- 2 Réflexions sur l'Utilité des Mathé-  
 matiques & sur la maniere de  
 les étudier ; avec un nouvel  
 Essai d'Arithmétique démontrée.  
*Amsterd.* 1715. 8<sup>o</sup>.
- 3 La Géométrie des Lignes & des  
 Surfaces rectilignes & circulai-  
 res. *Amsterd.* 1718. 2 vol. 8<sup>o</sup>.
- 4 Discours sur le principe, la na-  
 ture, & la communication du  
 Mouvement. *Paris* 1721. 4<sup>o</sup>.
- 5 Commentaire sur l'Analyse des  
 Infiniment-Petits. *Paris* 1721. 4<sup>o</sup>.
- 6 Traité d'Algebre. *Paris* 1726. 8<sup>o</sup>.
- 7 Examen du Pyrrhonisme ancien &  
 moderne. *La Haye* 1733. fol.
- 8 Logique ou Système. abrégé &c.  
 8<sup>o</sup>. *Amst.* 1736.
- 9 Ouvrages divers, 2 vol. *Amst.* 1736.  
 Contenant les Traités suivans,  
 Traité sur l'obligation où sont les  
 hommes de s'unir en Corps de  
 Société, Partie I.  
 Continuation, où l'on parcourt  
 les Dialogues de Mr. le Baron  
 de la Hontan.  
 Discours sur la beauté & l'utilité  
 des Sciences.  
 Pensées libres sur l'Instruction du  
 bas College.

Des

Des Instructions publiques dans les  
Auditoires.

Discours sur la Pédanterie.

1726 Jean-René DE LONGUEUIL DE 1731  
MAISONS, Président au Parle-  
ment. *Honoraire.*

1726 Paul-Marc DE VOYER DE PAUL-  
MY, Marquis D'ARGENSON,  
Conseiller d'Etat, Grand-Croix &  
Chancelier de l'Ordre de S. Louis,  
Chancelier-Garde-des-Sceaux de  
Monseigneur le Duc d'Orleans.  
*Honoraire.*

1726 Louis Claude BOURDELIN, Docteur  
en Médecine de la Faculté de Paris.  
*Chymiste.*

1727 Michel-Robert LE PELLETIER DES  
FORTS, Comte de Saint-Fargeau,  
&c. *Honoraire.*

1727 Eustache MANFREDI, Astronome  
de l'Institut des Sciences de Bo-  
logne. *Affilié Etranger.*

Il a publié,

1 *Epistola ad Quartaionium, qua*  
*Anonymæ Assertiones 16. pro refor-*  
*matione Calendarii vindicantur.*  
*Venetii. 1705. 4º.*

2 *Ephemerides Motuum Cælestium ab*  
*Anno 1715 ad Annum 1750. cum*  
*Introductione & variis Tabulis.*  
*Bononiæ 1715. & 1725. 4º.*  
4 vol.

(d)

3 De

## LISTE CHRONOLOGIQUE

- 3 De *Transitu Mercurii per Solem* anno 1723. &c. Bononiæ 1723. 4<sup>o</sup>.  
 4 De *Annuis Inerrantium Stellarum aberrationibus*. Bononiæ 1729. 4<sup>o</sup>.

1727 Frideric RUISCH, de l'Académie des 1731  
 Curieux de la Nature, & de la  
 Société Royale de Londres., Pro-  
 fesseur d'Anatomie & de Botanique  
 à Amsterdam. *Associé Etranger.*

Ses Ouvrages sont,

- 1 *Dilucidatio Valvularum in Vasis lymphaticis & lacteis.*
- 2 *Observationum Anatomico-Chirurgicarum Centuria.* Amst. 1691. 4<sup>o</sup>.
- 3 *Epistola problematica sexdecim.*
- 4 *Responsio ad Godof. Bidloi Libellum Vindiciarum.*
- 5 *Adversariorum Anatomico-Medico-Chirurgicorum Decades tres.* Amst. 1717. 4<sup>o</sup>.
- 6 *Thesaurus Animalium primus.*
- 7 *Thesauri Anatomici decem.*
- 8 *Museum Anatomicum.*
- 9 *Curae posteriores, seu Thesaurus omnium maximus.*
- 10 *Cura renovata post Curas posteriores.*
- 11 *Responsio ad J. C. Boblium, de usu novarum Cavae propaginum, &c.*
- 12 *Responsio de Glandulis ad Cl. Boerhave.*
- 13 *Tractatio de Musculo in fundo Uteri observato & à nemine antebac detecto.* Amst. 1726. 4<sup>o</sup>.

1727 Charles - Etienne - Louis CAMUS,  
 Secrétaire & Professeur de Mathématique

- 1727 matique de l'Académie Royale  
d'Architecture. *Mécanicien.*

Il a publié,

Mémoire où l'on examine quelle est  
la meilleure maniere de mâter les  
vaisseaux, tant par rapport à la  
situation, qu'au nombre & à la  
hauteur des Mâts. *Paris 1728. 4º.*

- 1728 Henri-François D A G U E S S E A U,  
Chancelier de France. *Honoraire.*

- 1728 Henri-Louis DU HAMEL du Monceau.  
*Botaniste.*

- 1728 François-Joseph HUNAUD, Docteur  
en Médecine de la Faculté de Pa-  
ris, Professeur en Anatomie & en  
Chirurgie au Jardin Royal. *Anato-  
miste.*

- 1729 Pierre MAHIEU. *Géometre.*

- 1729 Edmond HALLEY, Astronome de  
S. M. Britannique, de la Société  
Royale de Londres. *Affilié Etran-  
ger.*

Il a publié,

*Catalogus Stellarum Australiorum ex Ob-  
servationibus in Insula Sanctæ Helene  
factis, &c. Londini 1678. 4º.*

*Tabula Astronomica. Londini 1720. 4º.*

76 LISTE CHRONOLOGIQUE

1730 Joseph-Antoine D'AGUESSEAU DE VALJOUAN, Conseiller Honoraire au Parlement. *Honoraire.*

1730 Philippe BUACHE, Premier Géographe du Roi. *Géographe.*

Il a publié,

Carte du Sénégal ou Afrique Françoisse.

1727.

Empire d'Alexandre. 1731.

Carte de la Martinique. 1732.

1730 Charles-Marie DE LA CONDAMINE, Lieutenant au Régiment de Clermont Cavalerie, Chevalier de l'Ordre de S. Lazare. *Chymiste.*

1730 Herman BOERHAVE, Professeur en Médecine, Botanique & Chymie à Leide, de la Société Royale de Londres. *Associé Etranger.*

Il a publié,

1 *Institutiones Medicae in usum annuae exercitationis domesticos.* 12.

2 *Aphorismi de cognoscendis & curandis Morbis, in usum Doctrinae domesticæ digesti.* 12.

3 *Libellus de Materia Medica & Remediorum Formulæ, quæ serviunt Aphorismis de cognoscendis & curandis morbis.* 12.

4 *Elementa Chæmiæ quæ anniversario labore docuit in publicis privatisque Scholis.* 1732. Lugd. Bat. 2 vol. 4°.

1732.

5 Ora-

- 5 *Orationes Academica octo.*
- 6 *Epistola ad Ruiscbium de Fabrica Glandularum.* 1722. 4<sup>o</sup>.
- 7 *Morbi atrocis nec prius descripti Historia secundum Medicæ artis leges conscripta.* 1724.
- 8 *Atrocis rarissimique Morbi Historia.* 1728.
- 9 *Tractatus Medicus de Lue Aphrodisiacâ, quem Præfationis loco Editioni Lugduno-Batavæ Aphrodisiacæ præxit.* 1728.
- 10 *Index Plantarum Horti Lugd. Bat.* Lugd. Bat. 2 vol. 4<sup>o</sup>.

1731 Louis - François - Armand, Duc DE RICHELIEU & de Fronsac, Pair de France, Chevalier des Ordres du Roi, ci-devant Ambassadeur de France à la Cour de Vienne, de l'Académie Française. *Honoraire.*

1731 Alexis CLAIRAUT. *Géomètre.*

Il a publié,

*Recherches sur les Courbes à double courbure.* Paris 1731. 4<sup>o</sup>.

1731 Jean GROSSE, Docteur en Médecine. *Chymiste.*

1731 . . . . . DE VALLIERE, Maréchal des Camps & Armées du Roi, Commandeur de l'Ordre Militaire de S. Louis, Lieutenant-Général

78 LISTE CHRONOLOGIQUE

1731 d'Artillerie, Directeur-général des Bataillons de Royal-Artillerie, & des Ecoles d'Artillerie. *Affocié-Libre.*

1731 François GIGOT DE LA PEYRONNIE, Premier Chirurgien du Roi en survivance. *Affocié-Libre.*

1731 Jean-Baptiste MORGAGNI, Docteur en Médecine, Professeur d'Anatomie dans l'Université de Padoue, de la Société Royale de Londres. *Affocié Ecranger.*

Il a publié,

1 *Adversaria Anatomica omnia.* Patavii 1719. 4°.

2 *Epistola Anatomica dua novas Observationes & animadversiones complectentes, quibus Anatome augetur, Anatomicorum inventorum Historia evoluitur, utraque ab erroribus vindicatur.* Lugd. Bat. 1728. 4°.

3. *In Cornelium Celsum, & in Serenum Sammonicum Epistola quatuor.* Patavii 1728. 8°.

1731 . . . . . BOUGUER, Professeur Royal d'Hydrographie au Havre de Grace. *Géometre.*

Il a publié,

1 *De la Mâture des Vaisseaux.* Paris 1727. 4°.

2 *De la Méthode d'observer exactement sur mer la hauteur des Astres.* Paris 1729. 4°.

3 *Essai*



- 1731 3 Essai d'Optique sur la gradation de  
la Lumiere. *Paris* 1729. 80.  
4 De la Méthode d'observer en Mer  
la déclinaison de la Boussole.  
*Paris* 1731. 40.

1731 . . . . . MARALDI. *Astronome.*

1731 Jean-Paul GRANDJEAN. *Astronome.*

1732 François CHICOYNEAU, Conseiller  
d'Etat ordinaire, Premier Médecin  
de Sa Majesté, Sur-Intendant des  
Eaux minérales & médicinales de  
France. *Affocié-Libre.*

1732 Etienne-Simon DE GAMACHES,  
Chanoine Régulier de Sainte Croix  
de la Bretonnerie. *Affocié Libre.*

Il a publié,

- 1 Système du Mouvement. *Paris*  
1721. 12.  
2 Système du Cœur, ou conjectures  
sur la maniere dont naissent les  
différentes affections de l'Ame,  
principalement par rapport aux  
objets sensibles: 2e. Edit. 1708.  
12.

1733 Alexis FONTAINE. *Géomètre.*

1733 Christian WOLPHIUS, Professeur de  
Mathématiques & de Philosophie  
à Marburg, de la Société Royale  
de Londres, & de celle de Prusse.  
*Affocié-Etranger.*

# 10 LISTE CHRONOLOG. DE L'ACAD.

1733

Il a publié,

- 1 *Elementa Mathematicos universa*, &c.  
Havæ 1717. 4 vol. 4<sup>o</sup>.
- 2 *Ratio Prælect. in Mathematicis & Philo-  
sophiam universalem*. Havæ 1718.  
8<sup>o</sup>.
- 3 *Oratio de Sinarum Philosophia practi-  
ca*. Francofurti 1726. 4<sup>o</sup>.




LISTE



L I S T E  
 A L P H A B E T I Q U E  
 D E  
 L' A C A D E M I E  
 R O Y A L E  
 D E S  
 S C I E N C E S,

Depuis l'Etablissement de cette Com-  
 pagnie en 1666, jusqu'en 1733.



*Année  
 de  
 Recept.*

*Année  
 de la  
 Mort*

1711 D



LONVILLE, Voyez DE  
 LOUVILLE.

1699

Guillaume AMONTONS,  
*Mécanicien.*  
 (d) 5

1705  
 Marc

1716 Marc René DE VOYER DE PAUL- 1721  
MY Marquis D'ARGENSON,  
Garde des Sceaux de France,  
*Honoraire.*

1726 Pierre Marc DE VOYER DE PAUL-  
MY, Marquis D'ARGENSON,  
Conseiller d'Etat, Grand-Croix  
& Chevalier de l'Ordre de S. Louis,  
Chancelier-Garde des Sceaux de  
Monseigneur le Duc d'Orleans,  
*Honoraire.*

1666 ADRIEN AUZOUT, *Astronome.* 1691

1724 . . . . . DE BEAUFORT, *Géometre.* 1728

1699 . . . . . DE BEAUVILLIER, Ingé- 1730  
nieur de la Marine.

1699 Claude BERGER, Docteur en Mé- 1712  
decine, Professeur en Chymie au  
Jardin Royal, *Botaniste.*

1699 Jaques BERNOULLI, Professeur de 1705  
Mathématiques à Basse, *Associé*  
*Etranger.*

1699 Jean BERNOULLI, Professeur de  
Mathématiques à Groningue, &  
ensuite à Basse, de la Société  
Royale de Londres, de celle de  
Berlin, & de l'Académie Impériale  
de Russie, *Associé Etranger.*

1683 Henri DE BESSE', Sieur de la Cha- 1692  
pelle-Milon, Inspecteur des Beaux-  
Arts.

1666 DE BESSY. Voyez FRENICLE.

1705 François BIANCHINI, Prêlat- 1719  
Domestique du Pape, *Associé*  
*Etranger.*

1691 Jean-Paul BIGNON, Abbé de S.  
Quentin, &c. Doyen des Conseil-  
seillers d'Etat, Bibliothécaire du  
Roi, de l'Académie Française, &  
de celle des Belles-Lettres, *Hon-*  
*oraire.*

1699 Gilles FILLEAU DES BILLETES, 1720  
*Mécanicien.*

1669 François BLONDEL, Seigneur de 1686  
Croissettes & de Gaillardon, Pro-  
fesseur Royal en Mathématiques  
& en Architecture, Maréchal de  
Camp aux Armées du Roi, *Géo-*  
*metre.*

1712 Pierre BLONDIN, Docteur en Mé- 1713  
decine, *Botaniste.*

1730 Herman BOERHAVE, Professeur en  
Médecine, Botanique & Chymie  
à Leide, de la Société Royale de  
Londres, *Associé Etranger.*

1706 . . . . . BOMIE, *Géometre,*  
*exclus.*

1674 Pierre BOREL, Conseiller-Médecin 1689  
ordinaire du Roi, Docteur en  
Médecine, *Chymiste.*

# 84 LISTE ALPHABETIQUE

1731 . . . . . BOUGUER, Professeur  
Royal d'Hydrographie au Havre  
Grace, *Géometre.*

1699 Simon BOULDUC, ancien Juge- 1729  
Consul, Apoticaire de S. A. R.  
Madame Douairiere d'Orleans, &  
de la Reine Douairiere d'Espagne,  
Démonstrateur en Chymie au Jar-  
din Royal, *Chymiste.*

1699 Gilles-François BOULDUC, Premier  
Apoticaire du Roi, ancien Eche-  
vin & ancien Juge-Consul, Dé-  
monstrateur en Chymie au Jardin  
Royal, *Chymiste.*

1666 Claude BOURDELIN, Docteur en 1699  
Médecine, *Chymiste.*

1699 Claude BOURDELIN, Premier Mé- 1711  
decin de Madame la Duchesse de  
Bourgogne, de la Société Royale  
de Londres, *Botaniste.*

1726 Louis-Claude BOURDELIN, Docteur  
en Médecine de la Faculté de  
Paris, *Chymiste.*

1711 Bernard DE BRAGELONGNE,  
Doyen & Comte de Brioude,  
*Associé Libre.*

2730 Philippe BUACHE, Premier Géogra-  
phe du Roi, *Géographe.*

1666 Jaques BUOT, Ingénieur du Roi & 1675  
Professeur de Mathématiques des

Pages

1699 Claude BURLLET, Docteur en Médecine de la Faculté de Paris, 1731  
Premier Médecin du Roi d'Espagne, *Botaniste.*

1727 Charles Etienne-Louis CAMUS,  
Secrétaire & Professeur de Mathématique, de l'Académie Royale d'Architecture, *Mécanicien.*

1716 . . . . . DE CAMUS, *Mécanicien.*  
Exclus par absence.

1666 Pierre DE CARCAVI, Conseiller au Parlement de Toulouse, puis Conseiller au Grand Conseil, & enfin Garde de la Bibliothèque du Roi, *Géomètre.*

1697 Louis CARRE', *Géomètre.* 1711

1669 Jean-Dominique GUSSINI, Premier Professeur d'Astronomie à Bologne, Sur-Intendant des Eaux de l'Etat de Bologne, *Astronome.* 1712

1694 Jaques CASSINI, Maître des Comptes, de la Société Royale de Londres, *Astronome.*

1718 DE CAUMONT. Voyez DE LA FORCE.

1666 Marin CUREAU DE LA CHAMBRE, Médecin ordinaire du Roi, de l'Académie Française, *Physicien.* 1671

86 LISTE ALPHABETIQUE

1692 Moïse CHARAS, Docteur en Médecine à Londres, Professeur de Chymie au Jardin Royal, *Chymiste*.

1695 Jean-Matthieu DE CHAZELLES, 1710 *Astronome*.

1699 François CHEVALIER, Maître de Mathématiques du Roi & des Pages de la Petite Ecurie, *Mécanicien*.

1732 François CHICOYNEAU, Conseiller d'Etat ordinaire, Premier Médecin de Sa Majesté, Sur-Intendant des Eaux minérales & médicinales de France, *Associé-Libre*.

1716 DES CHIENS. Voyez DE RESSONS.

1716 Pierre CHIRAC, Docteur en Médecine de la Faculté de Montpellier, 1732 Premier Médecin du Roi, Intendant du Jardin Royal des Plantes, *Associé Libre*.

1702 Jean-Baptiste CHOMEL, Docteur-Régent de la Faculté de Médecine à Paris, Médecin ordinaire du Roi, *Botaniste*.

1723 DE CISTERNAY. Voyez DUFAY.

1731 Alexis CLAIRAUT, *Géomètre*.

1666 Samuel COTREAU DU CLOS, Mé- 1685 cin ordinaire du Roi, *Chymiste*.

1730 Charles-Marie DE LA CONDAMI-

NE,



# DE L'ACADEMIE.

87

NE, Lieutenant au Régiment de Clermont Cavalerie, Chevalier de l'Ordre de Saint Lazare, *Chymiste.*

1718 COLBERT. Voyez DE TORCY.

1666 COTEREAU. Voyez DU CLOS.

1693 . . . . . DE LA COUDRAYE . . . . .

1666 Claude-Antoine COUPLET, Pro- 1722  
fesseur de Mathématiques des Pages de la Grande Ecurie, Trésorier de l'Académie, *Mécanicien.*

1696 Pierre COUPLET DE TARTREAU,  
Professeur de Mathématiques des Pages de la grande Ecurie du Roi, Trésorier de l'Académie, *Mécanicien.*

1704 DE COURCILLON, Voyez DAN-  
GEAU.

1725 Jean P. DE CROUSAZ, Gouverneur de S. A. S. le Prince Frederic de Hesse-Cassel, ci devant Professeur en Philosophie & en Mathématiques dans l'Université de Groningue, *Affocié Etranger.*

1725 DE LA CROYERE. Voyez DE-  
LISLE.

1666 CUREAU. Voyez DE LA CHAMBRE.

1685 . . . . . CUSSET, *Astronome.* . . . .

Henri

88 LISTE ALPHABETIQUE

1728 Henri-François D A G U E S S E A U,  
Chancelier de France, *Honoraire.*

1730 Joseph Antoine D A G U E S S E A U D E  
V A L J O U A N. *Honoraire.*

1699 André D A L E S M E, *Mécanicien.* 1737

1704 Philippe D E C O U R C I L L O N, Mar- 1720  
quis D E D A N G E A U, Gou-  
verneur de Touraine, Conseiller  
d'Etat d'Epée, Chevalier des Or-  
dres du Roi, Grand-Maitre des  
Ordres de N. D. du Mont-Carmel,  
& de Saint Lazare de Jérusalem,  
*Honoraire.*

1716 D A N T Y. Voyez D' I S N A R D.

1712 . . . . . D E S L A N D E S, Com-  
missaire de la Marine à Brett.

1673 D O P A R T, Conseiller Médecin ordi- 1707  
naire du Roi, Docteur-Régent de  
la Faculté de Paris, *Botaniste.*

1718 D O R T O U S. Voyez D E M A I R A N.

1723 Charles D E C I S T E R N A Y D U F A Y,  
Capitaine au Régiment de Picar-  
die, Intendant du Jardin Royal  
des Plantes, de la Société Royale  
de Londres, *Chymiste.*

1699 D' E L I S A G A R A Y. Voyez R E N A U.

1709 Jean-Baptiste E N G U E H A R D, Docteur 1716  
en Médecine de la Faculté de Pa-  
ris, *Anatomiste.* Duc.

1715 . . . . . Duc D'ESCALONE, *Associé* 1725  
Estranger.

1707 Victor-Marie D'ESTREES, Duc-  
Pair, Maréchal, Vice-Amiral  
de France, Grand d'Espagne, &  
Chevalier des Ordres du Roi, de  
l'Académie Française, & Hono-  
raire de celle des Belles-Lettres,  
*Honoraire.*

1699 Guy Crescent FAGON, Premier Mé- 1718  
decin du Roi, Docteur en Méde-  
cine de la Faculté de Paris, Pro-  
fesseur de Botanique & de Chymie  
au Jardin Royal, *Honoraire.*

1696 FANTET. Voyez DE LAGNY.

1716 Jean ELIE LERIGET DE LA FAYE, 1718  
Capitaine aux Gardes, *Associé-  
Libre.*

1682 . . . . . LE FEVRE, *Astronome.* 1706  
Exclus en 1702.

1699 FILLEAU. Voyez DES-BILLETTE.

1721 André-Hercule DE FLEURY, Car-  
dinal, Ministre d'Etat, Grand-  
Aumônier de la Reine. *Honoraire.*

1733 Alexis FONTAINE, *Géomètre.*

1697 Bernard DE FONTENELLE, de  
l'Académie Française, de celle des  
Belles-Lettres, &c. *Secrétaire per-  
pétuel.*

Henri

90 LISTE ALPHABETIQUE

1718 Henri-Jaques NOMPARD DE CAU. 1726  
MONT, Duc DE LA FORCE,  
Pair de France, de l'Académie  
Françoise, *Honoraire.*

1727 DES FORTS. Voyez LE PELLE-  
TIER.

1666 Nicolas FRENICLE DE BESSY, 1675  
Conseiller du Roi en sa Cour des  
Monnoyes. *Géometre.*

1668 Jean GALLOIS, Abbé de S. Martin 1707  
de Cores, Bibliothécaire du Roi,  
Professeur en Grec & Inspecteur  
au College Royal, *Géometre.*

1752 Etienne-Simon DE GAMACHES,  
Chanoine Régulier de Sainte Croix  
de la Bretonnerie, *Affocié-Libre.*

1699 DE LA GARANNE. Voyez RE-  
NEAULME.

1666 Louis GAYANT, Chirurgien Juré à 1673  
Paris, *Anatomiste.*

1699 Etienne-François GEOFFROY, Docteur 1731  
en Médecine de la Faculté de  
Paris, Lecteur & Professeur Royal  
en Médecine & en Chymie, de la  
Société Royale de Londres, *Chy-  
miste.*

1706 Claude-Joseph GEOFFROY, ancien  
Echevin de la Ville de Paris, de  
la Société Royale de Londres,  
*Chymiste.*

- 1731 GIGOT. Voyez DE LA PEYRONIE.
- 1725 Louis GODIN, *Astronome*.
- 1699 Thomas GOUYE, Jésuite, *Honoraire*. 1725
- 1731 Jean-Paul GRANDJEAN, *Astronome*.
- 1731 Jean GROSSE, Docteur en Médecine,  
*Chymiste*.
- 1705 . . . . , GUISNE'E, *Géometre*. 1718
- 1696 Dominique GUGLIELMINI, Docteur 1710  
en Médecine à Bologne, premier  
Professeur de Mathématiques, &  
Sur-Intendant des Eaux de l'Etat,  
*Affocié Etranger*.
- 1729 Edmond HALLEY, Astronome de  
S. M. B. de la Société Royale de  
Londres. *Affocié Etranger*.
- 1666 Jean-Baptiste DU HAMEL, Aumônier 1706  
du Roi, *Secrétaire*, & depuis *Ana-*  
*tomiste*.
- 1728 Henri-Louis DU HAMEL DU MON-  
CEAU, *Botaniste*.
- 1699 Nicolas HARTSOEKER, de la So- 1725  
ciété de Berlin, *Affocié Etranger*.
- 1715 Jean-Claude Adrien HELVETIUS,  
Conseiller d'Etat, Premier Méde-  
cin de la Reine, Médecin Inspecteur  
des Hôpitaux Militaires, *Honoraire*.
- 1678 Philippe DE LA HIRE, Professeur de 1718  
Mathématiques & d'Architecture,  
*Astronome*.

Gabriel

92 LISTE ALPHABETIQUE

1694 Gabriel Philippe DE LA HIRE, Pro- 1719  
fesseur Royal d'Architecture, *Astro-*  
*nome.*

1711 Jean-Nicolas DE LA HIRE, Docteur 1727  
Régent de la Faculté de Médecine  
de Paris, *Botaniste.*

1691 Guillaume H O M B E R G, Premier 1715  
Médecin de M. le Duc d'Orléans,  
*Chymiste.*

1693 Guillaume-François DE L'HÔPITAL, 1704.  
Chevalier, Marquis de Sainte Mes-  
me, Comte d'Entremont, &c. *Hé-*  
*noraire.*

1723 D'H O S T U N. Voyez DE TALLARD.

1728 François-Joseph HUNAUD, Docteur  
en Médecine de la Faculté de  
Paris, Professeur en Anatomie &  
en Chirurgie au Jardin Royal,  
*Anatomiste.*

1666 Chrétien HUYGHENS DE ZUYLICHEM, 1695  
*Géometre.*

1699 . . . . . J E A U G E O N, *Mécanicien.* 1725

1711 Jean-Henri I M B E R T, Docteur en 1722  
Médecine de la Faculté de Paris,  
. . . . .

1716 Antoine-Tristan DANTY D'ISNARD,  
Docteur en Médecine, ancien  
Professeur Royal des Plantes au  
Jardin du Roi, *Botaniste.*

An-

- 1711 Antoine DE JUSSIEU, Docteur-  
Régent de la Faculté de Médecine  
de Paris, Professeur de Botanique  
au Jardin Royal des Plantes, des  
Académies de Londres, & de  
Berlin, *Botaniste*.
- 1725 Bernard DE JUSSIEU, Docteur en  
Médecine de la Faculté de Paris,  
Démonstrateur des Plantes au  
Jardin du Roi, de la Société  
Royale de Londres, *Botaniste*.
- 1696 Thomas FANTET DE LAGNY,  
Garde de la Bibliothèque du Roi,  
de la Société Royale de Londres,  
*Géometre*.
- 1698 . . . . . DE LANGLADE, *Chymiste*. 1717
- 1679 . . . . . DE LANNICN, *Géometre*.  
Exclus en 1685.
- 1719 Jean LAW, Contrôleur-Général des 1729  
Finances, *Honoraire*.
- 1675 Godefroy-Guillaume LEIBNITZ, 1716  
Conseiller Aulique, Président de  
la Société de Berlin, &c. *Associé  
Etranger*.
- 1699 Nicolas LEMERY, Docteur en Mé- 1715  
decine de la Faculté de Paris,  
*Chymiste*.
- 1699 Louis LEMERY, Docteur en Mé-  
decine de la Faculté de Paris. Mé-  
decin ordinaire du Roi, Profes-  
seur

feur de Chymie au Jardin Royal,  
*Chymiste.*

1716 LERIGET. Voyez DE LA FAYE.

1699 Jaques LIEUTAUD, *Astronome.* 1733

1602 Guillaume DELISLE, premier Géo- 1726  
graphe du Roi, *Astronome.*

1714 Joseph-Nicolas DELISLE, Lecteur  
du Roi & Professeur en Mathéma-  
tiques au College Royal de Fran-  
ce, des Académies de Berlin & de  
Russie, *Astronome.*

1725 Louis DELISLE DE LA CROYERE,  
*Astronome.*

1669 Alexis LITTRE, Docteur en Méde- 1725  
decine, *Andtomiste.*

1726 DE LONGUEUIL. Voyez DE MAI-  
SONS.

1714 Eugene D'ALONVILLE, Chevalier 1732  
DE LOUVILLE, *Astronome.*

1699 Camille LE TELLIER DE LOU- 1718  
VOIS, Docteur de Sorbonne,  
Abbé de Bourgueil & de Vaului-  
fant, nommé à l'Evêché de Cler-  
mont, Bibliothécaire du Roi, de  
l'Académie Françoisse & de celle  
des Belles-Lettres, *Honoraire.*

1708 Pierre MAGNOL, Docteur en Méde- 1715  
cine de la Faculté de Montpellier,  
*Botaniste.* Pierre



- 1729 Pierre MAHIEU, *Géometre.*
- 1718 Jean-Jaques DORTOUS DE MAIL-  
RAN, *Géometre.*
- 1726 Jean-René DE LONGUEIL DE MAIL- 1734  
SONS, Président au Parlement,  
*Honoraire.*
- 1699 Nicolas MALEBRANCHE, Prêtre 1715  
de l'Oratoire, *Honoraire.*
- 1699 Nicolas DE MALEZIEU, Chancelier 1727  
de Dombes, de l'Académie Fran-  
çoise, *Honoraire.*
- 1725 Pierre MALOET, Docteur en Mé-  
decine de la Faculté de Paris;  
Médecin de l'Hôtel Royal des  
Invalides. *Anatomiste.*
- 1727 Eustache MANFREDI, Astronome  
de l'Institut des Sciences de Bo-  
logne, *Affilié Etranger.*
- 1694 Jaques-Philippe MARALDI, *Astro.* 1729  
*nome.*
- 1731 . . . . . MARALDI, *Astronome.*
- 1666 Nicolas MARCHANT, Docteur en 1678  
Médecine de l'Université de Pa-  
doue, premier Botaniste de Mon-  
sieur Gaston de France, & Direc-  
teur de la culture des Plantes du  
Jardin Royal, *Botaniste.*
- 1678 Jean MARCHANT, Directeur de la  
culture

culture des Plantes du Jardin  
Royal, *Botaniste*.

1666 Edme MARIOTTE, *Physicien*. 1684

1718 . . . . . MARIUS, *Mécanicien*. 1720

1715 Louis-Ferdinand MARSIGLI, Com- 1730  
te, Fondateur de l'Institut des  
Sciences & des Arts à Bologne,  
*Affilié Etranger*.

1733 Pierre-Louis MOREAU DE MAU-  
PERTUIS, de la Société Royale  
de Londres, *Géometre*.

1725 Jean - Frederic PHELYPEAUX DE  
PONTCHARTRAIN, Comte DE  
MAUREPAS, Secrétaire d'Etat,  
*Honoraire*.

1684 Jean MERRY, Chirurgien de la feue 1722  
Reine, Chirurgien Major des In-  
valides, & ensuite de l'Hôtel-  
Dieu de Paris, *Anatomiste*.

1666 MIGNOT. Voyez DE LA VOYE.

1721 Joseph PRIVAT DE MOLIERE,  
Lecteur du Roi & Professeur en  
Philosophie au Collège Royal de  
France, de la Société Royale de  
Londres, *Mécanicien*.

1725 Pierre LE MONNIER, Professeur de  
Philosophie dans l'Université de  
Paris, *Géometre*.

MON-

1699 . . . . . MONTI, *Astronome*. Excl<sup>s</sup>  
par absence.

1716 DE MONTMOR. Voyez REMOND.

1722 Sauveur MORAND, Chirurgien Juré  
de Paris, Censeur & Démonstra-  
teur Royal, de la Société Royale  
de Londres, Chirurgien des Inva-  
lides en survivance, & de l'Hô-  
pital de la Charité en Chef, *Ana-  
tomiste*.

1723 MOREAU. Voyez DE MAUPER-  
TUIS.

1731 Jean-Baptiste MORGAGNI, Docteur  
en Médecine, Professeur d'Ana-  
tomie dans l'Université de Padoue,  
de la Société Royale de Londres,  
*Affocié Etranger*.

1693 . . . . . MORIN, de Toulon, . . . . .  
*Botaniste*.

1699 Louis MORIN, Docteur en Méde- 1715  
cine, & Médecin de l'Hôtel-Dieu  
de Paris, *Botaniste*.

1699 Isaac NEWTON, Chevalier, Maître 1727  
de la Monnoye d'Angleterre, &  
Président de la Société Royale de  
Londres, *Affocié Etranger*.

1706 François NICOLE, *Mécanicien*.

1666 . . . . . NIQUET, *Géometre*.

(e)

D'ON-

98 LISTE ALPHABETIQUE

1716 D'ONSEMBRAY, Voyez PAJOT.

1702 Jaques OZANAM, *Géometre.* 1717

1716 Louis Leon PAJOT, Comte d'ON- 1666  
SEMBRAY, Intendant-Général  
des Postes & Relais de France,  
*Honoraire.* 1721

1699 Antoine PARENT, *Mécanicien.* 1716

1666 Jean PECQUET, Docteur en Méde- 1674  
cine de la Faculté de Montpellier,  
*Anatomiste.* 1691

1727 Michel Robert LE PELETIER DES 1666  
FORTS, Comte de Saint-Fargeau,  
&c. *Honoraire.* 1703

1710 . . . . . Mylord-Comte de PEMBROK, 1733 1716  
*Affocié Etranger.*

1666 Claude PERRAULT, Docteur en 1688  
Médecine de la Faculté de Paris,  
*Physicien.*

1666 PERSONNE. Voyez DE ROBER-  
VAL.

1705 Jean-Louis PETIT, Chirurgien Juré 1982  
à Paris, Censeur Royal, de la  
Société Royale de Londres, *Ana-  
tomiste.*

1722 François PETIT, Docteur en Méde- 1699  
cine, Médecin des Armées du Roi,  
*Anatomiste.*

1731 François GIGOT DE LA PEYRON- 1699  
NIE, 1721

NIE, Premier Chirurgien du Roi,  
en Survivance, *Affocié Libre.*

1666 Jean PICARD, Prêtre, Prieur de 1682  
Rillié en Anjou, *Astronome.*

1721 PIERRE I. Empereur des Russes, 1725  
*Honoraire.*

1714 Henri PITOT, *Géometre.*

1691 PLITTON. Voyez TOURNEFORT.

1666 . . . . . PIVERT. . . . .

1703 Martin POLI, Ingénieur du Roi, 1714  
*Affocié Etranger.*

1716 Melchior DE POLIGNAC, Cardinal,  
Archevêque d'Auch, Primat d'A-  
quitaine, Commandeur des Or-  
dres du Roi, Général-Grand-Mai-  
tre de l'Ordre du Saint-Esprit de  
Montpellier, de l'Académie Fran-  
çoise, Honoraire de celle des  
Belles-Lettres, *Honoraire.*

1682 Laurent POTHENOT, Professeur de 1732  
Mathématiques dans la Chaire de  
Ramus, *Géometre.* Exclut par ab-  
sence avant 1699.

1699 François POUPART, Docteur en 1709  
Médecine, *Anatomiste.*

1699 LE PRESTRE, Voyez DE VAUBAN.

1721 PRIVAT. Voyez DE MOLIERES.

100 LISTE ALPHABETIQUE  
1706 René Antoine DE REAUMUR,  
*Mécanicien.*

1699 Pierre-Sylvain REGIS, *Géometre.* 1707

1716 Pierre REMOND DE MONTMOR, 1719  
*Affocié Libre.*

1699 Bernard RENAUD'ELISAGARAY, 1719  
Lieutenant-Général des Armées  
du Roi d'Espagne, Conseiller du  
Conseil de la Marine, & Grand-  
Croix de l'Ordre de S. Louis,  
*Honoraire.*

1699 Michel Louis RENEAULME DE LA  
GARANNE, Docteur-Régent de  
la Faculté de Médecine à Paris,  
*Botaniste.*

1716 Jean-Baptiste DES CHIENS DE  
RESSONS, Commandeur de l'Or-  
dre Militaire de S. Louis, Briga-  
dier des Armées du Roi, Lieute-  
nant-Général d'Artillerie, & Lieu-  
tenant de Roi du Pays du Maine,  
*Affocié Libre.*

1716 Charles REYNEAU, Prêtre de l'Ora- 1728  
toire, *Affocié Libre.*

1731 Marie-Guillaume Bénard DE REZAY,  
*Affocié Libre.*

1731 Louis-François Armand, Duc DE  
RICHELIEU & de Fronzac, Che-  
valier des Ordres du Roi, ci-  
devant Ambassadeur de France à la

Cour

DE L'ACADEMIE. 101  
 Cour de Vienne, de l'Académie  
 Françoisé. *Honoraire.*

1666 . . . . . RICHER, *Astronome.* 1696

1666 Gilles PERSONNE DE ROBERVAL, 1675  
 Professeur Royal en Mathématiques dans la Chaire de Ramus,  
 & dans celle du College de Maître  
 Gervais, *Géometre.*

1672 Olaus ROEMER, Conseiller d'Etat 1710  
 en Danemarc, Lieutenant de Po-  
 lice & premier Consul de Copen-  
 hague, *Astronome.*

1685 Michel ROLLE, *Géometre.* 1719

1712 Pierre-Simon ROUHAULT, Chirur-  
 gien Juré de Paris, Chirurgien  
 du feu Roi de Sardaigne & de ses  
 Armées, Professeur en Chirurgie  
 dans l'Université de Turin, *Ana-  
 tomiste.*

1727 Frideric RUISCH, de l'Académie 1731  
 des Curieux de la Nature & de la  
 Société Royale de Londres, Pro-  
 fesseur d'Anatomie & de Botanique  
 à Amsterdam, *Associé Etranger.*

1706 . . . . . SAULMON, *Mécanicien.* 1725

1706 Joseph SAURIN, *Géometre.*

1696 Joseph SAUVEUR, Professeur Royal 1716  
 de Mathématiques & Examineur  
 des Ingénieurs, *Géometre.*

102 LISTE ALPHABETIQUE

1681 . . . . . SEDILEAU, *Astronome.* 1693

1724 Pierre SENAC, Docteur en Médecine, *Anatomiste.*

1699 Michel DE SENNE, Intendant des Bâtimens de S. A. S. M. le Duc.

1699 SIMON. Voyez DE VALHEBERT.

1708 Hans SLOANE, Docteur en Médecine, Président de la Société Royale de Londres, *Associé Etranger.*

1723 Camille D'HOSTUN, Duc DE TAL-LARD, Pair & Maréchal de France, Gouverneur des Comtés de Foix & de Bourgogne. *Honoraire.*

1698 Daniel TAUVRY, Docteur en Médecine de la Faculté de Paris, *Anatomiste.* 1701

1699 LE TELLIER. Voyez DE LOUVOIS.

1707 Jean TERRASSON, Lecteur du Roi & Professeur en Philosophie au Collège Royal de France, de l'Académie Française, *Géometre.*

1685 Melchisedec THEVENOT, Bibliothécaire du Roi, *Physicien.* 1691

1699 . . . . . DU TORAR. . . . .

Jean.



- 1718 Jean-Baptiste COLBERT, Marquis  
DE TORCY & de Sablé, *Hono-  
raire.*
- 1691 Joseph PITTON TOURNEFORT, 1708  
Professeur de Botanique au Jardin  
Royal, & Docteur en Médecine  
de la Faculté de Paris, *Botaniste.*
- 1722 Jaques TRANT, Docteur en Méde-  
cine de la Faculté de Paris, *Bota-  
niste.*
- 1721 DU TROUSSET. Voyez DE VA-  
LINCOUR.
- 1730 DE VALJOUAN. Voyez DAGUES-  
SEAU.
- 1699 Sebastien TRUCHET, Religieux Car- 1729  
me, *Honoraire.*
- 1682 Ernfray Walther DE TSCHIRNHAU- 1708  
SEN, Seigneur de Kislingswald &  
de Stoltzenberg, *Géometre, Associé  
Etranger.*
- 1699 Adrien TUILIER, Docteur-Régent 1702  
en Médecine de la Faculté de Pa-  
ris, *Chymiste.*
- 1716 Sebastien VAILLANT, Démonstra- 1722  
teur des Plantes du Jardin Royal,  
*Botaniste.*
- 1699 Hervé SIMON DE VALHEBERT.
- 1721 Jean-Baptiste Henri DU TROUSSET 1730  
(e) 4 DE

DE VALINCOUR, Secrétaire Général de la Marine, de l'Académie Française, *Honoraire*.

1731 . . . . DE VALLIERE, Maréchal des Camps & Armées du Roi, Commandeur de l'Ordre Militaire de Saint Louis, Lieutenant-Général d'Artillerie, Directeur-Général des Bataillons de Royal-Artillerie, & des Ecoles d'Artillerie, *Associé-Libre*.

1688 Pierre VARIGNON, de la Société 1722  
Royale de Londres, & de Berlin, Professeur Royal de Philosophie & de Mathématiques au College Mazarin. *Géometre*.

1699 Sebastien LE PRESTRE, Seigneur 1707  
DE VAUDAN, Maréchal de France, Chevalier des Ordres du Roi, Commissaire Général des Fortifications, Grand-Croix de l'Ordre de Saint Louis & Gouverneur de la Citadelle de Lille, *Honoraire*.

1674 Guichard-Joseph DU VERNEY, 1730  
Docteur en Médecine & Professeur d'Anatomie au Jardin Royal, *Anatomiste*.

1701 Pierre DU VERNEY, Chirurgien 1728  
Juré à Paris, *Anatomiste*.

1708 Raymond VIEUSSENS, Docteur en 1715  
Médecine de la Faculté de Montpellier, *Anatomiste*.

Vin:

DE L'ACADEMIE. 105

1699 Vincent VIVIANI, Noble Florentin, 1703  
*Affocié Etranger.*

1666 . . . . . DE LA VOYE, MIGNOT, . . .  
*Géomètre.*

1716 DE VOYER DE PAULMY, *Voyez*  
d'ARGENSON.

1708 Jaques-Benigne WINSLOW, Méde-  
cin de la Faculté de Paris, Inter-  
prete de la Langue Teutonique à  
la Bibliotheque du Roi, de la  
Société de Berlin, *Anatomiste.*

1733 Christian WOLPHIUS, Professeur de  
Mathématiques & de Philosophie à  
Marpurg, de la Société Royale de  
Londres & de celle de Prusse,  
*Affocié Etranger.*





ETAT  
DE MESSIEURS DE  
L'ACADEMIE  
ROYALE  
DES  
SCIENCES,

EN SEPTEMBRE 1733.



HONORAIRES.



Monsieur l'Abbé BIGNON, Conseiller  
d'Etat ordinaire, Bibliothécaire  
du Roi.

M. le Maréchal Duc d'ESTRÉES,  
Vice-Amiral de France & Grand  
d'Espagne.

M. Le

# LISTE DE L'ACADEMIE. 107

M. le Cardinal de POLIGNAC, Grand-Maitre  
de l'Ordre Hospitalier du St. Esprit.

M. PAJOT D'ONSEMBRAY, Intendant gé-  
néral des Postes & Relais de France.

M. le Marquis de TORCY.

M. le Cardinal DE FLEURY, Ministre d'Etat  
& Grand-Aumônier de la Reine, ci-  
devant Précepteur du Roi.

M. le Comte DE MAUREPAS, Secrétaire  
d'Etat.

M. De Voyer de Paulmy D'ARGENSON, Con-  
seiller d'Etat, Chancelier, Garde des  
Sceaux de Monseigneur le Duc d'Or-  
léans, & de l'Ordre de S. Louis.

M. LE PELETIER DES FORTS.

M. DAGUESSEAU, Chancelier de France.

M. DAGUESSEAU DE VALJOUAN, Conseiller  
honoraire au Parlement.

M. le Duc DE RICHELIEU, Pair de France,  
l'un des Quarante de l'Académie Fran-  
çoise.

~~~~~

PENSIONNAIRES VETERANS.

M. SAURIN.

M. DE LAGNY, Sous-Bibliothécaire du Roi;
de la Société Royale de Londres.

~~~~~

PENSIONNAIRES ORDINAIRES.

*Pour la Géométrie.*

M. DE MAIRAN.

M. DE MAUPERTUIS, de la Société Royale  
de Londres.

M. PITOT.

*Pour l'Astronomie.*

M. CASSINI, Maître des Comptes, de la  
Société Royale de Londres.

M. GODIN.

M. . . . .

*Pour la Mécanique.*

M. DE REAUMUR.

M. NICOLE.

M. CHEVALIER, Maître de Mathématique du  
Roi, & des Pages de la Petite Ecurie,

*Pour l'Anatomie.*

M. WINSLOW, Médecin de la Faculté de Pa-  
ris, Interprete de la Langue Teutonique  
à la Bibliothèque du Roi.

M. PE-

LISTE DE L'ACADEMIE. 109

M. PETIT, Chirurgien Juré à Paris, & Démonstrateur Royal.

M. PETIT, Docteur en Médecine.

*Pour la Chymie.*

M. LEMERY, Médecin de la Faculté de Paris, & Médecin ordinaire du Roi, Professeur de Chymie au Jardin Royal des Plantes.

M. GEOFFROI, de la Société Royale de Londres, Maître Apothicaire à Paris.

M. DUFAY, ancien Capitaine au Régiment de Picardie, de la Société Royale de Londres.

*Pour la Botanique.*

M. MARCHANT.

M. RENBAULME DE LA GARANNE, Médecin de la Faculté de Paris.

M. DE JUSSIEU, Médecin de la Faculté de Paris, Professeur & Démonstrateur des Plantes au Jardin du Roi, de la Société Royale de Londres.

*Secrétaire.*

M. DE FONTENELLE, de l'Académie Française, de l'Académie des Inscriptions, de la Société Royale de Londres, & Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences.

# 110 LISTE DE L'ACADEMIE.

*Trésorier.*

M. COUPLET, Professeur Royal de Mathématiques des Pages de la Grande Ecurie du Roi, & Trésorier perpétuel de l'Académie.



## ASSOCIÉS LIBRES.

M. DESCHIENS DE RESSONS, Commandeur de l'Ordre Militaire de S. Louis, Brigadier des Armées du Roi, Lieutenant-Général de l'Artillerie, & Lieutenant de Roi du Pays du Maine.

M. DE REZAY.

M. l'Abbé DE BRAGELONGNE.

M. DE VALLIERE, Maréchal des Camps & Armées du Roi, Commandeur de l'Ordre Militaire de S. Louis, Lieutenant-Général de l'Artillerie & Directeur-général des Bataillons de Royal-Artillerie, & des Ecoles de ladite Artillerie.

M. DE LA PEYRONNIE, Premier Chirurgien du Roi.

M. CHICOYNEAU, Conseiller d'Etat ordinaire, Premier Médecin du Roi, Surintendant des Eaux minérales & médicinales de France, & Chancelier en l'Université de Médecine de Montpellier.

M. DE GAMACHES, Chanoine régulier.

ASSO-





*ASSOCIÉS VÉTÉRANS.*

M. ROUHAULT, Chirurgien du feu Roi de Sardaigne.

M. HELVETIUS, Médecin de la Faculté de Paris, Médecin ordinaire du Roi, Premier Médecin de la Reine, & Inspecteur général des Hôpitaux de Flandres.

M. CHOMEL, Médecin de la Faculté de Paris, & Médecin du Roi.



*ASSOCIÉS ORDINAIRES.*

*Pour la Géométrie.*

M. TERRASSON, Lecteur du Roi en Philosophie, & Professeur au Collège Royal, de l'Académie Française.

M. BOUGUER, Professeur Royal d'Hydrographie.

*Pour l'Astronomie.*

M. DELISLE, Lecteur & Professeur au Collège Royal, de la Société Royale de Londres, & de celle de Prusse.

M. . . . .

*Pour*

112 LISTE DE L'ACADEMIE.

*Pour la Méchanique.*

M. l'Abbé PRIVAT DE MOLIERES, Lecteur  
& Professeur en Philosophie, de la So-  
ciété Royale de Londres.

M. CAMUS, Secrétaire & Professeur de l'Aca-  
démie Royale d'Architecture.

M. CLAIRAUT.

*Pour l'Anatomie.*

M. MORAND, de la Société Royale de Lon-  
dres, Chirurgien de Paris, Censeur &  
Démonstrateur Royal, Chirurgien-Major  
des Invalides en survivance, & de l'Hô-  
pital de la Charité en Chef.

M. MALOET, Médecin de la Faculté de Paris,  
& Médecin de l'Hôpital des Invalides.

*Pour la Chymie.*

M. BOULDUc, Apothicaire du Roi, Démonstra-  
teur en Chymie au Jardin Royal des  
Plantes.

M. BOURDELIN, Médecin de la Faculté de  
Paris.

*Pour la Botanique.*

• M. DANTY D'ISNARD, Docteur en Médecine,  
ancien Professeur Royal des Plantes au  
Jardin du Roi.

M. DU

M. DU HAMEL DU MONCEAU.



ASSOCIÉS ÉTRANGERS.

M. BERNOULLI, Professeur de Mathématiques, de la Société Royale de Londres, & de l'Académie des Sciences de Berlin, & de Petersbourg.

M. SLOANE, Docteur en Médecine, & Président de la Société Royale de Londres.

M. DE CROUZAS, Conseiller de S. A. S. le Landgrave de Hesse-Cassel, Gouverneur du Prince Frederic de Hesse-Cassel.

M. MANFREDI, Directeur de l'Observatoire.

M. HELLEY, Astronome de S. M. B. de la Société Royale de Londres.

M. BOERHAVE, Professeur en Médecine, Botanique & Chymie à Leide.

M. MORGAGNI, Docteur en Médecine, & Professeur d'Anatomie dans l'Université de Padoue.

M. WOLPHIUS, Professeur de Mathématiques à Marburg, de la Société Royale de Londres, & de celle de Prusse.



A D. J O I N T S.

*Pour la Géométrie.*

M. LE MONNIER, Professeur de Philosophie;

M. MAHIEU.

*Pour l'Astronomie.*

M. DE LA CROYERE.

M. MARALDI.

*Pour la Mécanique.*

M. GRAND-JEAN.

M. FONTAINE.

*Pour l'Anatomie.*

M. SENAC, Docteur en Médecine.

M. HUNAULD, Médecin de la Faculté de Paris, & Professeur en Anatomie & en Chirurgie au Jardin Royal des Plantes.

*Pour la Chymie.*

M. DE LA CONDAMINE.

M. GROSSE.

*Pour*

*Pour la Botanique.*

M. TRANT, Médecin de la Faculté de Paris.

M. DE JUSSIEU le Jeune, Docteur en Médecine de la Faculté de Paris, Démonstrateur des Plantes au Jardin du Roi, de la Société de Londres.

*Pour la Géographie.*

M. BUACHE, Premier Géographe du Roi.



ADJOINTS VETERANS.

M. SIMON DE VALHEBERT.

M. DESLANDES, Commissaire de la Marine.

M. DE SENNE, Intendant des Bâtimens de S. A. S. Monseigneur le Duc.

*Peintre & Dessinateur.*

M. CHASTILLON, Peintre du Roi.

F I N.

C A-

# CATÁLOGUE

## DE LIVRES

## DE MATHEMATIQUES

## ET

## DE PHYSIQUE,

Qui se trouvent chez PIERRE MORTIER,  
à AMSTERDAM.

### A.

**A** Bregé de Mathématique pour l'Usage de  
sa Majesté Impériale de Russie, 2 vol. 8.  
Petersbourg 1728.

Analyse des Infiniment-Petits, par Mr. de l'Hôpital,  
4. Paris 1716.

— des Infiniment-Petits, comprenant le  
Calcul intégral dans toute son étendue, par  
M. Stone, servant de suite aux Infiniment-Pe-  
tits par M. le Marquis de l'Hôpital: traduit en  
François par M. Rondet. 4. Paris 1735.

Application de l'Algebre a la Géométrie, par M.  
Guisnée. 4. Paris 1733. avec fig.

L'Arithmetique par Tarif, par M. Mirabaud, 4.  
2 voll. 1722.

— nouvelle d'une Méthode très facile par  
ses Abregez & par la supression des parties Ali-  
quotes, par Monier de Clairecombe. 12. Paris  
1719.

### B.

Le **B**ombardier François, ou Nouvelle Méthode  
de jeter les Bombes avec précision,  
par Belidor. 4. Amst. 1734. avec fig.

C.

## C.

**C**Alculs d'usage pour trouver promptement les Poids & les Mesures suivant leur prix, 8. Paris 1726.

Commentaire sur l'Analyse des Infiniment-petits, par M. de Croufaz. 4. fig.

— sur la Géométrie de Descartes, par le Pere Rabuel. 4. 1730.

Communes Mesures & Racines communes, par le Sr. Taneguyle Fevre, 8. Paris 1714.

Cours de Mathématique, par Blondel, 4. 2 vol. 1699. avec fig.

— nouveau de Mathématiques à l'Usage de l'Artillerie & du Genie, par Belidor, 4. Paris 1725. fig.

— de Physique par Hartsoecker, avec fig. 1730.

## D.

**D**escription abrégée d'une Horloge d'une nouvelle invention, pour la juste mesure du tems sur Mer, avec le Jugement de l'Académie Royale des Sciences, & une Dissertation sur la nature des Tentatives, par Sully, 4. Paris 1726.

Dictionnaire des Arts & des Sciences, de M. D. C. de l'Académie François. Nouv. Edition revue, corrigée & augmentée par MM. de l'Académie Royale des Sciences. fol. 2 vol. Paris 1732.

— Mathématique d'Ozanam, 4. fig.

## E.

**E**claircissemens sur l'Analyse des Infiniment-petits du Marq. de l'Hôpital, par Varignon. 4. fig. Paris.

— concernant la maniere dont l'air agit sur le sang dans les Poumons, par Helvetius, 4. Par. 1728.

Elémens d'Euclide, par Dechales. 12. Paris 1728.

— de Géométrie, avec un Traité des Logarithmes, par Mr. de Malezieu, 8. Paris 1722.

— de Mathématiques par Prestet, 4. 2 vol.

— de Mathématiques ou Traité de la Grandeur en général, par le P. Lamy, 12. Amst. 1733.

Elé-

Elémens de Géométrie, ou de la Mesure du Corps,  
par le P. Lamy, 12. 1733.

— de Mathématique par M. Varignon, 4. Paris  
1734.

Entretiens Physiques d'Ariste & d'Eudoxe, ou Physi-  
que nouv. en Dialogues, par le Pere Regnault.  
12. 4 vol. Amst. avec fig. 1732.

Essai sur le Mouvement, par M. de Croufaz, 12.  
fig. 1728.

— d'une nouv. Théorie de la Manœuvre des  
Vaisseaux, par Bernoulli, 8. fig.

— Physique sur l'Oeconomie Animale, par  
Fr. Quesnay 12. Paris 1736.

Existence de Dieu démontrée par les merveilles  
de la Nature, par Nieuwentyt, 4. 1728.

Expériences de Physique par Mr. Pierre Poliniere.  
12. 2 vol. avec fig. Paris 1734.

## G.

**G**éographie des Enfans, ou Méthode abrégée  
de la Géographie divisée par Leçons, avec  
la Liste des Cartes nécessaires aux Enfans, par  
l'Abbé Lenglet du Fresnoy. 8. Amst. 1736.

— Physique, ou Essai sur l'Histoire na-  
turelle de la Terre : traduit de l'Anglois de Mr.  
Wodward par M. Noguez, 12. Amst. 1736.

La Géométrie-Pratique par Mr. Mallet, 4 vol. 8. avec  
plus de 500 figures en Taille-douce; Paris 1702.

— Pratique de Le Clerc, 12. avec fig.

— de Mr. Descartes. 12.

— de M. de Croufaz, 12. 2 vol. fig.

Gnomique Universelle, ou Science de tracer les  
Cadrans Solaires sur toutes sortes de surfaces  
tant stables que mobiles, 8. Paris, 1701.

*Geometria nova practica, super charta & solo.* 8.

's Gravesande, (G J.) *Institutiones Philosophiæ New-  
tonianæ*, 8. Lugd Bat. 1728.

— *Matheseos Universalis Elementa*, *ibid.*  
1727. 8.

's Gra.



's *Gravesande, Orationes tres, de Mathematicos usu, de Evidentia, & de Vera Philosophia* 4. *ibid.* 1734.

—— *Physicæ Elementa*, 3 vol. 4. *ibid.* 1737.

H.

**H**artsoecker Conjectures Physiques, 4. 2 vol. & autres œuvres.

Histoire Physique de la Mer, par le Comte Marfigii, fol. fig.

—— de l'Académie Royale des Sciences, avec les Mémoires de Mathématique, Physique &c. tirés de ladite Académie, depuis 1699 jufq. à présent. Complet : on peut avoir diverses années séparément.

—— idem, années 1699. 1700. 1701. 1702. Nouv. Edition Amst. 1735. avec fig.

—— idem, pour l'année 1732. 12. Amst. 1736. 2 vol. avec fig.

—— Naturelle de l'Univers, dans laquelle on rapporte des Raifons fur les Effets les plus curieux & les plus extraordinaires de la Nature, enrichie de figures, par M. Colonne 12, 4 vol. Paris 1734.

I.

**I**ntroduction nouv. à la Géométrie Pratique, tirée des meilleurs Auteurs, par le Chevalier Daudet, 12. 3 vol. Paris 1730.

Journal des Observations Physiques, Mathématiques & Botaniques, par le *Pere Feuillée*, 4. fig.

K.

**K**eill, *Tentamina Medico-Physica, quibus accedit Medicina Statica Britannica* 4. 1730.

L.

**L**çons de Physique, contenant les Elémens de la Physique déterminez par les seules Loix des Mécaniques, par de Molieres, 12. Paris 1733 2 vol.

—— idem tome 2. à part. 12. Paris 1736.

—— de Mathématiques nécessaires pour l'intelligence des Principes de Physique, par J. P. de Molieres. 12. Paris 1725.

Let-

Lettres de M. Auzout sur les Grandes Lunettes:  
Voyages de MM. Cassini. en France, Italie,  
Flandre, Hollande & Angleterre, &c. 4. Amst.  
1735. avec fig.

—— Philosophiques sur la Formation des Sels  
& des Crystaux, par Bourguet, 12. 1729.

—— Critiques de Monsieur Saurin de l'Acadé-  
mie R. des Sciences à Mr. \*\*\* sur le Traité de  
Mathématique du P. Castel. 4. Paris 1730.

*Leeuwenhoek Opera omnia, seu Arcana Naturæ ope  
Microscopiorum detecta.* 4. 1722.

M.

**M**echanique ou Statique dont le projet fut don-  
né par M. Varignon. 4. 2 vol. fig. Paris 1723.

Mémoires pour servir à l'Histoire des Insectes, par  
Mr. de Reaumur. 12. tome 1. Amst. 1737.

—— le tome 2. sous presse & paroitra au mois  
d'Avril 1737.

—— pour servir à l'Histoire naturelle des Ani-  
maux & des Plantes\* 4. Amst. 1736.

—— de l'Académie Royale des Sciences con-  
tenant les Ouvrages adoptés par cette Acadé-  
mie. tome 6. Amst. 1736. avec fig.

—— la Suite sous presse.

—— de l'Académie Royale des Sciences, con-  
tenant les Ouvrages adoptés par cette Académie  
avant son renouvellement en 1699. 6 vol. 4.  
enrichie de beaucoup de figures, Amst.

—— Les volumes suivans sous presse.

—— pour régler les Montres & les Pendules, par  
Mr. Sully 12. Paris 1728. avec fig.

*Musschenbroek, Physica Experimentalis & Geometrica  
Ultrajectina.* 4. 1729.

—— *Elementa Physica conscripta in usus ACADE-*  
*micos.* 8. Lugd. Bat. 1734.

N.

**N**ouveau Cours de Mathématique par Bellidor,  
4. fig.

New.

# CATALOGUE DE LIVRES. 121

Newton, *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*. 4. 1723.

## O.

**O**bservations sur toutes les parties de la Physique, 12. 3 vol.

——— Mathématiques, Astronomiques & Géographiques, par le P. Souciet. 4. Paris 1729.

——— idem le tome 2 & 3. contenant l'Histoire, & un Traité de l'Astronomie Chinoise, avec des Differtations &c. 4. Paris.

Oeuvres de M. Clermont, contenant l'Arithmétique Militaire & la Géométrie pratique de l'Ingénieur, 4. Paris 1733. avec fig.

——— de Pardies, 12. 1725.

——— de Descartes, 12. 13 vol.

——— diverses de Physique & de Mécanique de Messrs. Perrault, 4. 2 vol.

Ouvrages de Mathématique par le P. B. Lamy, divisés en trois Volumes, 12. Amst. 1734.

——— divers d'Astronomie par M. Cassini, 4. Amst. 1731.

——— de Mathématique de Mr. Picard: Observations Astronomiques & Physiques par Mr. Richer: Du Micrometre par M. Auzout, 4. Amst. 1731.

——— de Mathématique par Mr. de Roberval, 4.

——— Ouvrages adoptés de l'Académie des Sciences, 4. 6 vol. & les suivans sous presse.

Ode, *Principia Theologiæ Naturalis*. 8. 1729.

——— *Philosophia Naturalis*. 4. 2 vol. fig. 1727.

## P.

**P**arfait Ingénieur François, ou la Fortification offensive & défensive &c. 4. Amst. 1734.

Pensées Critiques sur les Mathématiques, où l'on

(f)

pro;

122 CATALOGUE DE LIVRES.

propose divers préjugés contre les Sciences &c.

12. Paris 1733.

Physique de Rohault, 8. 2 vol.

— Sacrée, ou l'Histoire Naturelle de la Bible, de Mr. Jean Jaques Scheuchzer, enrichie de figures en taille douce, fol. 8 vol. 1733.

Principes de Physique, nécessaires pour la Médecine pratique. 12. 2 vol. Paris 1714.

Propositions d'une Mesure de la Terre, par d'Anville. 12. Paris.

*Pitcarni Elementa & Dissertat. Med. Phys. Mathematica.* 4. 2 vol. 1718.

R.

**R**echerches sur les Courbes à double Courbure, 4. Paris 1731.

Récréations Mathématiques, par Ozanam, 8. 4 vol. fig.

Recueil de plusieurs Ouvrages de Mathématiques &c. par Mr. de Serviere, 4. fig.

— des Pieces qui ont remporté les prix de l'Académie des Sciences, 4. Paris.

Résolutions des quatre principaux Problèmes d'Architecture par Blondel, & Ouvrages de Mathématique par Frenicle, 4. Amst. 1731.

*Rohaulti Physica, ex recensione S. Clark, cum animadv.* T. Le Grand, 8. fig. 1729.

S.

**L**a Science des Ingénieurs dans la Conduite des Travaux de Fortification & d'Architecture Civile, par Belidor, 4. Haye 1734. avec fig.

— Naturelle ou Explication curieuse & nouvelle de differens effets de la Nature Celeste, 12. Paris 1724.

Sentimens d'un homme de Guerre sur le nouveau Système du Chevalier de Folard, par M. D\*\*\*. 4. Haye 1733. avec figures.

Spec-

# CATALOGUE DE LIVRES. 123.

Spéctacle de la Nature, ou Entretiens sur les particularités de l'Histoire naturelle, vol. 12. fig. Utrecht 1735.

Système nouveau du Microcosme, par Tymogué, 8. 1727.

## T.

**T**ables Astronomiques dressées & mises en lumière par les ordres Louis le Grand. Par Mr. de la Hire. 4. Paris 1735.

Traité de la Physique, par Castel, 12. 2 vol.

— du Mouvement & de la Mesure des Eaux coulantes, par M. Varignon, 4.

— de la Construction des Grands Chemins des Romains & des Modernes, 8. fig.

— d'Optique par Newton, traduit de l'Anglois, 12.

— de l'Algebre, par M. de Croufaz, 8. fig.

— des Forces mouvantes pour la pratique des Arts & Métiers, par Camus, 8. Paris 1729.

— général des Horloges, par D. Jaques Alexandre de la Congrégation de St. Maur. Ouvrage enrichi de quantité de fig. 8. Paris 1734.

— de Méchanique de l'Equilibre des Solides & des Liqueurs, item le Traité de Perspective, par le P. B. Lamy, 12. avec fig. Amst. 1734.

— Analytique des Sections Coniques, par le Marq. de l'Hôpital, 4.

— de la Construction & des principaux usages des Instrumens de Mathématiques, avec les figures, par Bion, 4.

— des Métaux & des Minéraux, par Chambon, 12. Paris 1714.

— de la Grandeur de la Terre, par Cassini, 12.

— d'Algebre, ou Principes généraux pour résoudre les Questions de Mathématiques, par Rolle. 4. Paris.

— des Machines & Inventions extraordinaires, par Papin. 8. Paris.

Traité de Perspective pratique, avec des Remarques sur l'Architecture, par Courtonne. fol. Paris 1725.

— d'Horlogerie pour les Montres & les Pendules, avec l'Histoire ancienne & moderne de l'Horlogerie, trad. de l'Anglois de Mr. Derham. 12. Paris 1731. avec fig.

— de Physique, par Rohault. 8.

— de l'Art Métallique extrait des Oeuvres d'Alvarex Barba, auquel on a joint un Mémoire concernant les Mines de France. 12. Paris 1730. avec fig.

— de Méchanique de l'Equilibre des Solides & des Liqueurs, item le Traité de Perspective par le P. B. Lamy, 12. avec fig. Amst. 1734.

— de la Méchanique, par Mr. de la Hire, 4. Paris 1729.

— méthodique & abrégé de toutes les Mathématiques, par Mr. de Neufeglise, 2 vol. 8. avec fig. Lion 1700.


Tacquet *Elementa Euclidea, Geometria plana ac solida, & Selecta ex Archimede Theoremata, novis Corollariis & XL. schematibus aucta à Guil. Wbiston.* 8. 1725.

*Tentamina Experimentorum Naturalium captorum in Academia del Cimento sub auspiciis Ser. Princ. Leopoldi magni Etruria Ducis, ex Italico in Latinum Sermonem conversa; quibus Commentarios, nova Experimenta & Orationem de Metodo instituendi Experimenta Physica addidit Petr. van Musschenbroek L. A. M. Med. & Phil. D. Phil. & Mathes. Prof. in Acad. Ultrajectina.* 1731.

U. Sage du Pantomètre, 12. Paris avec fig.


F I N.













LX  
3  
3

